EDN · RÉVISION MÉDICALE

Hématologie

Révision médicale complète · 16 chapitres · 50 illustrations

EDN

Informations

© 2026 EDN. Tous droits réservés.

Document de révision destiné à l'usage personnel des étudiants en médecine. Ce document n'est pas un avis médical et ne remplace aucun enseignement universitaire ni le référentiel officiel.

Source : documentation de révision EDN mise à disposition publiquement.

Langue : français. Format : EPUB 3.

Les tableaux de la source ont été convertis en texte : le libellé de chaque ligne est repris tel quel, et chaque colonne est nommée. Aucune donnée n'a été ajoutée, supprimée ni réordonnée.

Navigation : la table des matières de la liseuse donne accès à chaque chapitre. Les sections encadrées sont repliables d'un toucher.

Sommaire

Références

1 Introduction à l'hématologie

2 Fiches hématologies

3 Syndrome hémorragique d'origine hématologique (216)

4 Hémogramme (212)

5 Anémie (213)

6 Thrombopénie (214)

7 Éosinophilie (218)

8 Syndrome mononucléosique (217)

9 Produits sanguins labiles (PSL) (329)

PARTIE 1 — HÉMOPATHIES

10 Leucémie aiguë (315)

11 Syndrome myélodysplasique (316)

12 Syndrome myéloprolifératif (317)

13 LLC (leucémie lymphoïde chronique) (318)

14 Lymphomes malins (319)

15 Myélome multiple (320)

Références

*Collège disponible sur **Clinical Key Student***

Introduction à l'hématologie

Définitions : sang, plasma, sérum

- Sang = suspension cellulaire dans le plasma
- Plasma = liquide complexe constitué d'eau, de sels minéraux et de molécules organiques
- Sérum = plasma après coagulation (dépourvu de fibrinogène)

Localisation de l'hématopoïèse au cours de la vie

> *cf courbe dans le collège d'hématologie*

1. Sang apparaît chez l'homme dès le **21e** jour de l'embryogenèse, en même temps que les premiers vaisseaux : il est produit dans l'AGM (aorte-gonades-mésonéphros) et le sac vitellin origine mésodermique
1. **Entre le 2e et le 7e mois** de la vie, le foie et la rate prennent la relève
1. Dans les 2 derniers mois de la vie intra-utérine la moelle osseuse devient le site prédominant de la formation du sang
1. Après la naissance, la moelle est le site exclusif de production sanguine
1. Progressivement, au cours de l'enfance, le tissu hématopoïétique des **os longs** est remplacé par du tissu adipeux
1. Chez l'adulte : localisation des 3/4 de la moelle osseuse hématopoïétique dans les **os plats** (bassin, sternum) et les **vertèbres**

Anatomie de la moelle osseuse

> *cf schema dans le college*

Moelle osseuse hématopoïétique fonctionne dans un espace contraint (cadre osseux), non extensible et très richement vascularisé

Examen au microscope d'une biopsie ostéomédullaire met en évidence les travées osseuses, des espaces adipeux et des amas de cellules hématopoïétiques entourant des sinus vasculaires

Cellules hématopoïétiques établissent des relations étroites avec le micro-environnement médullaire, plus particulièrement avec la matrice protéique extracellulaire (fibronectine, laminine, collagènes ...) et les cellules stromales, avec lesquelles elles interagissent via des molécules d'adhérence

Les cellules les plus immatures sont fixées aux cellules stromales au sein de niches hématopoïétiques, et leur maturation favorise la libération dans le flux sanguin des cellules différenciées via la modification de l'expression des facteurs d'ancrage au micro-environnement

Anatomie des organes lymphoïdes

Organes lymphoïdes centraux : Moelle et Thymus

- Moelle : comprend un tissu lymphoïde diffus, non folliculaire, en étroite interaction avec le micro-environnement médullaire