EDN · RÉVISION MÉDICALE

Orthopédie

Révision médicale complète · 6 chapitres · 102 illustrations

EDN

Informations

EDN — Orthopédie

© 2026 EDN. Tous droits réservés.

Document de révision destiné à l'usage personnel des étudiants en médecine. Ce document n'est pas un avis médical et ne remplace aucun enseignement universitaire ni le référentiel officiel.

Source : documentation de révision EDN mise à disposition publiquement.

Langue : français. Format : EPUB 3.

Les tableaux de la source ont été convertis en texte : le libellé de chaque ligne est repris tel quel, et chaque colonne est nommée. Aucune donnée n'a été ajoutée, supprimée ni réordonnée.

Navigation : la table des matières de la liseuse donne accès à chaque chapitre. Les sections encadrées sont repliables d'un toucher.

Sommaire

Références

1 Fractures fréquentes (363)

2 Lésions périarticulaires et ligamentaires (361)

3 Infection aiguë des parties molles (349)

4 Surveillance d'un malade sous plâtre (365)

5 Prothèses et ostéosynthèse (362)

Références

www.sofcot.fr

Fractures fréquentes (363)

Fractures de l'extrémité supérieure du fémur

> *radiopaedia.org*

Anatomie de l'extrémité supérieure du fémur

Type d'os — Fractures cervicales : Os cortical dense ; Fractures trochantériennes : Os spongieux

Limites anatomiques

Fractures cervicales :

Zone cervicale est intra-articulaire, s'étend de :

- Base de la tête fémorale (limite de la zone d'encroûtement cartilagineux)
- Ligne inter-trochantérienne sur laquelle s'insère la capsule

Fractures trochantériennes :

Zone trochantérienne est extra-articulaire, s'étend de :

- Ligne inter-trochantérienne
- 5 centimètres au-dessous du petit trochanter

(dans la région de la jonction métaphyso-diaphysaire supérieure)

Forces — Fractures cervicales : Forces de cisaillement prédominent ; Fractures trochantériennes : Forces de compression prédominent

Vascularisation — Fractures cervicales : Vascularisation **fragile** ; Fractures trochantériennes : Vascularisation riche

Consolidation — Fractures cervicales : Consolidation longue (**4 mois**) ; Fractures trochantériennes : Consolidation en **40 jours**

Complications

Fractures cervicales :

- Nécrose ischémique de la tête fémorale
- Retard de consolidation, Pseudarthrose

Fractures trochantériennes :

Cals vicieux attirant le membre distal en

- r**otation externe**, **adduction**, **raccourcissement**