

Sesión integradora

Para el primer ciclo de introducción a la matemática para ingeniería

Luis Huatay

noggnzzz@gmail.com

U24218809

23 de junio de 2024

Resolución de las actividades de la sesión integradora de la semana 14.

1. Sesión integradora

- 1.1. El supermercado vende 3 tipos de conservas, Gloria, Laive y Cameo. El precio promedio de las 3 conservas es de S/9.00 . Un cliente compra 30 unidades de Gloria, 20 de Laive y 10 de Cameo, debiendo abonar S/560.00. Otro compra 20 unidades de Gloria y 25 de Cameo y abona S/310.00. Calcula el precio de una conserva Gloria, otra de Laive y otra de Cameo. Utiliza el método de Gauss-Jordan

Donde:

$$\begin{array}{l} \text{Gloria : } a \\ \text{Laive : } b \\ \text{Cameo : } c \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} a + b + c = 27 \\ 3a + 2b + c = 56 \\ 4a + 0b + 5c = 62 \end{array} \right.$$

- Sean las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 27 \\ 56 \\ 62 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

Donde:

A : Matriz de coeficientes

B : Matriz de términos independientes

X : Matriz de incógnitas

- Sea la matriz aumentada:

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 27 \\ 3 & 2 & 1 & 56 \\ 4 & 0 & 5 & 62 \end{array} \right]$$

- Aplicando operaciones elementales:

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 27 \\ 3 & 2 & 1 & 56 \\ 4 & 0 & 5 & 62 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \leftarrow F_1(-3) + F_2 \\ \leftarrow F_1(-4) + F_3 \end{array}$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 27 \\ 0 & -1 & -2 & -25 \\ 0 & -4 & 1 & -46 \end{array} \right] \quad \leftarrow F_2(-4) + F_3$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 27 \\ 0 & -1 & -2 & -25 \\ 0 & 0 & 9 & 54 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \leftarrow F_2(-1) \\ \leftarrow F_3\left(\frac{1}{9}\right) \end{array}$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 27 \\ 0 & 1 & 2 & 25 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right]$$

- Finalmente:

$$\begin{array}{rclcl} c & = & 6 & b + 2(6) & = & 25 & a + 13 + 6 & = & 27 \\ & & & b & = & 13 & a & = & 8 \end{array}$$

$$\therefore C.S.(a, b, c) = \{(8, 13, 6)\}$$

- 1.2. En una reunión del club se juntan 30 personas entre hombres, mujeres y niños. Se sabe que entre los hombres y las mujeres duplican al número de niños. También se sabe que entre los hombres y el triple de las mujeres exceden en 20 al doble de niños. Plantear un sistema de ecuaciones que permita averiguar el número de hombres, mujeres y niños. Resolver el sistema de ecuaciones planteado y comentar el resultado. Utiliza el método de la matriz inversa

Donde:

$$\begin{array}{lcl} \text{Hombre : } h & \left\{ \begin{array}{l} h + m - 2n = 0 \\ h + 3m - 2n = 20 \\ h + m + n = 30 \end{array} \right. & \begin{array}{l} \text{Por condición con niños.} \\ \text{Hombres y el triple de mujeres exceden en 20 al doble de niños.} \\ \text{Por cantidad de asistentes.} \end{array} \\ \text{Mujeres : } m & & \\ \text{Niños : } n & & \end{array}$$

• Entonces las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 20 \\ 30 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} h \\ m \\ n \end{bmatrix}$$

Donde:

A : Matriz de coeficientes

B : Matriz de términos independientes

X : Matriz de incógnitas

• Aplicando el método de matriz inversa.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \text{adj}(A)$$

• Calculando el determinante:

$$\begin{aligned} |A| &= 3 - 2 + 6 + 2 - 1 - 2 \\ |A| &= 6 \end{aligned}$$

• Calculando la matriz de cofactores:

$$\begin{aligned} \text{Cof}(A) &= \begin{bmatrix} +(3+2) & -(1+2) & +(1-3) \\ -(1+2) & +(1+2) & -(1-1) \\ +(-2+6) & -(-2+2) & +(3-1) \end{bmatrix} \\ \text{Cof}(A) &= \begin{bmatrix} 5 & -3 & -2 \\ -3 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

• Calculando la matriz adjunta:

$$\begin{aligned} \text{adj}(A) &= (\text{Cof}(A))^T \\ \text{adj}(A) &= \begin{bmatrix} 5 & -3 & 4 \\ -3 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

• Calculando la matriz inversa:

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{6} \cdot \begin{bmatrix} 5 & -3 & 4 \\ -3 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \\ A^{-1} &= \begin{bmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{1}{2} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

• Finalmente:

$$X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{1}{2} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 20 \\ 30 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \\ 10 \end{bmatrix}$$

La cantidad de hombres, mujeres y niños es de 10 cada uno.

$$\therefore C.S. (h, m, n) = \{(10, 10, 10)\}$$

1.3. El país asiático de China compra 540,000 barriles de petróleo a tres suministradores diferentes del medio oriente que lo venden a \$27, \$28 y \$31 el barril, respectivamente. La factura total asciende a \$15,999,000. Si del primer suministrador recibe el 30 % del total del petróleo comprado, ¿cuál es la cantidad comprada a cada suministrador? Utiliza el método de Cramer.

• Sea el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 27x + 28y + 31z = 15999000 \\ x + y + z = 540000 \\ x = 162000 \end{cases}$$

• Entonces las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 27 & 28 & 31 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 15999000 \\ 540000 \\ 162000 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

• Método de Cramer:

Hallando el determinante de la matriz A:

$$\begin{aligned} |A| &= 28 - 31 \\ |A| &= -3 \end{aligned}$$

Hallando el determinante para X:

$$\begin{aligned} |A_x| &= \begin{vmatrix} 15999000 & 28 & 31 \\ 540000 & 1 & 1 \\ 162000 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ |A_x| &= 4536000 - 5022000 \\ |A_x| &= -486000 \end{aligned}$$

Hallando el determinante para Y:

$$\begin{aligned} |A_y| &= \begin{vmatrix} 27 & 15999000 & 31 \\ 1 & 540000 & 1 \\ 1 & 162000 & 0 \end{vmatrix} \\ |A_y| &= 21021000 - 16740000 - 4374000 \\ |A_y| &= -93000 \end{aligned}$$

Hallando el determinante para Z:

$$\begin{aligned} |A_z| &= \begin{vmatrix} 27 & 28 & 15999000 \\ 1 & 1 & 540000 \\ 1 & 0 & 162000 \end{vmatrix} \\ |A_z| &= 4374000 + 15120000 - 15999000 - 4536000 \\ |A_z| &= -1041000 \end{aligned}$$

• Finalmente:

$$\begin{aligned} x &= \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{-486000}{-3} = 162000 \\ y &= \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{-93000}{-3} = 31000 \\ z &= \frac{|A_z|}{|A|} = \frac{-1041000}{-3} = 347000 \end{aligned}$$

$$\therefore C.S. (x, y, z) = \{(162000, 31000, 347000)\}$$

La cantidad comprada a cada suministrador es de 162,000, 31,000 y 347,000 barriles respectivamente.

- 1.4. La empresa TOYOTA.SAC ha lanzado al mercado tres nuevos modelos de autos deportivos (A, B y C). El precio de venta de cada modelo es 1.5, 2 y 3 millones de dólares, respectivamente, ascendiendo el importe total de los autos vendidos durante el primer mes a 250 millones. Por otra parte, los costes de fabricación son de 1 millón por auto deportivo para el modelo A, de 1.5 para el modelo B y de 2 para el C. El coste total de fabricación de los autos deportivos vendidos en ese mes fue de 175 millones y el número total de autos deportivos vendidos 140. Determina el número total de autos deportivos que la marca TOYOTA.SAC ha vendido. Utiliza el método de Gauss-Jordan.

- Dado el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 140 & \text{Número total de autos vendidos.} \\ \left(\frac{3}{2}\right)x + 2y + 3z = 250 & \text{Importe total de los autos vendidos.} \\ x + \left(\frac{3}{2}\right) + 2z = 175 & \text{Coste total de fabricación.} \end{cases}$$

- Entonces las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{3}{2} & 2 & 3 \\ 1 & \frac{3}{2} & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 140 \\ 250 \\ 175 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

- Método Gauss-Jordan:

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 140 \\ \frac{3}{2} & 2 & 3 & 250 \\ 1 & \frac{3}{2} & 2 & 175 \end{array} \right] \begin{array}{l} \leftarrow F_1 \left(-\frac{3}{2}\right) + F_2 \\ \leftarrow F_1(-1) + F_3 \end{array}$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 140 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 40 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & 35 \end{array} \right] \leftarrow F_2(-1) + F_3$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 140 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 40 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \end{array} \right] \begin{array}{l} \leftarrow F_2(2) \\ \leftarrow F_3(-2) \end{array}$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 140 \\ 0 & 1 & 3 & 80 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right]$$

- Finalmente:

$$\begin{array}{rclcl} z & = & 10 & y + 3(10) & = & 80 & x + 50 + 10 & = & 140 \\ & & & y & = & 50 & x & = & 80 \end{array}$$

$$\therefore C.S. (x, y, z) = \{(80, 50, 10)\}$$

La cantidad total de autos vendidos es de 140.

- 1.5. Un almacén distribuye cierto producto que fabrican 3 marcas distintas: A, B y C. La marca A lo envasa en cajas de 250 gramos y su precio es de S/100.00, la marca B lo envasa en cajas de 500 gramos a un precio de S/180.00 y la marca C lo hace en cajas de 1 kilogramo a un precio de S/330.00. El almacén vende a un cliente 2.5 kilogramos de este producto por un importe de S/890.00. Sabiendo que el lote iba envasado en 5 cajas, plantea un sistema para determinar cuántas cajas de cada tipo se han comprado y resuelve el problema. Utiliza el método de la matriz inversa.

- Sea el sistema:

$$\begin{array}{l} \text{Donde:} \\ \text{Marca A : } a \\ \text{Marca B : } b \\ \text{Marca C : } c \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{lcl} 10a + 18b + 33c & = & 89 \\ a + 2b + 4c & = & 10 \\ a + b + c & = & 5 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{Precio de las marcas.} \\ \text{Por peso} \\ \text{Cantidad de cajas.} \end{array}$$

- Sean las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 18 & 33 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 89 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

- Aplicando el método de matriz inversa.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \text{adj}(A)$$

- Calculando el determinante:

$$\begin{aligned} |A| &= 20 + 72 + 33 - 66 - 40 - 18 \\ |A| &= 1 \end{aligned}$$

- Calculando la matriz de cofactores:

$$\begin{aligned} \text{Cof}(A) &= \begin{bmatrix} +(2-4) & -(1-4) & +(1-2) \\ -(18-33) & +(10-33) & -(10-18) \\ +(72-66) & -(40-33) & +(20-18) \end{bmatrix} \\ \text{Cof}(A) &= \begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 15 & -23 & 8 \\ 6 & -7 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- Calculando la matriz adjunta:

$$\begin{aligned} \text{adj}(A) &= (\text{Cof}(A))^T \\ \text{adj}(A) &= \begin{bmatrix} -2 & 15 & 6 \\ 3 & -23 & -7 \\ -1 & 8 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- Calculando la matriz inversa:

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{1} \cdot \begin{bmatrix} -2 & 15 & 6 \\ 3 & -23 & -7 \\ -1 & 8 & 2 \end{bmatrix} \\ A^{-1} &= \begin{bmatrix} -2 & 15 & 6 \\ 3 & -23 & -7 \\ -1 & 8 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- Finalmente:

$$\begin{aligned} X &= A^{-1} \cdot B \\ X &= \begin{bmatrix} -2 & 15 & 6 \\ 3 & -23 & -7 \\ -1 & 8 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 89 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix} \\ X &= \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\therefore C.S.(a, b, c) = \{(2, 2, 1)\}$$

La cantidad de cajas de cada marca es de 2, 2 y 1 respectivamente.

- 1.6. Una editorial dispone de tres textos diferentes para Matemáticas de 2o de Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanas. El texto A se vende a 9 € el ejemplar; el texto B a 11 € y el C a 13 €. En la campaña correspondiente a un curso académico la editorial ingresó, en concepto de ventas de estos libros de Matemáticas 8400 €. Sabiendo que el libro A se vendió tres veces más que el C, y que el B se vendió tanto como el A y el C juntos, plantea un sistema de ecuaciones que te permita averiguar cuántos se vendieron de cada tipo y resuelve el problema. Utiliza el método de Cramer.

- Sea el sistema:

$$\begin{array}{l} \text{Donde:} \\ \text{Libro A : } a \\ \text{Libro B : } b \\ \text{Libro C : } c \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} 9a + 11b + 13c = 8400 \\ -a + b - c = 0 \\ a + 0b - 3c = 0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{Precio de las marcas.} \\ \text{Por cantidad.} \\ \text{Por condición.} \end{array}$$

- Entonces las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 11 & 13 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 8400 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

- Método de Cramer:

Hallando el determinante de la matriz A:

$$\begin{aligned} |A| &= -27 - 11 - 13 - 33 \\ |A| &= -84 \end{aligned}$$

Hallando el determinante para A:

$$\begin{aligned} |A_x| &= \begin{vmatrix} 8400 & 11 & 13 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} \\ |A_x| &= -25200 + 0 + 0 \\ |A_x| &= -25200 \end{aligned}$$

Hallando el determinante para B:

$$\begin{aligned} |A_y| &= \begin{vmatrix} 9 & 8400 & 13 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \end{vmatrix} \\ |A_y| &= -8400 - 25200 \\ |A_y| &= -33600 \end{aligned}$$

Hallando el determinante para C:

$$\begin{aligned} |A_z| &= \begin{vmatrix} 9 & 11 & 8400 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ |A_z| &= -8400 \end{aligned}$$

- Finalmente:

$$\begin{aligned} a &= \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{-25200}{-84} = 300 \\ b &= \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{-33600}{-84} = 400 \\ c &= \frac{|A_z|}{|A|} = \frac{-8400}{-84} = 100 \end{aligned}$$

$$\therefore C.S. (a, b, c) = \{(300, 400, 100)\}$$

La cantidad de libros vendidos de cada tipo es de 300, 400 y 100 respectivamente.

1.7. Determina el conjunto solución de los siguientes sistemas de ecuaciones bajo el método Gauss-Jordan.

1. Sea el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + 2y + 4z = 3 \\ 2x + 4y + 8z = 1 \\ 0x - y + z = -2 \end{cases}$$

•Entonces las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

•Por Gauss-Jordan:

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 8 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right] \leftarrow F_1(-2) + F_2$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right] \leftarrow F_2(-1)$$

•Finalmente:

\therefore El sistema es inconsistente

$$C.S.(x, y, z) = \{(\emptyset)\}$$

2. Sea el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 3y + 4z = 1 \\ -2x - y - 8z = -7 \end{cases}$$

•Entonces las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -2 & -1 & -8 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -7 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

•Por Gauss-Jordan:

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ -2 & -1 & -8 & -7 \end{array} \right] \begin{array}{l} \leftarrow F_1(-2) + F_2 \\ \leftarrow F_1(2) + F_3 \end{array}$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -6 & -3 \end{array} \right] \leftarrow F_2(-1) + F_3$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -8 & 0 \end{array} \right]$$

•Finalmente:

$$\begin{array}{rclcl} z & = & 0 & y + 2(0) & = & -3 & x - 3 + 0 & = & 2 \\ & & & y & = & -3 & x & = & 5 \end{array}$$

$$\therefore C.S.(x, y, z) = \{(5, -3, 0)\}$$