
Betrachtungen der Tafel und andere Überlegungen

Mathematik

J. F.
2025.11.21

Inhaltsverzeichnis

1. Mengen und Zahlbereiche	5
1.1. Mengen	5
1.1.1. Definition nach Cantor	5
1.1.2. Mengeneigenschaften	5
1.1.3. Mengenbeziehungen	5
1.1.4. Vereinigung, Durchschnitt und Mengendifferenz	5
1.1.5. Kartesisches Produkt	6
1.2. Zahlbereiche	6
1.2.1. Bezeichnung der Zahlbereiche	6
2. Abbildungen	6
2.1. Abbildung, Bild, Urbild, Definitions- und Wertebereich	6
2.1.1. Abbildungen und Funktionen	6
2.1.2. Beispiel	7
2.1.3. Satz über Bilder und Urbilder	7
2.1.4. Verschiedene Abbildungen	7
2.1.5. Beispiel	7
2.2. Verkettung von Abbildungen	8
2.2.1. Verkettung	8
2.2.2. Assoziativität	8
2.3. Abbildungseigenschaften	8
2.3.1. Surjektivität, Injektivität und Bijektivität	8
2.3.2. Beispielbeweis	9
2.3.3. Hinrichtungs- und Rückrichtungsbeweise	9
2.4. Umkehrabbildung	10
2.4.1. Inverse Abbildung	10
2.4.2. Beispiel	10
2.4.3. Satz über Links- und Rechtsinverse	11
2.4.4. Satz über die Verkettung bijektiver Abbildungen	11
2.4.5. Beweis	11
3. Funktionen	12
3.1. Grundlagen zum Funktionsbegriff	12
3.1.1. Zahlenmengenkriterium	12
3.1.2. Begriffe	12
3.1.3. Grundlegende Funktionstypen	12
3.1.4. Nullstellen	13
3.2. Symmetrie	13
3.2.1. Gerade Funktionen	13
3.2.2. Beispielbeweis	13
3.2.3. Ungerade Funktionen	13
3.2.4. Exponentenkriterium für Symmetrie ganzrationaler Funktionen	13
3.2.5. Beweis für Achsensymmetrie	14
3.3. Verhalten	14
3.3.1. Monotonie	14
3.3.2. Globalverhalten	14
3.3.3. Globalverhalten bei ganzrationalen Funktionen	14
3.3.4. Beweis	14
3.4. Verschiebung	15
3.4.1. Verschiebung einer Funktion in y -Richtung	15
3.4.2. Verschiebung einer Funktion in x -Richtung	15
3.5. Grenzwerte	15
3.5.1. Syntax und Semantik	15

3.5.2.	Grenzwerte für Funktionen	15
3.5.3.	Lokales Grenzwertverhalten	15
3.5.4.	Beispiel	16
3.5.5.	Satz für die Stetigkeit	16
3.5.6.	Unstetigkeitsstelle	16
3.6.	Lineare Funktionen	17
3.6.1.	Funktionsgleichung	17
3.6.2.	Steigung linearer Funktionen	17
3.6.3.	Beweis	17
3.7.	Quadratische Funktionen	18
3.7.1.	Definition	18
3.7.2.	Nullstellen quadratischer Funktionen	18
3.7.3.	Satz von Vieta	18
3.7.4.	Beweis	19
3.8.	Ganzrationale Funktionen	19
3.8.1.	Fundamentalsatz der Algebra für reelle Zahlen	19
3.8.2.	Beweis	19
3.8.3.	Satz zur Abspaltung von Linearfaktoren	20
3.8.4.	Beweis	20
3.8.5.	Zerlegung in Linearfaktoren	20
3.8.6.	Vielfachheit von Nullstellen	20
3.8.7.	Beispiel	20
3.8.8.	Bemerkung	21
3.8.9.	Teilerkriterium für Nullstellen ganzrationaler Funktionen	21
3.8.10.	Beweis	21
3.9.	Rationale Funktionen	21
3.9.1.	Zusammensetzung	21
3.9.2.	Begriffsnutzungen	21
3.9.3.	Besonderheiten	22
4.	Folgen	22
4.1.	Der Folgenbegriff	22
4.1.1.	Folgen	22
4.1.2.	Notation	22
4.1.3.	Rekursion und Explikation	23
4.2.	Verschiedene Folgen	23
4.2.1.	Geometrische Folgen	23
4.2.2.	Konstante Folgen	23
4.2.3.	Alternierende Folgen	24
4.3.	Monotonieverhalten	24
4.3.1.	Strenge Monotonie	24
4.3.2.	Beispielbeweis	24
4.3.3.	Einfache Monotonie	24
4.4.	Teilfolgen	25
4.4.1.	Folgen mit Systematik	25
4.4.2.	Definition	25
4.4.3.	Teilfolgensatz	25
4.4.4.	Beweis	25
4.5.	Beschränktheit von Folgen	25
4.5.1.	Schranken	25
4.5.2.	Untere und obere Schranken, Maxi- und Minima	26
4.5.3.	Beispiel	26
4.5.4.	Vielschrankensatz	26

4.5.5.	Beweis	26
4.5.6.	<i>Suprema</i> und <i>Infima</i>	26
4.5.7.	Schritte zum Nachweis	27
4.5.8.	Beispielnachweis	27
4.5.9.	Supremumsaxiom	27
4.6.	Grenzwerte	28
4.6.1.	Grenzwert einer Folge	28
4.6.2.	Grenzwerte konstanter Folgen	28
4.6.3.	Geometrische Nullfolgen	28
4.6.4.	Beweis	28
4.6.5.	Bestimmte Divergenz	28
4.6.6.	Beschränkungskonvergenzsatz	28
5.	Beweise	29
5.1.	Beweistechniken	29
5.1.1.	Hinrichtung und Rückrichtung	29
5.1.2.	Satz vom Nullprodukt als Beispiel	29
5.1.3.	Aufbau	29
5.1.4.	Beweis durch vollständige Induktion	29

1. Mengen und Zahlbereiche

1.1. Mengen

1.1.1. Definition nach Cantor

Unter einer **Menge** verstehen wir eine Zusammenfassung von bestimmten, wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens, welche **Elemente** der Menge heißen, zu einem Ganzen.

1.1.2. Mengeneigenschaften

Sei M eine Menge. Dann heißt

- $x \in M$, x ist ein Element von M .
- $x \notin M$, x ist kein Element von M .
- $M = \emptyset$, M ist eine Leere Menge, die kein Element enthält, also $M = \{\}$.
- $|M|$ heißt **Mächtigkeit** oder Kardinalzahl von M und gibt an, wie viele Elemente M enthält.

Wir können Mengen auf verschiedene Weisen darstellen.

- Wortvorschriften

Z.B. M ist die Menge aller natürlichen Zahlen, die durch 5 teilbar ist.

- Auflistung der Elemente

Z.B. $M = \{0; 5; 10; \dots\}$

- Definition der Eigenschaften

Z.B. $M = \{n \in \mathbb{N} \mid n \bmod 5 = 0\}$

- Graphisch, z.B. als Venn-Diagramm.

1.1.3. Mengenbeziehungen

Seien X und Y Mengen.

- X heißt **Teilmenge** von Y ($X \subseteq Y$), wenn jedes Element von X auch in Y ist.
- X heißt **echte Teilmenge** von Y ($X \subset Y$), wenn jedes Element von $X \subseteq Y \wedge X \neq Y$.
- Die Mengen X und Y heißen **gleich**, wenn $X \subseteq Y \wedge Y \subseteq X$.

1.1.4. Vereinigung, Durchschnitt und Mengendifferenz

Seien X und Y Mengen. Dann heißt

- $X \cap Y := \{x \mid x \in X \wedge x \in Y\}$ **Durchschnitt** von X und Y .

TL;DR

Durchschnitt ist eine Schnittmenge.

- $X \cup Y := \{x \mid x \in X \vee x \in Y\}$ **Vereinigung** von X und Y .
- $X \dot{\cup} Y := \{x \mid x \in X \vee x \in Y\}$ **disjunkte Vereinigung** von X und Y .

· $X \setminus Y := \{x \mid x \in X \wedge x \notin Y\}$ **Differenz** von X und Y .

1.1.5. Kartesisches Produkt

Seien X und Y Mengen, dann ist ihr kartesisches Produkt definiert durch die Kreuzmenge aus beiden.

$$X \times Y = \{(x; y) \mid x \in X \wedge y \in Y\}$$

1

1.2. Zahlbereiche

1.2.1. Bezeichnung der Zahlbereiche

\mathbb{N} Menge der natürlichen Zahlen mit 0

\mathbb{N}^* Menge der natürlichen Zahlen ohne 0

\mathbb{Z} Menge der ganzen Zahlen

\mathbb{Q} Menge der rationalen Zahlen

\mathbb{Q}^+ Menge der positiven rationalen Zahlen

$-\mathbb{Q}^+$ Menge der negativen rationalen Zahlen

\mathbb{R} Menge der reellen Zahlen, \mathbb{R}^+ und $-\mathbb{R}^+$ analog, sodass $\mathbb{R} = -\mathbb{R}^+ \cup \{0\} \cup \mathbb{R}^+$

\mathbb{C} Menge der komplexen Zahlen

2. Abbildungen

2.1. Abbildung, Bild, Urbild, Definitions- und Wertebereich

2.1.1. Abbildungen und Funktionen

Es seien X und Y nichtleere Mengen.

1. Eine Vorschrift f , die jedem Element von X genau ein Element von Y zuordnet, heißt **Abbildung** von X nach Y .

$$\forall x \in D_f \subseteq X \text{ gibt es genau ein } y = f(x) \in Y.$$

$$f : X \rightarrow Y \\ x \mapsto y$$

Handelt es sich bei X und Y um reine Zahlenmengen (z.B. \mathbb{R}), so bezeichnen wir die Abbildung f auch als **Funktion**.

2. D_f ist die **Definitionsmenge**³ von der Vorschrift f .
3. B_f ist die **Bildungsmenge**³ von f , wobei $B_f = \{y \in Y \mid y = f(x) \text{ mit } x \in D_f\}$
4. $f(x) \in Y$ heißt **Bildpunkt** bzw. **Funktionswert** von x unter f .

Ist $y \in Y$, so heißt jedes $x \in X$ mit $f(x) = y$ ein **Urbild** bzw. **Argument** von y unter f .

5. Die Menge aller Urbunkte von y unter f bezeichnen wir mit $f^{-1}(y) := \{x \in X \mid f(x) = y\}$. Zu f^{-1} sagen wir auch **das Urbild** von y unter f .

¹ $(x; y)$ ist ein geordnetes Paar².

² $(x; y) = (x; w) \Leftrightarrow x = v \quad y = w$

³ siehe Abschnitt 3.1.2 für Funktionen

TL;DR

Das **Urbild** ist die Menge aller **Urbilder**.

$X = D_f$ heißt **Definitionsbereich** von f und $Y = B_f$ heißt **Wertebereich** von f .

Die Menge $im(f) := \{f(x) \mid x \in X\} = \{y \in Y \mid \exists x \in X\}$ mit $f(x) = y$ heißt **Bild** von f .

6. Die Menge $\Gamma_f := \{(x, f(x)) \mid x \in X\} \subset X \times Y^4$ heißt der Graph von f .

7. Zwei Abbildungen $f, g : X \rightarrow Y$ heißen gleich ($f = g$), wenn $f(x) = g(x) \forall x \in X$.

2.1.2. Beispiel

Wir betrachten die Funktion $f(x) = \sin(x)$.

Für $X_1 = [0; \frac{\pi}{2}]$ wäre das Bild $im(f(X_1)) = [0; 1]$.

Für $Y_1 = [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]$ wäre $f^{-1}(Y_1) = \{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{1}{2} \leq \sin(x) \leq \frac{1}{2}\}$ oder $f^{-1}(Y_1) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [-\frac{\pi}{6} + k\pi; \frac{\pi}{6} + k\pi]$.

Der Definitionsbereich $D_f = \mathbb{Z}$ und der Wertebereich $B_f = [-1; 1]$.

2.1.3. Satz über Bilder und Urbilder

Sei $f : X \rightarrow Y$ eine Abbildung, $A, A_1, A_2 \subset X$ und $B, B_1, B_2 \subset Y$. Dann gilt

- 1) $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$
- 2) $f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$
- 3) $f(X \setminus A) = f(X) \setminus f(A)$
- 4) $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$
- 5) $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$
- 6) $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$

2.1.4. Verschiedene Abbildungen

(1) Es sei X eine nichtleere Menge. Die **Identität** auf X ist definiert durch

$$\begin{aligned} Id_X : X &\rightarrow X \\ x &\mapsto x \end{aligned}$$

(2) Sei $y_0 \in Y$ fixiert. Dann heißt die Abbildung

$$\begin{aligned} c_{y_0} : X &\rightarrow Y \\ x &\mapsto y_0 \end{aligned}$$

konstante Abbildung.

(3) Ist $X \subset \mathbb{R}$, so heißt jede Abbildung $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ **reelle Funktion**.

2.1.5. Beispiel

Die Logarithmusfunktion ist eine reelle Funktion.

⁴siehe Abschnitt 1.1.5

$$\ln : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \ln(x)$$

2.2. Verkettung von Abbildungen

2.2.1. Verkettung

Es seien X, Y, Z nichtleere Mengen und $f : X \rightarrow Y$ und $g : Y \rightarrow Z$ zwei Abbildungen. Dann heißt die Abbildung

$$g \circ f : X \rightarrow Z$$

$$x \mapsto g(f(x))$$

die **Verkettung** (oder **Verknüpfung**, **Hintereinanderausführung**) von f und g .

Wir sagen auch „ g nach f “, d.h. f wird zuerst angewendet, danach g .

2.2.2. Assoziativität

Seien $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ und $h : Z \rightarrow W$ Abbildungen.

Dann sind die Verkettungen $h \circ (g \circ f)$ und $(h \circ g) \circ f$ wohldefiniert und es gilt

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

Dies nennt man **Assoziativität der Verkettung**.

2.3. Abbildungseigenschaften

2.3.1. Surjektivität, Injektivität und Bijektivität

Eine Abbildung $f : X \rightarrow Y$ heißt **surjektiv**, wenn $\forall y \in Y : \exists x \in X : f(x) = y$.

In der Sprache der Relationen spricht man von **Rechtstotalität**. Man könnte die Surjektivität einer Abbildung mit $f : X \twoheadrightarrow Y$ ausdrücken.

TL;DR

Eine Abbildung ist surjektiv, wenn es zu jedem $y \in Y$ **mindestens** ein $x \in X$ gibt.

Eine Abbildung $f : X \rightarrow Y$ heißt **injektiv**, wenn $\forall x_1, x_2 \in X : f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1 = x_2$.

In der Sprache der Relationen spricht man von **Linkseindeutigkeit**. Man könnte die Injektivität einer Zuordnung mit $f : X \hookrightarrow Y$ ausdrücken, wobei der Pfeil eine Ähnlichkeit mit einer Teilmenge (\subset) aufweist.

TL;DR

Eine Abbildung heißt injektiv, wenn es zu jedem $y \in Y$ **maximal** ein $x \in X$ gibt.

Eine Abbildung ist **bijektiv**, wenn sie sowohl surjektiv als auch injektiv ist. Diese Abbildung nennen wir auch eineindeutige Zuordnung.

TL;DR

Eine Abbildung ist bijektiv, wenn jedem $x \in X$ genau ein $y \in Y$ zugeordnet wird und jedes $y \in Y$ einem $x \in X$ zugeordnet wird.

2.3.2. Beispielbeweis

Betrachten wir die Abbildung $f : x \mapsto \frac{x}{x+1}$ mit $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir wollen nun herausfinden, ob f injektiv, surjektiv oder sogar bijektiv, also beides, ist.

1. Damit f **injektiv** ist, muss die Definition⁵ erfüllt sein. Also muss für $x_1, x_2 \in X$ mit $f(x_1) = f(x_2)$ $x_1 = x_2$. Dafür setzen wir sie gleich.

$$\begin{aligned} \frac{x_1}{x_1+1} &= \frac{x_2}{x_2+1} & | \cdot (x_2+1) \\ \frac{x_1 x_2 + x_1}{x_1+1} &= x_2 & | \cdot (x_1+1) \\ x_1 x_2 + x_1 &= x_1 x_2 + x_2 & | - x_1 x_2 \\ x_1 &= x_2 \end{aligned}$$

Quod erat Demonstrandum

Somit ist f injektiv. Da $x_1 = x_2$ ist die Definition erfüllt.

2. Damit f **surjektiv** ist, muss auch die Definition⁵ $\forall y \in Y : \exists x \in X : f(x) = y$ erfüllt sein.

$$\begin{aligned} y &= \frac{x}{x+1} & | \cdot (x+1) \\ yx + y &= x & | - y - x \\ yx - x &= -y \Leftrightarrow x(y-1) = -y & | \cdot \frac{1}{y-1} \\ x &= -\frac{y}{y-1} \end{aligned}$$

$-\frac{y}{y-1}$ ist für $y = 1$ nicht definiert und somit ist f nicht surjektiv, da ein $y \in Y$ existiert für das es kein $x \in X$ gibt.

3. f ist kann folglich nicht **bijektiv** sein, da es dafür surjektiv und injektiv sein müsste. Es wäre bijektiv für $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

2.3.3. Hinrichtungs- und Rückrichtungsbeweise

Injektivität

1) „ \Rightarrow “

Sei f injektiv.

Wir fixieren ein Element $x_0 \in X$ und definieren $g : Y \rightarrow X$ durch

$$g(y) := \begin{cases} x & \text{falls } y \in \text{im}(f) \wedge f(x) = y \\ x_0 & \text{falls } y \notin \text{im}(f) \end{cases}$$

Dann ist g **wohldefiniert** und es gilt $g(f(x)) = x$ für alle $x \in X$.

g ist also eine Linksinverse⁶ von f .

„ \Leftarrow “

Sei $g : Y \rightarrow X$ eine Linksinverse von f .

Seien $x_1, x_2 \in X$ zwei Punkte mit $f(x_1) = f(x_2)$.

⁵siehe Abschnitt 2.3.1

⁶siehe Abschnitt 2.4.3

Dann gilt $x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2$ und somit $x_1 = x_2$.
Folglich ist f injektiv.

Surjektivität

1) „ \Rightarrow “

Sei f surjektiv.

Für jedes $y \in Y$ wählen wir ein Urbild $x(y) \in X$ aus.

Dann ist die Abbildung $h : Y \rightarrow X$ mit $h(y) := x(y)$ wohldefiniert und es gilt $f(h(y)) = f(x(y)) = y$ für alle $y \in Y$.

h ist also eine Rechtsinverse von f .

2) „ \Leftarrow “

Sei $h : Y \rightarrow X$ eine Rechtsinverse von f .

Dann gilt $f(h(y)) = y$ für alle $y \in Y$.

Also ist $h(y) \in X$ ein Urbild von y unter f .

Folglich ist f surjektiv.

2.4. Umkehrabbildung

2.4.1. Inverse Abbildung

Ist die Abbildung $f : X \rightarrow Y$ bijektiv, so ist die inverse Abbildung $f^{-1} : Y \rightarrow X$ zu f definiert durch

$$f^{-1} : Y \rightarrow X$$

$$y \mapsto f^{-1}(y)$$

$y \mapsto f^{-1}(y) :=$ das eindeutig bestimmte Urbild von y unter f .

Sei $f : X \rightarrow Y$ bijektiv. Dann ist $f^{-1} : Y \rightarrow X$ ebenfalls bijektiv und es gilt aufgrund der Definition

$$f^{-1} \circ f = Id_X$$

$$f \circ f^{-1} = Id_Y$$

$$(f^{-1})^{-1} = f$$

2.4.2. Beispiel

(1) $Id_X : X \rightarrow X$ ist bijektiv.

$$Id_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x$$

$$(Id_X)^{-1} = Id_X$$

(2) Die konstante Abbildung $c_{y_0} : X \rightarrow Y$ ist weder injektiv noch surjektiv, unter der Bedingung, dass X und Y mehr als ein Element enthalten.

$(c_{y_0})^{-1}$ ist zudem keine Abbildung mehr.

(3) Die reelle Funktion $\ln : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $\ln : x \mapsto \ln(x)$ ist bijektiv.

Die Umkehrabbildung wäre

$$\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$\exp : x \mapsto e^x$$

2.4.3. Satz über Links- und Rechtsinverse

Sei $f : X \rightarrow Y$ eine Abbildung. Dann gilt

- (1) f ist genau dann injektiv, wenn es eine Abbildung $g : Y \rightarrow X$ gibt, sodass $g \circ f = Id_X$.
 g heißt **Linksinverse** von f .
- (2) f ist genau dann surjektiv, wenn es eine Abbildung $h : Y \rightarrow X$ gibt, sodass $f \circ h = Id_Y$.
 h heißt **Rechtsinverse** von f .
- (3) f ist genau dann bijektiv, wenn es eine Abbildung $g : Y \rightarrow X$ gibt, die sowohl Links- als auch Rechtsinverse von f ist. D.h. es gilt $g \circ f = Id_X \wedge f \circ g = Id_Y$, wobei g eindeutig bestimmt ist, und $g = f^{-1}$.

Nur für **bijektive** Abbildungen gibt es Umkehrabbildungen. Bei nur surjektiv oder injektiven Abbildungen existiert ein Urbild f^{-1} , eine Menge mit keinem, einem oder anderen Elementen.

2.4.4. Satz über die Verkettung bijektiver Abbildungen

Seien $f : X \rightarrow Y$ und $g : Y \rightarrow Z$ zwei bijektive Abbildungen.

Dann ist auch ihre Verkettung $g \circ f$ bijektiv und für ihre inversen Abbildungen gilt

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

2.4.5. Beweis

Für die inversen Abbildungen $f^{-1} : Y \rightarrow X$ und $g^{-1} : Z \rightarrow Y$ gilt⁷

$$\begin{aligned} f^{-1} \circ f &= Id_X & g^{-1} \circ g &= Id_Y \\ f \circ f^{-1} &= Id_Y & g \circ g^{-1} &= Id_Z \end{aligned}$$

Wegen der Assoziativität⁸ von Verknüpfungen gilt

$$\begin{aligned} (f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) & \\ &\Leftrightarrow f^{-1} \circ g^{-1} \circ g \circ f \\ &\Leftrightarrow f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f \\ &\Leftrightarrow f^{-1} \circ (Id_Y) \circ f \\ &\Leftrightarrow f^{-1} \circ f = Id_X \\ (f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) &= Id_X \end{aligned}$$

Umgekehrt gilt analog dazu

$$\begin{aligned} (g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) & \\ &\Leftrightarrow g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} \\ &\Leftrightarrow g \circ (Id_X) \circ g^{-1} \\ &\Leftrightarrow g \circ g^{-1} = Id_Z \\ (g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) &= Id_Z \end{aligned}$$

Somit gilt, falls f und g bijektiv sind, $\exists f^{-1} \wedge g^{-1}$, die eindeutig bestimmt, d.h. ebenfalls bijektiv sind.

⁷siehe Abschnitt 2.4.1

⁸siehe Abschnitt 2.2.2

$$\begin{aligned} & \exists f^{-1} \wedge g^{-1} \\ \Rightarrow & \exists f^{-1} \circ g^{-1} = (g \circ f)^{-1} \end{aligned}$$

Quod erat Demonstrandum

3. Funktionen

3.1. Grundlagen zum Funktionsbegriff

3.1.1. Zahlenmengenkriterium

Sei f eine Zuordnung von der Menge X in die Menge Y , d.h. $f : X \rightarrow Y$, wobei X, Y Zahlenmengen sind. f heißt **Funktion** genau dann, wenn jedem $x \in X$ genau ein $y \in Y$ zugeordnet wird.

3.1.2. Begriffe

- (1) Die Menge X ist der **Definitionsbereich** D_f von f . Die Elemente von X heißen **Argumente**.
- (2) Die zugeordneten Elemente aus der Menge Y heißen **Funktionswerte**. Sie bilden den **Wertebereich** W_f der Funktion. Es gilt $W_f \subseteq Y$.
- (3) Für die Funktionswerte y wird auch die Symbolik $f(x)$ verwendet, d.h. $f(x)$ ist der Funktionswert zum Argument x , z.B. $f(2) = 3$ bedeutet, dass 3 der Funktionswert des Arguments 2 ist.
- (4) Die Angabe einer Funktion mittels Funktionsterm wird entweder mit $f : f(x) = 2x + 1$ oder mit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto 2x + 1$ festgelegt.

Der Term wird bei ersterer Angabe *Funktion f : Funktionswert ist gleich Funktionsterm* gesprochen.

3.1.3. Grundlegende Funktionstypen

- (1) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Abbildung mit $f(x) = mx + n$, $m, n \in \mathbb{R}$.
Dann heißt die Abbildung **lineare Funktion**⁹. Ihr Graph¹⁰ eine Gerade.
- (2) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Abbildung mit $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.
Dann heißt die Abbildung **quadratische Funktion**¹¹. Ihr Graph ist eine nach oben oder unten geöffnete Parabel.
- (3) Sei q eine rationale Zahl.
Dann heißt die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^q$ **Potenzfunktion**. Insbesondere heißt die Funktion $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^{\frac{1}{m}} = \sqrt[m]{x}$ mit $m \in \mathbb{N}$ **Wurzelfunktion**.
- (4) Seien $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ und $p(x) := \sum_{k=0}^n a_k x^k = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ein **Polynom**.
Dann heißt die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = p(x)$ **ganzrationale Funktion**. Der höchste Exponent mit $a_k \neq 0$ heißt **Grad** von p und a_0 bis a_n heißen **Koeffizienten**.
- (5) Sind p und q ganzrationale Funktionen, so nennt man die Funktion f mit $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ eine **rationale Funktion**¹².

⁹siehe Abschnitt 3.6

¹⁰siehe Abschnitt 2.1.1

¹¹siehe Abschnitt 3.7

¹²siehe Abschnitt 3.9

Die Funktion f ist an den Nullstellen¹³ ihres Nenners q nicht definiert. Diese Nullstellen heißen **Definitionslücken** von f und gehören nicht zum Definitionsbereich.

- (6) Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ der Form $f(x) = a \cdot b^x$ mit $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, $b \neq 1$ heißt **Exponentialfunktion**, da das Argument im Exponenten steht. b heißt Basis.
- (7) Eine Funktion $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ der Form $f(x) = a \cdot \log_{b(x)}$ mit $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$, $b \neq 1$ heißt **Logarithmusfunktion** zur Basis b .
- (8) Die Funktionen $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $s(x) = \sin(x)$ und $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $c(x) = \cos(x)$ heißen **Sinusfunktion** und **Kosinusfunktion**. Des Weiteren heißt die Funktion t mit $\tan(x) = \frac{s(x)}{c(x)}$ **Tangensfunktion**. s , c und t sind die elementaren **trigonometrischen Funktionen**.

3.1.4. Nullstellen

Für eine Funktion f ist $x_N \in D_f$ eine Nullstelle von f , wenn $f(x_N) = 0$.

3.2. Symmetrie

3.2.1. Gerade Funktionen

Bei geraden Funktionen haben **Gegenzahlen** den gleichen Funktionswert.

$$f(x) = f(-x)$$

Gerade Funktionen sind **achsensymmetrisch**.

3.2.2. Beispielbeweis

Betrachten wir die Funktion $f(x) = x^4 - 3$.

$$\begin{aligned} f(x) &= f(-x) \\ (-x)^4 - 3 &= x^4 - 3 \\ ((-x)(-x))^2 - 3 &= x^4 - 3 \\ (x^2)^2 - 3 &= x^4 - 3 \\ x^4 - 3 &= x^4 - 3 \end{aligned}$$

Quod erat Demonstrandum

Die Funktion f ist achsensymmetrisch und gerade.

3.2.3. Ungerade Funktionen

Bei ungeraden Funktionen haben Gegenzahlen Gegenzahlen als Funktionswerte.

$$f(x) = -f(-x)$$

Ungerade Funktionen sind **punktsymmetrisch**.

3.2.4. Exponentenkriterium für Symmetrie ganzrationaler Funktionen

Wir betrachten die Funktionsgleichung **ganzrationaler Funktionen** in Polynomform.

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

- (1) Hat x in der Funktionsgleichung nur gerade Exponenten, so ist die Funktion **gerade** und **achsensymmetrisch**, denn es gilt

¹³siehe Abschnitt 3.1.4

$$\forall x \in D_f : f(x) = f(-x)$$

(2) Hat x in der Funktionsgleichung nur ungerade Exponenten, so ist die Funktion ungerade und punktsymmetrisch, denn es gilt

$$\forall x \in D_f : f(x) = -f(-x)$$

3.2.5. Beweis für Achsensymmetrie

$$(-x)^{2n} = ((-x)^2)^n = x^{2n}$$

$$f(x) = a_{2n}x^{2n} + a_{2(n-1)}x^{2(n-1)} + \dots + a_0x^0$$

$$f(-x) = a_{2n}(-x)^{2n} + a_{2(n-1)}(-x)^{2(n-1)} + \dots + a_0(-x)^0$$

$$\begin{aligned} f(-x) &= a_{2n}x^{2n} + a_{2(n-1)}x^{2(n-1)} + \dots + a_0x^0 \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Quod erat Demonstrandum

3.3. Verhalten

3.3.1. Monotonie

Eine Funktion f ist streng monoton fallend, genau dann wenn

$$\forall x_1, x_2 \in D_f : x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

3.3.2. Globalverhalten

Sei f eine Funktion. Das **Globalverhalten** von f beschreibt das Verhalten der Funktionswerte, wenn die Argumente unendlich groß oder unendlich klein werden.

3.3.3. Globalverhalten bei ganzrationalen Funktionen

Der Graph¹⁴ einer ganzrationalen Funktion f mit $f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$ mit $a_n \neq 0$ verhält sich für $x \rightarrow \pm\infty$ wie der Graph von g mit $g(x) = a_nx^n$.

3.3.4. Beweis

Sei f mit $f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$ mit $a_n \neq 0$ eine ganzrationale Funktion. Dann gilt mit $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{x^n} = 0$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \frac{a_{n-2}}{x^2} + \dots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n} \right) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} (x^n(a_n)) = \lim_{x \rightarrow \infty} a_nx^n \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \end{aligned}$$

Quod erat Demonstrandum

3.4. Verschiebung

3.4.1. Verschiebung einer Funktion in y -Richtung

Um eine beliebige Funktion $f(x)$ um c Einheiten in y -Richtung zu verschieben, sei die verschobene Funktion $f^*(x) = f(x) + c$.

3.4.2. Verschiebung einer Funktion in x -Richtung

Um eine beliebige Funktion $f(x)$ um d Einheiten in x -Richtung zu verschieben, sei die verschobene Funktion $f^*(x) = f(x - d)$.

3.5. Grenzwerte

3.5.1. Syntax und Semantik

Betrachten wir $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

Γ_f , der Graph¹⁴ von f , verläuft für $x \rightarrow \infty$ gegen $y = 1$ und für $x \rightarrow -\infty$ gegen $y = \infty$. Um das kurz und knapp auszudrücken, wird die *Limes*-Schreibweise¹⁵ verwendet.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$$

Der *Limes* von $f(x)$ für x gegen unendlich ist 1. D.h., dass sich die Funktionswerte für sehr große x -Werte beliebig nah an $y = 1$ annähern, diesen aber nicht unbedingt erreichen.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$$

3.5.2. Grenzwerte für Funktionen

Sind $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ Funktionen und existieren¹⁶ ihre Grenzwerte $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ und $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = c$, dann gilt Folgendes.

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) + g(x)) = b + c$
- (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) \cdot g(x)) = b \cdot c$, falls $b, g \neq 0$.
- (3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{b}{c}$
- (4) $\lim_{x \rightarrow \infty} (a \cdot f(x)) = a \cdot b$

3.5.3. Lokales Grenzwertverhalten

Für $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ mit $x_0 \in D$ existieren ein linksseitiger und ein rechtsseitiger Grenzwert.

Der linksseitige Grenzwert nähert sich von **links nach rechts** an und hat verschiedene Darstellungsmöglichkeiten.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ mit } x < x_0 \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) \\ &= \lim_{x \nearrow x_0} f(x) \end{aligned}$$

Der rechtsseitige Grenzwert nähert sich von **rechts nach links** an und hat verschiedene Darstellungsmöglichkeiten.

¹⁴siehe Abschnitt 2.1.1

¹⁵siehe römisches Germanien

¹⁶konvergieren nicht gegen Unendlich, sondern gegen eine Zahl

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ mit } x > x_0 \\
&= \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) \\
&= \lim_{x \searrow x_0} f(x)
\end{aligned}$$

Zur Berechnung nutzt man eine konvergente Folge¹⁷.

$$(x_n) : x_n = x_0 + \frac{1}{n} \text{ für } x > x_0$$

$$(x_n) : x_n = x_0 - \frac{1}{n} \text{ für } x < x_0$$

Danach ersetzt man in der Grenzwertberechnung jedes Argument x durch die Folge.

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x)$$

3.5.4. Beispiel

Betrachten wir $f(x) = x^2$ und $x_0 = 2$.

Zuerst berechnen wir den linksseitigen Grenzwert.

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{n}\right)^2 \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(4 - \frac{4}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \\
&= 4
\end{aligned}$$

Nun kann man ihn auch rechtsseitig bestimmen.

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} x^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right)^2 \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(4 + \frac{4}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \\
&= 4
\end{aligned}$$

3.5.5. Satz für die Stetigkeit

Eine Funktion $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ ist in $x_0 \in D_f$ genau dann stetig, wenn links- und rechtsseitiger Grenzwert existieren und mit dem Funktionswert von x_0 übereinstimmen.

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

Nehmen wir das Beispiel aus Abschnitt 3.5.4.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$$

Somit ist f stetig.

3.5.6. Unstetigkeitsstelle

Ist eine Funktion f aus der Stelle $x_0 \in D_f$ nicht stetig, so heißt x_0 Unstetigkeitsstelle.

¹⁷siehe Abschnitt 4

TL;DR

Ist x_0 nicht stetig, so ist x_0 nicht stetig.

Es wird zwischen Unstetigkeitsstellen **erster** und **zweiter Art** unterschieden.

1. x_0 ist eine Unstetigkeitsstelle **erster Art**, falls links- und rechtsseitiger Grenzwert existieren und endlich sind, aber nicht mit dem Funktionswert an der Stelle x_0 übereinstimmen.

Falls links- und rechtsseitiger Grenzwert übereinstimmen wird x_0 als **hebbare Unstetigkeitsstelle** bezeichnet, da die Stelle durch Änderung von $f(x_0)$ stetig werden kann.

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq f(x_0)$$

Falls links- und rechtsseitiger Grenzwert nicht übereinstimmen wird x_0 als **Sprungstelle** (mit Sprung σ) bezeichnet, da die Funktion sinnbildlich springt.

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq f(x_0) \quad \sigma = \left| \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \right|$$

2. x_0 ist eine Unstetigkeitsstelle **zweiter Art**, falls mindestens der links- oder der rechtsseitige Grenzwert nur **uneigentlich** oder **gar nicht** existieren.

3.6. Lineare Funktionen

3.6.1. Funktionsgleichung

Ist f eine ganzrationale Funktion 1. Grades, so wird sie auch **lineare Funktion** genannt. Ihr Graph ist eine **Gerade**.

Ihre Funktionsgleichung lautet $f(x) = mx + n$ mit $m, n \in \mathbb{R}$, wobei m die **Steigung** der Geraden und $Y(0|n)$ der Schnittpunkt mit der y -Achse ist.

3.6.2. Steigung linearer Funktionen

Seien f und g zwei lineare Funktionen mit den Steigungen m_f und m_g . Dann gilt

- 1) Die Graphen¹⁴ von f und g sind genau dann **parallel** zueinander, wenn $m_f = m_g$.
- 2) Die Graphen von f und g sind genau dann **orthogonal** zueinander, wenn $m_f \cdot m_g = -1$ gilt.

Falls man die Steigung einer Geraden g berechnen wollte, die **orthogonal** zur Geraden f ist, kann man diese Formel umstellen.

$$m_f \cdot m_g = -1 \quad | \div m_f$$
$$m_g = -\frac{1}{m_f} = -(m_f)^{-1}$$

3.6.3. Beweis

Seien f und g zwei lineare Funktionen mit den Steigungen m_f und m_g .

- 1) Wir nehmen an, dass f und g genau einen Schnittpunkt besitzen. Dann $\exists! x \in D_f \cap D_g : f(x) = g(x)$

$$\begin{aligned}
 f(x) &= g(x) \\
 m_f x + n_f &= m_g x + n_g && \text{mit } m_f = m_g = m \\
 mx + n_f &= mx + n_g && | - mx \\
 n_f &= n_g
 \end{aligned}$$

Für $n_f \neq n_g$ gilt $\nexists x \in D_f \cap D_g : f(x) = g(x)$. Zwei Geraden, die keinen gemeinsamen Punkt haben, sind **parallel**.

Für $n_f = n_g$ gilt $\forall x \in D_f \cap D_g : f(x) = g(x)$. Zwei Geraden, die unendlich viele gemeinsame Punkte haben, sind **identisch**.

Quod erat Demonstrandum

- 2) Ohne Beschränkung der Allgemeinheit¹⁸ legen wir fest, dass sich f und g im Ursprung unter einem rechten Winkel treffen.
- Es gilt $m_f = \frac{\Delta y}{\Delta x}$, wobei Δx und Δy die Katheten eines Steigungsdreiecks von f sind.
 - Dreht man die Gerade f samt Steigungsdreieck um 90° um den Ursprung, so erhält man die Gerade g , mit kongruentem Steigungsdreieck und $m_g = \frac{\Delta x}{-\Delta y}$.
 - Es folgt $m_f \cdot m_g = \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \frac{\Delta x}{-\Delta y} = -1$

3.7. Quadratische Funktionen

3.7.1. Definition

Eine quadratische Funktion ist eine ganzrationale Funktion 2. Grades mit der **allgemeinen Form**

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Der Graph¹⁴ ist eine nach oben oder unten geöffnete Parabel. Maßgeblich für die Lage der Parabel ist ihr **Scheitelpunkt**. Dessen Koordinaten $S(x_S \mid y_S)$ lassen sich direkt aus der **Scheitelpunktform** der Funktionsgleichung ablesen

$$f(x) = a(x - x_S)^2 + y_S$$

3.7.2. Nullstellen quadratischer Funktionen

- (1) Die Nullstellen¹⁹ einer quadratischen Funktion in Normalform $f(x) = x^2 + px + q$ können mit der pq -Formel bestimmt werden.

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

- (2) Sind x_1 und x_2 Nullstellen der Funktion f mit $f(x) = ax^2 + bx + c$, so lässt sich der Funktionsterm in **faktorisierter Form** schreiben.

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Die Nullstellen lassen sich direkt aus den **Linearfaktoren** $(x - x_1)$ und $(x - x_2)$ ablesen.

3.7.3. Satz von Vieta

Sind x_1 und x_2 Lösungen der Gleichung $0 = x^2 + px + q$, dann gilt

¹⁸Nur gewisse Fälle werden aufgezeigt, da die restlichen Fälle *trivial* sind.

¹⁹siehe Abschnitt 3.1.4

$$x_1 + x_2 = -p \quad x_1 \cdot x_2 = q$$

3.7.4. Beweis

Seien $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$ die beiden Lösungen der quadratischen Gleichung $x^2 + px + q = 0$. Dann gilt

- für die Summe der Nullstellen

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \left(-\frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}\right) + \left(-\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}\right) \\ &= -\frac{p}{2} - \frac{p}{2} = -p \end{aligned}$$

Quod erat Demonstrandum

- für das Produkt der Nullstellen

$$\begin{aligned} x_1 \cdot x_2 &= \left(-\frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}\right) \cdot \left(-\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}\right) \\ &= \left(\frac{p}{2}\right)^2 - \left(\sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}\right)^2 \quad \text{dritte binomische Formel} \\ &= \left(\frac{p}{2}\right)^2 - \left(\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q\right) = q \end{aligned}$$

Quod erat Demonstrandum

Alternativ lassen sich diese Zusammenhänge auch mit dem Ausmultiplizieren der faktorisierten Form aufzeigen.

Somit gilt auch, dass **ganzzahlige Nullstellen Teiler** von q sein²⁰ müssen und die **Summe der Nullstellen die Gegenzahl** von p sein muss.

3.8. Ganzrationale Funktionen

3.8.1. Fundamentalsatz der Algebra für reelle Zahlen

Sei $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ mit $a_n \neq 0$ ein Polynom n -ten Grades. Dann hat f höchstens n Nullstellen $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$.

3.8.2. Beweis

Induktionsanfang²¹

Ist $n = 1$, dann ist $f_1(x) = a_1 x + a_0$. f_1 hat genau eine Nullstelle.

$$x_N = -\frac{a_0}{a_1}$$

²⁰siehe Abschnitt 3.8.9

²¹siehe Abschnitt 5.1.4

Induktionsvoraussetzung

Es gelte, dass f ein Polynom n -ten Grades ist. Dieses hat höchstens n Nullstellen.

Induktionsbehauptung

Ein Polynom vom Grad $n + 1$ hat höchstens $n + 1$ Nullstellen.

Nun folgt die Argumentation.

1. f hat keine reelle Nullstelle. Folglich hat f höchstens $n + 1$ Nullstellen.
2. f hat mindestens eine reelle Nullstelle x_N . Diese kann nach dem Abspaltungssatz²² abgespalten werden.

$$f(x) = (x - x_N) \cdot g(x)$$

g ist ein Polynom n -ten Grades und hat somit höchstens n Nullstellen²³. Zusammen mit der abgespaltenen Nullstelle ergibt dies $n + 1$ Nullstellen.

Quod erat Demonstrandum

3.8.3. Satz zur Abspaltung von Linearfaktoren

Sei f eine ganzrationale Funktion n -ten Grades.

Wenn $x_N \in \mathbb{R}$ eine Nullstelle von f ist, dann gilt $f(x) = (x - x_N) \cdot g(x)$, wobei g eine ganzrationale Funktion $(n - 1)$ -Grades ist.

Wenn f in Polynomform²⁴ vorliegt, dann ist das Polynom ohne Rest durch den $(x - x_N)$ Linearfaktor teilbar. Das Ergebnis ist g .

3.8.4. Beweis

siehe Skript

3.8.5. Zerlegung in Linearfaktoren

Sei f ein Polynom n -ten Grades. f kann genau dann in die Form $f(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdot \dots \cdot (x - x_m) \cdot f_{n-m}(x)$ zerlegt werden, wenn f genau m Nullstellen hat (die nicht alle verschieden sein müssen)²⁵.

Dabei ist f_{n-m} ein Restpolynom vom Grad $n - m$, das keine weiteren Nullstellen hat.

3.8.6. Vielfachheit von Nullstellen

Die Vielfachheit von Nullstellen gibt an, wie oft eine Nullstelle in einem Polynom auftritt.

Die Vielfachheit wirkt sich auf den Graphen aus.

3.8.7. Beispiel

Im Polynom $f(x) = \frac{1}{2}(x - 3)^3(x + 4)$ hat die Nullstelle 3 eine Vielfachheit von 3, weil sie dreimal vorkommt.

²²siehe Abschnitt 3.8.3

²³siehe Induktionsvoraussetzung

²⁴ $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

²⁵siehe Abschnitt 3.8.6

3.8.8. Bemerkung

Ist f so weit wie möglich faktorisiert, dann lässt sich die Vielfachheit einer Nullstelle ablesen am Exponenten des zugehörigen Linearfaktors.

3.8.9. Teilerkriterium für Nullstellen ganzrationaler Funktionen

Sei f mit $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ eine ganzrationale Funktion mit ausschließlich ganzzahligen Koeffizienten $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0 \in \mathbb{Z}$.

Sei x_N mit $x_N \in \mathbb{Z}$ eine Nullstelle von f , dann ist x_N Teiler des absoluten Glieds a_0 .²⁶

3.8.10. Beweis

Sei $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, wobei $\forall n \in \mathbb{N} a_n \in \mathbb{Z}$.

$$f(x_N) = 0$$

$$a_n x_N^n + a_{n-1} x_N^{n-1} + \dots + a_1 x_N + a_0 = 0 \quad | -a_0$$

$$a_n x_N^n + a_{n-1} x_N^{n-1} + \dots + a_1 x_N = -a_0$$

$$x_N (a_n x_N^{n-1} + a_{n-1} x_N^{n-2} + \dots + a_1) = -a_0$$

$$x_N \in \mathbb{Z} \quad (a_n x_N^{n-1} + a_{n-1} x_N^{n-2} + \dots + a_1) \in \mathbb{Z} \quad \text{folglich } -a_0 \in \mathbb{Z}$$

Quod erat Demonstrandum

Durch bloße Multiplikation und Addition auf der einen Seite ist klar, dass $-a_0$ und somit a_0 nur ganzzahlig sein kann.

3.9. Rationale Funktionen

3.9.1. Zusammensetzung

Es seien $z : z(x) = \sum_{i=0}^k a_i x^i$ und $n : n(x) = \sum_{j=0}^l b_j x^j$ ganzrationale Funktionen²⁷ mit reellen Koeffizienten a_i bzw. b_j und $a_k \neq 0$ bzw. $b_l \neq 0$. Die Funktion f heißt **rationale Funktion** $f : f(x) = \frac{z(x)}{n(x)}$ mit $n \neq 0$.

3.9.2. Begriffsnutzungen

- (1) z wird **Zählerfunktion** mit dem **Zählergrad** k und n wird **Nennerfunktion** mit dem **Nennergrad** l genannt.
- (2) Ist $l = 0$ oder lässt sich $f(x)$ zu einem ganzrationalen Term mit **Definitionslücke** umformen, so ist die rationale Funktion eine ganzrationale Funktion²⁷.

$$f(x) = \frac{2x^3 - 4x^2 + 1}{2x^0} = x^3 - 2x^2 + \frac{1}{2}$$

- (3) Der Definitionsbereich²⁸ einer rationalen Funktion ist $D_f = \mathbb{R} \setminus \{x_N \mid n(x_N) = 0\}$.

TL;DR

An der Stelle, an der die Nennerfunktion eine Nullstelle hat, existiert eine Definitionslücke.

²⁶siehe Lemma von Gauß

²⁷siehe Abschnitt 3.8

²⁸siehe Abschnitt 3.1.2

(4) Ist $l \neq 0$, so ist f eine **rationale** Funktion.

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^3 - x} \text{ mit } D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1; 0; 1\}$$

(5) Sind $l \neq 0$ und $k < l$, so ist f eine **echt gebrochene rationale** Funktion.

TL;DR

Unter dem Bruch steht ein größerer Exponent.

$$f(x) = \frac{x + 11}{x^3 + 8} \text{ mit } D_f \setminus \{-2\}$$

(6) Sind $l \neq 0$ und $k > l$, so ist f eine **unecht gebrochene rationale** Funktion. Der Funktionsterm jeder unecht gebrochenen rationalen Funktion kann unter Verwendung der Linearfaktorzerlegung als Summe eines ganzrationalen und echt gebrochenen rationalen Funktionsterms geschrieben werden.

TL;DR

Unter dem Bruch steht ein kleinerer Exponent.

$$f(x) = \frac{2x^3 - x^2 + 2}{x^2 - x} = 2x + \frac{2}{x^2 - x} \text{ mit } D_f = \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$$

3.9.3. Besonderheiten

Die besonderen Stellen einer rationalen Funktion hängen von den Nullstellen der Zähler- und Nennerfunktion ab.

1. Wenn x_N **Nullstelle der Nennerfunktion** ist, aber nicht der Zählerfunktion, dann ist x_N eine **Polstelle**.

Falls die Vielfachheit der Nullstelle x_N bei der Nennerfunktion und der Zählerfunktion verschieden ist, aber x_N eine **größere Vielfachheit in der Nennerfunktion** hat, so ist x_N auch eine Polstelle.

2. Falls x_N mit gleicher Vielfachheit²⁹ **Nullstelle der Nennerfunktion als auch der Zählerfunktion** ist, so ist x_N eine **hebbare Definitionslücke**.

Falls die Vielfachheit der Nullstelle x_N bei der Nennerfunktion und der Zählerfunktion verschieden ist, aber x_N eine **größere Vielfachheit in der Zählerfunktion** hat, so ist x_N auch hebbare Definitionslücke.

4. Folgen

4.1. Der Folgenbegriff

4.1.1. Folgen

Eine Funktion³⁰, deren Definitionsbereich die Menge der natürlichen Zahlen ist, heißt **Zahlenfolge**, kurz **Folge**.

4.1.2. Notation

Im Allgemeinen wird die Zuordnungsvorschrift in Form einer Gleichung gegeben.

²⁹siehe Abschnitt 3.8.6

³⁰siehe Abschnitt 3.1.1

$$(a_n) : a_n = 3n - 4$$

(a_n) ist die Folgenbezeichnung.

n ist der Folgenindex, die Indexpzahl, mit $n \in \mathbb{N}$, wobei zumeist $n \geq 1$ n das Argument.

a_n ist das n -te Folgenglied, d.h. der Funktionswert zum Argument³¹ n . In der üblichen Notation von Funktionen sollte a_n besser als $a(n)$ geschrieben werden.

$3n - 4$ ist Term für die Berechnung des n -ten Folgengliedes.

4.1.3. Rekursion und Explikation

Wird die Zuordnungsvorschrift einer Folge mit einem expliziten Term, z.B. $3n - 4$, dann spricht man von einer **expliziten** Bildungsvorschrift.

Die Folge könnte aber auch durch eine **rekursive** Bildungsvorschrift gegeben sein. Dann bediene man sich jener Form.

$$(a_n) : a_1 = -1 \wedge a_n = a_{n-1} + 3$$

TL;DR

Wenn das Berechnen mit **einfachem** Rechenaufwand verbunden ist, der Term also nicht auf vorhergehende oder nachfolgende Folgenglieder zurückgreift, dann ist die Bildungsvorschrift **explizit**.

Wenn der Bildungsterm auf vorhergehende oder nachfolgende Folgenglieder zurückgreift, dann ist die Zuordnungsvorschrift **rekursiv**.

4.2. Verschiedene Folgen

4.2.1. Geometrische Folgen

Eine Folge (a_n) heißt geometrisch, wenn $\exists q \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\} \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$

Es gibt genau ein $q \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$, sodass für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$. Oder anders gesagt

$$a_{n+1} = q \cdot a_n$$

Für jede geometrische Folge (a_n) gilt $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$, weil $a_1 = a_1 \cdot q^0$, weil q^0 für $q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ immer 1 wäre.

$$a_1 = a_1 \cdot q^0$$

$$a_2 = a_1 \cdot q^1$$

$$a_3 = a_2 \cdot q^1 = a_1 \cdot q^2$$

...

4.2.2. Konstante Folgen

q ³² darf nicht 1 oder 0 sein und a_1 nicht 0, denn folglich wäre $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+1} = a_n$.

Solche Folgen nennen wir **konstante Folgen**.

³¹ siehe Abschnitt 3.1.2

³² siehe Abschnitt 4.2.1

4.2.3. Alternierende Folgen

Folgen, deren aufeinanderfolgende Folgenglieder unterschiedliche Vorzeichen besitzen, nennen wir **alternierend**.

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : a_n \cdot a_{n+1} < 0$$

4.3. Monotonieverhalten

4.3.1. Strenge Monotonie

Eine Folge (a_n) , deren nächstes Folgeglied immer größer ist als das vorhergehende, nennt man **streng monoton steigend**.

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n < a_{n+1}$$

Nicht streng monoton steigend sind jedoch alle Folgen, für die gilt

$$\exists n \in \mathbb{N} : a_n \geq a_{n+1}$$

Wenn das nächste Folgeglied immer kleiner ist als das vorhergehende, dann nennt man sie analog dazu **streng monoton fallend**.

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n > a_{n+1}$$

Nicht streng monoton fallend sind jedoch alle Folgen, für die gilt

$$\exists n \in \mathbb{N} : a_n \leq a_{n+1}$$

4.3.2. Beispielbeweis

Betrachten wir die Folge $(c_n) : c_n = \frac{n-1}{n}$ mit $n \in \mathbb{N} \wedge n \geq 1$. Dazu gehen wir zuerst von einer streng monotonen Steigung aus und stellen dann um.

$$\begin{array}{rcl} c_n & < & c_{n+1} \\ \frac{n-1}{n} & < & \frac{n}{n+1} \quad | \cdot n \\ n-1 & < & \frac{n^2}{n+1} \quad | \cdot (n+1) \\ n^2-1 & < & n^2 \quad | - n^2 \\ -1 & < & 0 \quad \text{wahr für alle } n \in \mathbb{N} \end{array}$$

Quod erat Demonstrandum

4.3.3. Einfache Monotonie

Folgen, die auch aufeinanderfolgende gleiche Folgeglieder aufweisen, sonst allerdings monoton steigen oder fallen, nennt man **monoton steigend** bzw. **monoton fallend**.

$$\begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq a_{n+1} \\ \text{bzw. } \forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq a_{n+1} \end{array}$$

4.4. Teilfolgen

4.4.1. Folgen mit Systematik

In Abschnitt 4.3.2 könnten bezüglich der Folge $(c_n) : c_n = \frac{n-1}{n}$ systematisch Folgenglieder „herausgegriffen“ werden, z.B. $c_1, c_{10}, c_{100}, \dots, c_{10^{k-1}}$.

Diese Folgenglieder kann man als Neue Folge auffassen, die ein Teil der Folge (c_n) ist.

4.4.2. Definition

Die Folge (t_n) ist Teilfolge der Folge (a_n) .

Ist n_i mit $(i = 1; 2; \dots; k \in \mathbb{N} \setminus \{0\})$ eine streng monoton wachsende Folge natürlicher Zahle, so heißt $(a_{n_i}) = (t_n)$ Teilfolge von (a_n) .

4.4.3. Teilfolgensatz

Jede Folge (a_n) besitzt eine monotone Teilfolge.

4.4.4. Beweis

Sei eine Gipfelstelle die Indexzahl n , sodass $\forall m, n \in \mathbb{N} : m \geq n : a_n \geq a_m$.

TL;DR

Alle nachfolgenden Folgenglieder a_m sind kleiner als a_n bzw. nach a_n kommt kein Folgenglied, das größer ist als a_n .

Nun lässt sich eine Fallunterscheidung durchführen.

I. Es gibt unendlich viele Gipfelstellen.

Nummeriert man die Gipfelstellen in der Reihenfolge ihres Auftretens, folgt

$$a_{n_1} \geq a_{n_2} \geq a_{n_3} \geq \dots$$

D.h. die Gipfelstellen bilden eine monoton fallende³³ Teilfolge.

II. Es gibt endlich viele Gipfelstellen.

Sei n_L die letzte Gipfelstelle. Wir betrachten a_{n_L} . Dann gilt $a_{n_L} > a_{n_L+1}$

Da a_{n_L} die letzte Gipfelstelle war, sind alle nachfolgenden Folgenglieder keine Gipfelstellen, d.h. für jedes dieser Folgenglieder a_n^* gibt es mindestens ein Folgenglied a_n^{**} mit $a_n^* < a_n^{**} < a_{n_L}$.

D.h. wir erhalten eine monoton steigende Folge.

$$a_{n_L+1} < a_{n_L+1}^* < a_{n_L+1}^{**} < \dots$$

Quod erat Demonstrandum

4.5. Beschränktheit von Folgen

4.5.1. Schranken

In Abschnitt 4.3.2 wurde die Folge $(c_n) : c_n = \frac{n-1}{n}$ betrachtet.

Man kann „beobachten“, dass $\forall n \in \mathbb{N} : 0 \leq c_n < 1$, d.h. die Folgenglieder unter- und überschreiten einen bestimmten Wert nicht.

³³siehe Abschnitt 4.3.3

4.5.2. Untere und obere Schranken, Maxi- und Minima

1. Eine reelle Zahl u heißt **untere Schranke** der Folge (a_n) , wenn für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $u \leq a_n$.
2. Eine reelle Zahl o heißt **obere Schranke** von (a_n) , wenn $\forall n \in \mathbb{N} : o \geq a_n$.
3. Eine reelle Zahl $\min a_n$ heißt **Minimum** von (a_n) , wenn es ein $k \in \mathbb{N}$, so dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\min a_n = a_k \leq a_n$.
4. Eine reelle Zahl $\max a_n$ heißt **Maximum** von (a_n) , wenn $\exists k \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N} : \max a_n = a_k \geq a_n$.

4.5.3. Beispiel

Betrachten wir die Folge $(a_n) : a_n = -\frac{4n}{n+2}$. Zunächst benötigt man eine Vermutung. Dazu werden einige Folgenglieder berechnet.

$$\begin{aligned}a_1 &= -\frac{4 \cdot 1}{1+2} = -\frac{4}{3} \\a_{10} &= -\frac{4 \cdot 10}{10+2} = -\frac{40}{12} \\a_{100} &= -\frac{4 \cdot 100}{100+2} = -\frac{400}{102}\end{aligned}$$

Man kann beobachten, dass sich die Folge mit wachsendem Argument an -4 annähert. Darum vermuten wir zunächst **eine** untere Schranke bei -4

$$\begin{aligned}-4 &\leq a_n \\-4 &\leq -\frac{4n}{n+2} \quad | \cdot (n+2) \\-4(n+2) &\leq -4n \\-4n-8 &\leq -4n \quad | +4n \\-8 &\leq 0 \quad \text{wahr für alle } n \in \mathbb{N}\end{aligned}$$

Quod erat Demonstrandum

4.5.4. Vielschrankensatz

Falls eine Folge (a_n) eine untere Schranke besitzt, so besitzt sie unendlich viele.

4.5.5. Beweis

Sei $u \leq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Wähle $x \in \mathbb{R}$ mit $x < u$.

D.h. $x < u \leq a_n$, folgt $x \leq a_n$ und somit existieren unendlich viele untere Schranken.

4.5.6. Suprema und Infima

Die größte untere Schranke³⁴ nennt man **untere Grenze** oder *Infimum* $\inf a_n$ der Folge (a_n) . Die kleinste obere Schranke nennt man **obere Grenze** oder *Supremum* $\sup a_n$ der Folge (a_n) .

TL;DR

Eine reelle Zahl i ist genau dann ein *Infimum* der Folge (a_n) , wenn

1. $\forall n \in \mathbb{N} : i \leq a_n$, also i eine untere Schranke ist.

³⁴siehe Abschnitt 4.5.2

2. $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} : i + \varepsilon > a_n$, es also die größte untere Schranke ist.

4.5.7. Schritte zum Nachweis

Die beliebige Folge (a_n) besitzt die untere Grenze $\inf a_n$. Es sei $k \in \mathbb{R}$ mit $\inf a_n < k$.

4.5.8. Beispielnachweis

Betrachten wir die Folge $(b_n) : b_n = \frac{6n-1}{4n}$ mit $n \geq 1$.

Zuerst äußern wir die Vermutung, dass das *Supremum* bei $\sup b_n = \frac{3}{2}$ liegt. Zuerst muss bewiesen werden, dass $\sup b_n$ eine obere Schranke ist. Danach, dass es ein *Supremum* ist.

1. $\sup b_n$ ist eine obere Schranke.

Sei $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} \frac{3}{2} &\geq \frac{6n-1}{4n} && | \cdot 4n \\ \frac{12}{2}n &\geq 6n-1 \\ 6n &\geq 6n-1 && | -6n \\ 0 &\geq -1 && \text{wahr für alle } n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Quod erat Demonstrandum

2. $\sup b_n$ ist ein *Supremum*.

Sei $\varepsilon > 0$.

$$\begin{aligned} b_n &> \sup b_n - \varepsilon \\ \text{D.h. } \frac{6n-1}{4n} &> \frac{3}{2} - \varepsilon && | \cdot 4n \\ 6n-1 &> 6n-4n\varepsilon && | -6n \\ -1 &> -4n\varepsilon && | \div \varepsilon \\ -\frac{1}{\varepsilon} &> -4n && | \cdot (-1) \\ \frac{1}{\varepsilon} &< 4n && | \div 4 \\ \frac{1}{4\varepsilon} &< n \end{aligned}$$

Quod erat Demonstrandum

Aufgrund der Unendlichkeit der natürlichen Zahlen immer eine natürliche Zahl für die gilt $\frac{1}{4\varepsilon} < n$. Somit ist diese Aussage wahr.

Dementsprechend ist $\frac{3}{2}$ das *Supremum* der Folge (b_n) .

4.5.9. Supremumsaxiom

Im Bereich der **reellen** Zahlen besitzt jede nach oben beschränkte Folge ein Supremum.

4.6. Grenzwerte

4.6.1. Grenzwert einer Folge

Eine reelle Zahl g heißt **Grenzwert** der Folge (a_n) , falls für jedes $\varepsilon > 0$ ab einer bestimmten Indexzahl n_0 alle Folgenglieder in der Epsilonumgebung $]g - \varepsilon; g + \varepsilon[$ liegen.

Oder alternativ:

Für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass für alle $n > n_0$ gilt: $|a_n - g| < \varepsilon$.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n > n_0 : |a_n - g| < \varepsilon$$

4.6.2. Grenzwerte konstanter Folgen

Sei $(a_n) : a_n = c$ mit $c \in \mathbb{R}$ eine konstante Folge³⁵. Dann gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c = c$$

4.6.3. Geometrische Nullfolgen

Jede geometrische Folge³⁶ $(a_n) : a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ ist für alle q mit $|q| < 1$ eine **Nullfolge**.

4.6.4. Beweis

Seien $\varepsilon > 0$, $n \in \mathbb{N}$ und $|q| < 1$.

$$\begin{aligned} |a_n - 0| &= |a_n| = |a_1 \cdot q^{n-1}| < \varepsilon \\ |a_1| \cdot |q|^{n-1} &= |a_1| \cdot |q| \cdot \frac{|q|^{n-1}}{|q|} = \frac{|a_1|}{|q|} \cdot |q|^n < \varepsilon \\ |q|^n &< \varepsilon \cdot \frac{|q|}{|a_1|} & | \div | \frac{|a_1|}{|q|} | \\ |q|^n &< \varepsilon \cdot \frac{|q|}{|a_1|} & | \log_{|q|}(\dots) \\ n &> \log_{|q|} \left(\varepsilon \cdot \frac{|q|}{|a_1|} \right) \end{aligned}$$

Das Relationszeichen wurde umgedreht, weil $0 < |q| < 1$ und somit die Logarithmusgesetze³⁷ dies verlangen.

Aufgrund der Unendlichkeit der natürlichen Zahlen finden wir immer ein $n \in \mathbb{N}$, für das diese Bedingung stimmt.

4.6.5. Bestimmte Divergenz

(a_n) ist **bestimmt divergent**, falls $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty := \forall k \in \mathbb{R}^+ \exists n \in \mathbb{N} : a_n > k$$

Die Folge (a_n) ist bestimmt divergent genau dann, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 0$, (a_n) also eine **Nullfolge** ist.

4.6.6. Beschränkungskonvergenzsatz

Sei (a_n) eine Folge.

³⁵siehe Abschnitt 4.2.2

³⁶siehe Abschnitt 4.2.1

³⁷ $x_1 < x_2 \Leftrightarrow \log_a(x_1) > \log_a(x_2)$

Wenn (a_n) nicht beschränkt ist, so ist (a_n) nicht konvergent.

TL;DR

Wenn (a_n) konvergent ist, so ist (a_n) beschränkt.

5. Beweise

5.1. Beweistechniken

5.1.1. Hinrichtung und Rückrichtung

Beweise können *Genau dann, wenn ...* Aussagen, die in zwei Richtungen funktionieren, sein.

5.1.2. Satz vom Nullprodukt als Beispiel

$a \cdot b = 0$ für $a, b \in \mathbb{R}$ gilt genau dann, wenn $a = 0 \vee b = 0$.

Hinrichtung³⁸ „ \Rightarrow “

1. Wir nehmen an, dass $a \cdot b = 0$. Sei nun $a \neq 0$. Jetzt können wir durch Null teilen.

$$\begin{array}{rcl} a \cdot b = 0 & | : a \\ b = 0 \end{array}$$

2. Analog gilt dies auch für $b \neq 0$.

Es folgt, dass wenn $a \cdot b = 0$, muss mindestens einer der Faktoren a oder b Null sein.

Rückrichtung „ \Leftarrow “

1. Wir nehmen an, dass $a = 0$. Somit gilt

$$a \cdot b = 0 \cdot b = 0$$

2. Analog gilt dies für $b = 0$.

Es folgt, dass wenn mindestens einer der Faktoren Null ist, dann ist auch das Produkt Null.

Quod erat Demonstrandum

5.1.3. Aufbau

Wenn A , dann B .

A ist die **Vorraussetzung**, unter der B gilt. B ist somit die **Behauptung**.

Nun folge die **Argumentation**.

5.1.4. Beweis durch vollständige Induktion

Bei einer vollständigen Induktion wird zunächst ein **Induktionsanfang** definiert.³⁹ Hier wird die Wahrheit der Aussage anhand eines Beispiels demonstriert.

Danach folgt die **Induktionsvoraussetzung**, in der die Aussage als wahr vorausgesetzt wird.

³⁸siehe revolutionäres Frankreich

³⁹siehe Abschnitt 3.8.2

Diese wird dann in der **Induktionsbehauptung** benutzt, um die Aussage zu beweisen.