

思考：判断下列命题是否正确：

- (1) 若 A, B 均为 n 阶正定矩阵，则 $A + B$ 也是正定矩阵；
- (2) 若 A, B 均为 n 阶正定矩阵，则 $A^{-1} + B^{-1}$ 也是正定矩阵；
- (3) 设 A, B 均为 n 阶正定矩阵，则 AB 也是正定矩阵；
- (4) 若实矩阵 B 与正定矩阵 A 合同，则 B 也是正定矩阵；
- (5) 若 A 是正定矩阵，则 A 的对角线上的元素全部大于 0.

习题 5

1. 选择题:

(1) 设 λ_1 与 λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, ξ, η 是 A 的分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 则_____.

- (A) 对任意 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0, k_1\xi + k_2\eta$ 都是 A 的特征向量。
- (B) 存在常数 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$, 使 $k_1\xi + k_2\eta$ 是 A 的特征向量。
- (C) 当 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$ 时, $k_1\xi + k_2\eta$ 不可能是 A 的特征向量。
- (D) 存在唯一的一组常数 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$, 使 $k_1\xi + k_2\eta$ 是 A 的特征向量。

(2) 设 λ_1 与 λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是_____.

- (A) $\lambda_1 \neq 0$ 。 (B) $\lambda_2 \neq 0$ 。 (C) $\lambda_1 = 0$ 。 (D) $\lambda_2 = 0$ 。

(3) 设 n 阶可逆阵 A 对应于特征值 λ 的特征向量为 $x \neq 0$, P 为 n 阶可逆阵, 则 $P^{-1}AP$ 的对应于特征值 $\frac{1}{\lambda}$ 的特征向量为_____.

- (A) $P^{-1}x$; (B) Px ; (C) $P^T x$; (D) $(P^T)^{-1}x$ 。

(4) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, P 是 n 阶可逆矩阵. 已知 n 维列向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 属于特征值 λ 的特征向量是_____.

- (A) $P^{-1}\alpha$ (B) $P^T\alpha$ (C) $P\alpha$ (D) $(P^{-1})^T\alpha$

(9) 已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 $0, \pm 1$, 则下列命题中不正确的是_____.

(A) A 为不可逆矩阵

(B) A 的主对角线元素之和为零

(C) 1 与 -1 所对应的特征向量相互正交

(D) $Ax = 0$ 的基础解系仅一个向量

(10) 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 A 与 B 相似, E 为 n 阶单位矩阵, 则下列结论正确的是_____.

- (A) 存在正交阵 P , 使有 $P^{-1}AP = B$.
- (B) A 与 B 有相同的特征值和特征向量.
- (C) A 与 B 相似于同一个对角矩阵.
- (D) 对于任意常数 t , $tE - A$ 与 $tE - B$ 相似.

§ 5.1 方阵的特征值与特征向量

定义 5.1 设 A 是 n 阶方阵, 若存在数 λ 和非零列向量 x , 使得

$$Ax = \lambda x, \quad (5-1)$$

则称数 λ 为 A 的**特征值** (eigenvalue 或 characteristic value), 称非零向量 x 为 A 的对应于 (或属于) 特征值 λ 的一个**特征向量** (eigenvector 或 characteristic vector), 同样也称 λ 为对应于特征向量 x 的特征值.

注意特征值和特征向量针对方阵, 并且特征向量一定是非零向量.

(5-1) 式也可写成

$$(\lambda E - A)x = 0. \quad (5-2)$$

λ 是 n 阶矩阵 A 的特征值 $\Leftrightarrow (\lambda E - A)x = 0$ 有非零解

$$\Leftrightarrow R(\lambda E - A) < n$$

$$\Leftrightarrow |\lambda E - A| = 0.$$

ξ 是 A 的属于特征值 λ 的一个特征向量 $\Leftrightarrow \xi$ 是 $(\lambda E - A)x = 0$ 的非零解.

所以计算矩阵的特征值对应的特征向量的问题转化为求齐次线性方程组的非零解的问题.

定理 5.1 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ 分别是 A 的属于互不相等的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 的特征向量, 则 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ 线性无关.

推论 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是 n 阶方阵 A 的不同特征值, 而 $\xi_{i1}, \xi_{i2}, \dots, \xi_{ir_i}$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 分别是 A 的对应于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 的 r_i 个线性无关的特征向量, 则向量组

$$\xi_{11}, \xi_{12}, \dots, \xi_{1r_1}, \xi_{21}, \dots, \xi_{2r_2}, \dots, \xi_{m1}, \dots, \xi_{mr_m}$$

也线性无关.

矩阵的特征值和特征向量的几个简单性质：

设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶矩阵，称 $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ 为矩阵 A 的迹 (trace)。

定理 5.2 设 n 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (重根按重数计算)，则

- ① $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \text{tr}(A)$;
- ② $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = |A|$.

推论 方阵 A 可逆当且仅当它的特征值全不为 0.

特征值有如下性质：

性质 5.1 设 λ 是 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的特征值，则

① 若 A 可逆，则 $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值.

② λ^2 是 A^2 的特征值，进一步地，有

若 λ 是 A 的特征值，则 $\varphi(\lambda)$ 是 $\varphi(A)$ 的特征值，其中

$$\varphi(\lambda) = a_0 \lambda + a_1 \lambda + \cdots + a_s \lambda^s, \quad \varphi(A) = a_0 E + a_1 A + \cdots + a_s A^s.$$

③ 若 $\lambda \neq 0$ ，则 $\frac{1}{\lambda} |A|$ 是 A^* 的特征值.

④ A^T 的特征值与 A 的特征值相同.

§ 5.2 相似矩阵

定义 5.2 设 A, B 都是 n 阶方阵, 若存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = B, \quad (5-8)$$

则称 A **相似** 于 B , 记作 $A \sim B$.

性质 5.2 若 $A \sim B$, 则有

- (1) $|A| = |B|$, 从而 A 与 B 的可逆性相同.
- (2) 当 A 或 B 可逆时, 则有 $A^{-1} \sim B^{-1}$.
- (3) $A^n \sim B^n$, $kA \sim kB$, 其中 n 为正整数, k 为任意实数.
- (4) $f(A) \sim f(B)$, 其中 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 为任意多项式.

定理 5.3 若 $A \sim B$, 则 A 与 B 的特征多项式相同, 从而 A 与 B 的特征值也相同.

推论 若 n 阶方阵 A 与对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$ 相似, 则 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 为 A 的所有 n 个特征值.

若 $P^{-1}AP = B$ ，则 A 与 B 的特征向量之间的关系，有如下结论：

η 是 A 的对应于 λ 的特征向量 $\Leftrightarrow P^{-1}\eta$ 是 B 的对应于 λ 的特征向量.

事实上，有

$$\begin{aligned} A\eta = \lambda\eta &\Leftrightarrow P^{-1}A\eta = \lambda P^{-1}\eta \Leftrightarrow P^{-1}A(P P^{-1})\eta = \lambda(P^{-1}\eta) \\ &\Leftrightarrow B(P^{-1}\eta) = \lambda(P^{-1}\eta). \quad (\eta \neq 0 \text{ 时 } P^{-1}\eta \neq 0) \end{aligned}$$

定理 5.4 n 阶方阵 A 相似于对角阵（即 A 可对角化）的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量.

推论 若 n 阶矩阵 A 有 n 个互不相等的特征值，则 A 可对角化. ■

λ_0 作为 $|\lambda E - A| = 0$ 的根出现的重数，称为 λ_0 的 **代数重数** (algebraic multiplicity). 若 λ_0 是矩阵 A 的特征值，则 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的解空间的维数称为 λ_0 的 **几何重数** (geometric multiplicity).

定理 5.5* n 阶方阵 A 相似于对角阵的充分必要条件是： A 的每个特征值的几何重数和代数重数相等，即 k_i 重特征值 λ_i 有 k_i 个线性无关的特征向量，也就是 $R(\lambda_i E - A) = n - k_i$. ■

§ 5.3 实对称矩阵的对角化

性质 5.3 实对称阵的特征值必为实数.

性质 5.4 实对称阵 A 的属于不同特征值的特征向量相互正交.

定理 5.6 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 则必有正交矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = P^TAP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad (5-9)$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的所有特征值. 此时称 A 正交相似 (orthogonally similar) 于一个对角矩阵. ■

推论 设 A 为 n 阶实对称矩阵, λ_0 是 A 的特征多项式的 k 重根, 则 $R(\lambda_0 E - A) = n - k$, 从而对应于特征值 λ_0 恰好有 k 个线性无关的特征向量. ■

利用正交矩阵把 n 阶实对称矩阵 A 化为对角矩阵的一般步骤是：

① 设 $|\lambda E - A| = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{k_s}$ ，其中 $\lambda_i \neq \lambda_j (i \neq j)$ ， λ_i 的代数重数为 k_i 。

② 对应于每个特征值 λ_i ，求出 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 的基础解系： $\xi_{i1}, \cdots, \xi_{i, k_i}$ ，再把它们正交化并单位化，得到 k_i 个两两正交的单位向量 $p_{i1}, \cdots, p_{i, k_i}$ 。

③ 把②中求出的 n 个两两正交的单位向量合在一起，以它们的列向量构成正交矩阵 P ，譬如令 $P = (p_{11}, \cdots, p_{1, k_1}, \cdots, p_{s1}, \cdots, p_{s, k_s})$ ，由定理 5.1 的推论知 P 是正交阵，且

$$P^{-1}AP = P^T AP = \Lambda = \left(\begin{array}{ccccccc} \lambda_1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \lambda_1 & & & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & \lambda_s & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \lambda_s \end{array} \right) \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} k_1 \\ \\ \\ \\ k_s \end{array}.$$

注意上面的对角矩阵中的主对角线上的特征值的排列次序和正交矩阵 P 中列向量的排列次序要对应一致。

5.4.1 二次型及其标准形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x^T A x, \quad (5-11)$$

其中 A 是对称矩阵.

二次型 (5-11) 也记为

$$f(x) = x^T A x. \quad (5-12)$$

易见二次型 f 与对称矩阵 A 确立了一一对应关系, 即任给一个二次型 f 就唯一确定了一个对称矩阵 A ; 反之, 任给一个对称矩阵 A , 也唯一确定了一个二次型 f . 称二次型 f 唯一确定的**对称矩阵** A 为二次型 f 的矩阵, 也称二次型 f 是对称矩阵 A 的二次型. 矩阵 A 的秩称为**二次型 f 的秩**.

$$x = Cy, \quad (5-14)$$

其中

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \quad y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T, \quad C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}.$$

设有一个 n 元二次型 $f(x) = x^T A x$ ，引进新的一组变量 y_1, y_2, \dots, y_n ，并把 $f(x) = x^T A x$ 用线性变换 (5-14) 表示。代入 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，得到 y_1, \dots, y_n 的一个二次型 $g(y_1, \dots, y_n)$ ，即

$$f(x_1, \dots, x_n) = x^T A x = y^T C^T A C y = g(y_1, \dots, y_n),$$

称二次型经过可逆线性变换后得到的仅包含平方项的二次型为**二次型的标准形**(standard (或 canonical) form of a quadratic form)。而形如： $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2$ 的二次型称为二次型的**规范标准形**(normal form of a quadratic form) (简称为**规范形**)。标准二次型的矩阵是对角矩阵。

定义 5.4 两个 n 阶矩阵 A 和 B ，若存在可逆矩阵 C ，使得 $C^T A C = B$ ，则称 A 合同于 B ，记为 $A \simeq B$ （有教材也记为： $A \approx B$ ）。

由定义易证矩阵间的合同关系也满足自反性，对称性和传递性。

5.4.2 正交变换法

根据合同矩阵的定义，二次型经可逆变换化为标准形，实际上是寻找合同矩阵，将对称矩阵对角化。由定理 5.6 知，任给一个实对称矩阵 A ，总存在正交矩阵 P ，使得 $P^{-1} A P = \Lambda$ ，即 $P^T A P = \Lambda$ 。将此结果应用于二次型，即有

定理 5.7 对于 n 元二次型 $f(x) = x^T A x$ ，存在正交变换 $x = P y$ ，将该二次型化为标准形：

$$f(x) = x^T A x = y^T (P^T A P) y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是对称阵 A 的特征值， P 的列向量组 p_1, p_2, \cdots, p_n 是标准正交向量组，且 $A p_i = \lambda_i p_i$ （ $i = 1, 2, \cdots, n$ ）。 ■

定理 5.9 设 $A = A_{n \times n}$ 为实对称阵, $f(x) = x^T A x$, 则以下几个命题等价:

- ① A 正定, 或 $f(x) = x^T A x$ 是正定二次型;
- ② A 的特征值全大于零;
- ③ A 的正惯性指数为 n ;
- ④ A 合同于单位阵 E ;
- ⑤ 存在可逆阵 B , 使得 $A = B^T B$.

用同样的方法可以证明关于半正定判别的定理:

定理 5.10 若 A 为实对称矩阵, 则下列条件等价:

- (1) A 为半正定矩阵;
- (2) A 的特征值均大于等于零, 且至少有一个等于零;
- (3) A 的正惯性指数为 $R(A) < n$;
- (4) $A \simeq \text{diag}(1, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$, 其中 1 有 $R(A)$ 个, $R(A) < n$;
- (5) 存在非满秩矩阵 P , 使得 $A = P^T P$. ■

下面我们介绍一个比较实用的判定对称矩阵是否正定的判定准则.

定理 5.11 实对称阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 正定的充要条件是它的各阶顺序主子式全大于零, 即

$$A_1 = a_{11} > 0, \quad A_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad A_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} > 0, \quad \cdots, \quad A_n = |A| > 0.$$

实对称矩阵 A 为半正定矩阵的充要条件是 A 的各阶主子式非负, 但至少有一个主子式等于零.

因对称矩阵 A 为负定 $\Leftrightarrow -A$ 正定, 故有

推论 实对称阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 负定的充要条件是它的顺序主子式满足:

$$A_1 = a_{11} < 0, \quad A_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \cdots, \quad (-1)^k A_k > 0, \quad \cdots, \quad (-1)^n |A| > 0.$$

武汉大学 2018-2019 学年第二学期期末考试线性代数 B

一、(10 分) 已知 $|A| = \begin{vmatrix} k_1 & 2 & 1 & 2 \\ k_2 & 2 & 2 & 2 \\ k_3 & 1 & 3 & 4 \\ k_4 & 1 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 18$, 试计算 $A_{12} + A_{22}, A_{32} + A_{42}$ 的值。

二、(12 分) 求向量组 $\alpha_1 = (1, -2, 3, -1, 2)^T, \alpha_2 = (2, 1, 2, -2, -3)^T, \alpha_3 = (5, 0, 7, -5, -4)^T, \alpha_4 = (3, -1, 5, -3, -1)^T$ 的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用极大线性无关组线性表示。

三、(14 分) 设矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

(1) 求 $(A + B)^2 - (A^2 + 2AB + B^2)$;

(2) 求 A 的逆矩阵.

四、(15 分) 设有线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda - 1 \end{cases}.$$

五、(16 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3$ ($b > 0$), 其中二次型的矩阵 A 的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12.

1、 a, b 的值;

2、用正交变换将二次型 f 化为标准形, 并写出所用的正交变换矩阵。

六、(15 分) 设 n 阶矩阵 A, B 满足条件 $A + B = AB$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 且

$a_1 = (1, 0, 1), a_2 = (2, 1, 0), a_3 = (1, 1, 1),$

1、求矩阵 A ;

2、求秩 $r(A^* B^*)$, 其中 A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵;

3、设 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)B$, 求 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$;

七、(10 分) 设 A, B 均是同阶方阵, B 是可逆矩阵, 且满足 $A^2 + AB + B^2 = 0$, 证明 $A, A^2 + B^2$ 以及 $A^{-1} + B^{-1}$ 都是可逆矩阵。

八、(8 分) 设 B 是 $m \times n$ 阶矩阵, 其 m 个行向量是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 证明: 对任一 m 阶可逆矩阵 C, CB 的行向量组也是 $Ax = 0$ 的基础

武汉大学 2017-2018 学年第二学期期末考试线性代数 B 试题 (A)

1、(10 分) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 都是四维列向量, 且四阶行列式 $|\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta_1| = m, |\alpha_1 \alpha_2 \beta_2 \alpha_3| = n$, 计算四阶行列式 $|\alpha_3 \alpha_2 \alpha_1 (\beta_1 + \beta_2)|$.

2、(10 分) 已知 3 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 3 阶矩阵 B 满足方程 $A^2 B - A - B = E$,

试求矩阵 B .

3、(10 分) 已知向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 不共面, 试判断向量 $\alpha = 3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - \vec{e}_3, \beta = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 - \vec{e}_3, \gamma = -\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + 5\vec{e}_3$ 是否共面。

4、(10 分) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶方阵, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 4 维列向量, 且 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$. 已知向量 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 试求线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

5、(12 分) 设有向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 3, 1)^T, \alpha_2 = (1, 4, 1, 2)^T, \alpha_3 = (1, 0, 2, 1)^T, \alpha_4 = (1, 7, 2, k)^T$

(1) 问 k 为何值时, 该向量组线性相关? (2) 在线性相关时求出该向量组的

6、(10 分) 设 A 是 3 阶方阵, 互换 A 的第一、第二列, 得 B ; 再将 B 的第二列上得矩阵 C ; 然后再将矩阵 C 的第一列乘以 2 得到矩阵 D ; 求满足 $AX = D$ 的可

7、(10 分) 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 可以对角化, 设与 A 相似的对角矩阵为 Λ ; (1)

a 的值及对角矩阵 Λ , 可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

8、(10 分) 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为所有 3 维实向量构成的线性空间 R^3 的基, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 且 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_3 = ($

试求: (1) 基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$; (2) 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下有相同坐标的全体向量

9、(8 分) 设 n 阶方阵 A 的伴随矩阵为 A^* , 证明: 若 $|A| = 0$, 则 $|A^*| = 0$;

10、(10 分) 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$ 其中

(1) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解; (2) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的标准形。

武汉大学 2016-2017 学年第二学期期末考试线性代数 B 试题 (A)

一、(8 分) 不求出行列式的值, 判断行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 5 & 2 & 7 \\ 2 & 5 & 5 \end{vmatrix}$ 能被 17 整除.

二、(10 分) 什么样的矩阵 X 满足下面等式: $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} X - \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$

三、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 7 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, 求 $A^{-1}B^T(CB^{-1} + E)^T$.

四、(10 分) 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x+1 & x & x & \cdots & x \\ x & x+2 & x & \cdots & x \\ x & x & x+3 & \cdots & x \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x & x & x & \cdots & x+n \end{vmatrix}$ 的值.

五、(12 分) 求向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 3, 1), \alpha_2 = (1, 4, 1, 2), \alpha_3 = (1, 0, 2, 1), \alpha_4 = (1, 7, 2, 2)$ 的秩无关组, 并用最大无关组线性表示向量组中其它向量.

六、(6 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是齐次方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $AX = 0$ 的解, 求证: $\beta, \beta + \alpha_1, \dots, \beta + \alpha_r$ 线性无关。

七、(10 分) 已知三阶方阵 A 满足 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}$,

(1) 求 A . (2) 计算行列式 $|A|$ 和 $|A^2 - 2A + 3I|$ 的值;

(3) 判断 A 是否为正定矩阵。

八、(10 分) 已知向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 是 R^3 的基, 说明 $\{2\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3\}$ 也是 R^3 的基。若向量 α 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 下坐标为 $(1, 1, 1)^T$, 求向量 α 在基 $\{2\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3\}$ 的坐标。

九、(10 分) 设二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2ax_2x_3$ 通过正交变换 $x = Py$ 化成标准型 $f = 2y_1^2 + 2y_2^2 + by_3^2$, 求出 a, b 的值及所用的正交变换。

十、(14 分) 讨论 a, b 为何值时, 方程 $ax_1 + x_2 + x_3 = 4$ 与方程组 $\begin{cases} x_1 + bx_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 3bx_2 + x_3 = 9 \end{cases}$

无公共解, 有唯一公共解, 有无穷多公共解, 并写出相应的公共解?

武汉大学 2015-2016 学年第二学期期末考试

1、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 问 A 是否可逆? 如可逆求 A^{-1} , 如不可逆, 求 A 的伴随矩阵 A^* .

2、(10 分) 已知矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 可交换. 试求 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$ 的值.

3、(10 分) 向量 α 在基 $\alpha_1 = (1,1,1)$, $\alpha_2 = (0,1,1)$, $\alpha_3 = (1,-1,1)$ 下的坐标 $\alpha = (4,5,4,3)$, 求 α 在基 $\beta_1 = (1,2,2)$, $\beta_2 = (1,0,2)$, $\beta_3 = (2,0,2)$ 下的坐标。

4、(12 分) 设 3 阶方阵 A 的特征值分别为 $1, -1, 0$, 方阵 $B = 2A^2 - 3A - 4E$,

1) 试求矩阵 B 的特征值及与 B 相似的对角矩阵;

2) 验证 B 可逆, 并求 B^{-1} 的特征值及行列式 $|B^{-1}|$ 之值。

5、(10 分) 设 $\alpha_1 = (2,1,3,1)$, $\alpha_2 = (1,2,0,1)$, $\alpha_3 = (-1,1-3,0)$, $\alpha_4 = (1,1,1,1)$, 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个最大无关组, 并用最大无关组线性表示该组中其它向量。

6、(10 分) 设二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + (1-k)x_3^2 + 2kx_1x_2 + 2x_1x_3$ 其中 k 为参数, 确定 k 的取值范围使 f 为正定的。

7、(10 分) 设 A 是 $m \times 4$ 矩阵且 A 的秩为 2, B 是 $m \times 1$ 的非零矩阵, 若 a_1, a_2, a_3 是方程组 $AX = B$ 的解向量, 且设

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, a_1 + a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, a_2 + a_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}, a_2 + a_3 = (1, 0, 4, 3)^T, \text{ 求方程组 } AX = B \text{ 的通解.}$$

$$8、(12 \text{ 分}) \text{ 已知 (I) } \begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + bx_3 + x_4 = 4 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + cx_4 = 1 \end{cases} \text{ 与 (II) } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ -x_2 + 2x_3 - x_4 = 2 \\ x_3 + 2x_4 = -1 \end{cases} \text{ 同解,}$$

试确定 a, b, c 之值.

9、(10 分) 用正交变换化二次型 $f = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_3 + 2x_1x_2$ 为标准形, 并写出所用正交变换及 f 的标准形。

10、(6 分) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ 是 R^n 中 $n-1$ 线性无关的向量, β_i 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ 均正交 ($i = 1, 2$), 证明: β_1, β_2 线性相关。

武汉大学 2015-2016 学年第二学期期末考试

1、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 问 A 是否可逆? 如可逆求 A^{-1} , 如不可逆, 求 A 的伴随矩阵 A^* .

2、(10 分) 已知矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 可交换. 试求 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$ 的值.

3、(10 分) 向量 α 在基 $\alpha_1 = (1,1,1)$, $\alpha_2 = (0,1,1)$, $\alpha_3 = (1,-1,1)$ 下的坐标 $\alpha = (4,5,4,3)$, 求 α 在基 $\beta_1 = (1,2,2)$, $\beta_2 = (1,0,2)$, $\beta_3 = (2,0,2)$ 下的坐标。

4、(12 分) 设 3 阶方阵 A 的特征值分别为 $1, -1, 0$, 方阵 $B = 2A^2 - 3A - 4E$,

1) 试求矩阵 B 的特征值及与 B 相似的对角矩阵;

2) 验证 B 可逆, 并求 B^{-1} 的特征值及行列式 $|B^{-1}|$ 之值。

5、(10 分) 设 $\alpha_1 = (2, 1, 3, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 0, 1)$, $\alpha_3 = (-1, 1 - 3, 0)$, $\alpha_4 = (1, 1, 1, 1)$, 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个最大无关组, 并用最大无关组线性表示该组中其它向量。

6、(10 分) 设二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + (1 - k)x_3^2 + 2kx_1x_2 + 2x_1x_3$ 其中 k 为参数, 确定 k 的取值范围使 f 为正定的。

7、(10 分) 设 A 是 $m \times 4$ 矩阵且 A 的秩为 2, B 是 $m \times 1$ 的非零矩阵, 若 a_1, a_2, a_3 是方程组 $AX = B$ 的解向量, 且设

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, a_1 + a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, a_2 + a_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}, a_2 + a_3 = (1, 0, 4, 3)^T, \text{ 求方程组 } AX = B \text{ 的通解.}$$

8、(12分) 已知方程组 (I)
$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + bx_3 + x_4 = 4 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + cx_4 = 1 \end{cases}$$
 与方程组

(II)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ -x_2 + 2x_3 - x_4 = 2 \\ x_3 + 2x_4 = -1 \end{cases}$$
 同解, 试确定 a, b, c 之值.

9、(10 分) 用正交变换化二次型 $f = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_3 + 2x_1x_2$ 为标准形, 并写出所用正交变换及 f 的标准形。

10、(6 分) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ 是 R^n 中 $n-1$ 线性无关的向量, β_i 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ 均正交 ($i = 1, 2$), 证明: β_1, β_2 线性相关。

武汉大学 2016-2017 学年第二学期期末考试线性代数 B 试题 (A)

一、(8 分) 不求出行列式的值, 用行列式的性质, 判断行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 5 & 2 & 7 \\ 2 & 5 & 5 \end{vmatrix}$ 能被 17 整除.

二、(10 分) 什么样的矩阵 X 满足下面等式：
$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} X - \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

三、（10分）设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 7 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ ，求

$$\boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}^T (\boldsymbol{C} \boldsymbol{B}^{-1} + \boldsymbol{E})^T - [(\boldsymbol{C}^{-1})^T \boldsymbol{A}]^{-1}.$$

四、(10 分) 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x+1 & x & x & \cdots & x \\ x & x+2 & x & \cdots & x \\ x & x & x+3 & \cdots & x \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x & x & x & \cdots & x+n \end{vmatrix}$ 的值.

五、(12 分) 求向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 3, 1)$, $\alpha_2 = (1, 4, 1, 2)$, $\alpha_3 = (1, 0, 2, 1)$, $\alpha_4 = (1, 7, 2, 2)$ 的秩及一个最大无关组, 并用最大无关组线性表示向量组中其它向量。

六、(6 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是齐次方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $AX = 0$ 的解, 求证: $\beta, \beta + \alpha_1, \dots, \beta + \alpha_r$ 线性无关。

七、(10 分) 已知三阶方阵 A 满足 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}$,

(1) 求 A .

(2) 计算行列式 $|A|$ 和 $|A^2 - 2A + 3I|$ 的值;

(3) 判断 A 是否为正定矩阵。

八、(10 分) 已知向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 是 R^3 的基, 说明 $\{2\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3\}$ 也是 R^3 的基。若向量 α 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 下坐标为 $(1, 1, 1)^T$, 求向量 α 在基 $\{2\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3\}$ 的坐标。

九、（10 分）设二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2ax_2x_3$ 通过正交变换 $x = Py$ 化成标准型 $f = 2y_1^2 + 2y_2^2 + by_3^2$ ，求出 a, b 的值及所用的正交变换。

十、(14 分) 讨论 a, b 为何值时, 方程 $ax_1 + x_2 + x_3 = 4$ 与方程组 $\begin{cases} x_1 + bx_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 3bx_2 + x_3 = 9 \end{cases}$

无公共解, 有唯一公共解, 有无穷多公共解, 并写出相应的公共解?

武汉大学 2017-2018 学年第二学期期末考试线性代数 B 试题 (A)

1、(10 分) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 都是四维列向量, 且四阶行列式

$$|\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta_1| = m, |\alpha_1 \alpha_2 \beta_2 \alpha_3| = n, \text{ 计算四阶行列式 } |\alpha_3 \alpha_2 \alpha_1 (\beta_1 + \beta_2)|.$$

2、(10 分)已知 3 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 3 阶矩阵 B 满足方程 $A^2 B - A - B = E$,

试求矩阵 B .

3 、 (10 分) 已知向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 不共面 , 试判断向量 $\alpha = 3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - \vec{e}_3, \beta = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 - \vec{e}_3, \gamma = -\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + 5\vec{e}_3$ 是否共面。

4、(10 分) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶方阵, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 4 维列向量, 且 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$. 已知向量 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 试求线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

5、(12 分)设有向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 3, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 4, 1, 2)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, 2, 1)^T$, $\alpha_4 = (1, 7, 2, k)^T$

(1) 问 k 为何值时, 该向量组线性相关? (2) 在线性相关时求出该向量组的一个极大线性无关组并将其余向量用该极大线性无关组线性表示。

6、(10 分) 设 A 是 3 阶方阵, 互换 A 的第一、第二列, 得矩阵 B ; 再将 B 的第二列加到第三列上得矩阵 C ; 然后再将矩阵 C 的第一列乘以 2 得到矩阵 D ; 求满足 $AX = D$ 的可逆矩阵 X .

7、(10 分) 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 可以对角化, 设与 A 相似的对角矩阵为 Λ ; (1)

试求常数 a 的值及对角矩阵 Λ , 可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

8、(10 分) 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为所有 3 维实向量构成的线性空间 R^3 的

两组基, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 且

$$\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (1, 1, 1)^T,$$

试求: (1) 基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$; (2) 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下有相同坐标的全体向量.

9、(8 分) 设 n 阶方阵 A 的伴随矩阵为 A^* , 证明: 若 $|A| = 0$, 则 $|A^*| = 0$;

10、(10 分) 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$ 其中 a 为参数。

(1) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解; (2) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的标准形。

武汉大学 2018-2019 学年第二学期期末考试线性代数 B (A 卷)

一、(10 分) 已知 $|A| = \begin{vmatrix} k_1 & 2 & 1 & 2 \\ k_2 & 2 & 2 & 2 \\ k_3 & 1 & 3 & 4 \\ k_4 & 1 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 18$, 试计算 $A_{12} + A_{22}, A_{32} + A_{42}$ 的值。

二、(12 分)求向量组 $\alpha_1 = (1, -2, 3, -1, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, 1, 2, -2, -3)^T$, $\alpha_3 = (5, 0, 7, -5, -4)^T$, $\alpha_4 = (3, -1, 5, -3, -1)^T$ 的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用极大线性无关组线性表示。

三、(14 分) 设矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

(1) 求 $(A + B)^2 - (A^2 + 2AB + B^2)$;

(2) 求 A 的逆矩阵.

四、(15 分) 设有线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda - 1 \end{cases}.$$

讨论 λ 为何值时, 方程组有唯一解、无解、有无穷多解? 并在有无穷多解时, 求出其通解.

五、(16 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3$ ($b > 0$), 其中二次型的矩阵 A 的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12.

1、 a, b 的值;

2、用正交变换将二次型 f 化为标准形, 并写出所用的正交变换矩阵。

六、(15 分) 设 n 阶矩阵 A, B 满足条件 $A + B = AB$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 且

$$a_1 = (1, 0, 1), \quad a_2 = (2, 1, 0), \quad a_3 = (1, 1, 1),$$

1、求矩阵 A ;

2、求秩 $r(A^* B^*)$, 其中 A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵;

3、设 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)B$, 求 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$;

七、(10 分) 设 A 、 B 均是同阶方阵， B 是可逆矩阵，且满足 $A^2 + AB + B^2 = 0$ ，证明 A 、 $A^2 + B^2$ 以及 $A^{-1} + B^{-1}$ 都是可逆矩阵。

八、(8 分) 设 B 是 $m \times n$ 阶矩阵, 其 m 个行向量是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 证明: 对任一 m 阶可逆矩阵 C , CB 的行向量组也是 $Ax = 0$ 的基础解系。