

Cauchy-Schwarz Inequality

November 6, 2020

一般书上讲的都是Hilbert 空间中的Cauchy-Schwarz inequality, 而下面的Cauchy-Schwarz inequality, 是我见过的条件最弱的, 暂时还没找到该定理的出处.
本文中的 X 均为线性空间.

1 复数的Cauchy-Schwarz inequality

Definition 1.1. 若二元函数 $a : X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ 满足: 对任意 $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ 和 $\forall x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in X$,

$$(i) \quad a(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 a(x_1, y) + \alpha_2 a(x_2, y);$$

$$(ii) \quad a(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \overline{\alpha_1} a(x, y_1) + \overline{\alpha_2} a(x, y_2).$$

我们称 $a(\cdot, \cdot)$ 为 X 上的共轭双线性函数.

Theorem 1.2 (Cauchy-Schwarz inequality). 设 $a(\cdot, \cdot)$ 为 X 上的共轭双线性函数且for any $x \in X$,

$$a(x, x) \geq 0,$$

then for any $x, y \in X$,

$$|a(x, y)|^2 \leq a(x, x)a(y, y). \quad (1)$$

注意, $a(x, x) \geq 0$ 能推出 $a(x, y) = \overline{a(y, x)}$, 这个结论在证明中会用到. 此外, 由于该Cauchy-Schwarz inequality 减弱了条件, 取等条件变得复杂了许多.

Proof. For any $x, y \in X$, if $a(x, x) = a(y, y) = 0$, then

$$0 \leq a(x + y, x + y) = a(x, x) + a(y, y) + 2\operatorname{Re}a(x, y) = 2\operatorname{Re}a(x, y),$$

$$0 \leq a(x - y, x - y) = a(x, x) + a(y, y) - 2\operatorname{Re}a(x, y) = -2\operatorname{Re}a(x, y),$$

$$0 \leq a(x + iy, x + iy) = a(x, x) + a(y, y) + 2\operatorname{Im}a(x, y) = 2\operatorname{Im}a(x, y),$$

$$0 \leq a(x - iy, x - iy) = a(x, x) + a(y, y) - 2\operatorname{Im}a(x, y) = -2\operatorname{Im}a(x, y),$$

So $\operatorname{Re}a(x, y) = 0 = \operatorname{Im}a(x, y)$, i.e. $a(x, y) = 0$.

$$|a(x, y)|^2 = 0 = a(x, x)a(y, y).$$

Otherwise, we assume $a(y, y) \neq 0$, let $\lambda := a(x, y)/a(y, y)$, then

$$\begin{aligned} 0 &\leq a(x - \lambda y, x - \lambda y) \\ &= a(x, x) - \bar{\lambda}a(x, y) - \lambda a(y, x) + |\lambda|^2 a(y, y) \\ &= a(x, x) - \frac{|a(x, y)|^2}{a(y, y)}. \end{aligned}$$

From this we have

$$|a(x, y)|^2 \leq a(x, x)a(y, y).$$

The proof of Cauchy-Schwarz inequality is finished. \square

2 实数的Cauchy–Schwarz inequality

Definition 2.1. 若二元函数 $a : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足: 对任意 $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ 和 $\forall x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in X$,

$$(i) \quad a(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 a(x_1, y) + \alpha_2 a(x_2, y);$$

$$(ii) \quad a(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \alpha_1 a(x, y_1) + \alpha_2 a(x, y_2).$$

我们称 $a(\cdot, \cdot)$ 为 X 上的共轭双线性函数.

Theorem 2.2 (Cauchy–Schwarz inequality). 设 $a(\cdot, \cdot)$ 为 X 上的双线性函数, 对 $\forall x, y \in X$, $a(x, y) = a(y, x)$, 且对 $\forall x \in X$,

$$a(x, x) \geq 0.$$

则对 $\forall x, y \in X$,

$$|a(x, y)|^2 \leq a(x, x)a(y, y).$$

证明类似.