

$L^p(\mathbb{R}^n)$ 对偶等式的推广

September 24, 2020

1 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的对偶

讲到 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的对偶, 那就会提到如下定理.

Theorem 1.1. 设 $p \in [1, \infty)$. 则对 $\forall f \in L^p(\mathbb{R}^n)$,

$$\|f\|_p = \sup_{g \in L^{p'}(\mathbb{R}^n), \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}=1} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x) dx.$$

事实上, 该定理可以推广到更一般的情况.

Theorem 1.2. 设 $p \in [1, \infty)$. 则对 $\forall f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$,

$$\|f\|_p = \sup_{g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}=1} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x) dx. \quad (1)$$

证明思路: $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 时, 该定理回到了经典情况, 故只需证明 $\|f\|_p = \infty$ 时, 右边也等于无穷. 即证右边小于无穷时, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 此时先证

$$\sup_{g \in L^\infty(\mathbb{R}^n), g \text{ 有紧支集}, \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}=1} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x) dx < \infty.$$

再取一系列 g_n 使得 fg_n 逼近 $|f|^p$. 从而证得 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$.

首先定义卷积核. 对 $\forall x \in \mathbb{R}^n$,

$$\rho(x) := \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{|x|^2 - 1}\right), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

则 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\text{supp}(\rho) = \overline{B(0,1)}$ 且 $\rho \geq 0$. 对 $\forall k \in \mathbb{N}$ 和 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 令

$$\rho_k(x) := \frac{k^n}{\|\rho\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}} \rho(kx) = \begin{cases} \frac{k^n}{\|\rho\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}} \exp\left(\frac{1}{|kx|^2 - 1}\right), & |kx| < 1, \\ 0, & |kx| \geq 1, \end{cases}$$

则 $\rho_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\text{supp}(\rho_k) = \overline{B(0,1/k)}$, $\rho_k \geq 0$ 且 $\|\rho_k\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = 1$.

Lemma 1.3. 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为有界闭集, $A \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集, 则 $A + B$ 为闭集.

Proof. 设 $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset A + B$ 在 \mathbb{R}^n 中收敛到 x_0 . 则存在 $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset A$ 和 $\{z_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset B$ 使得, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$x_k = y_k + z_k.$$

由于 A 为有界闭集, 故可取 $\{y_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 为 $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 的收敛子列. 记 $y_0 := \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k}$, 则 $y_0 \in A$. 又由 B 是闭集知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} z_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} - \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = x_0 - y_0 \in B.$$

故

$$x_0 = y_0 + (x_0 - y_0) \in A + B.$$

因此 $A + B$ 是闭集. □

Remark 1.4. 注意, 两闭集必须有其中之一是有界的, 否则结论不一定成立. 取

$$A := \left\{ k + \frac{1}{k} \right\}_{k \in \mathbb{N}}, \quad \text{and} \quad B := \mathbb{Z},$$

则

$$A + B = \left\{ k + \frac{1}{m} : k \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N} \right\}$$

不是闭集.

有了这些准备工作, 现在可以开始证明 Theorem 1.2 了.

Proof of Theorem 1.2. 当 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 时, (1) 是经典的等式, 证明略.

断言, 若

$$\sup_{g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} = 1} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x) dx =: M < \infty.$$

则 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 事实上, 令 $g \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 有紧支集且 $\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} = 1$. 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 设 $g_k := \rho_k * g$, 则 $g_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 从而

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)g_k(x) dx \leq M \|g_k\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}.$$

因为 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|g_k - g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = 0$, 由 Riesz 定理知, 存在子列 g_{n_k} 几乎处处收敛到 g . 又由 g_k 的定义知, $\|g_k\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$ 且由引理 1.3 知,

$$\begin{aligned} \text{supp}(g_k) &= \text{supp}(\rho_k * g) \subset \overline{\text{supp}(\rho_k) + \text{supp}(g)} \\ &= \overline{B(0, 1/k) + \text{supp}(g)} = \overline{B(0, 1/k)} + \text{supp}(g) \subset \overline{B(0, 1)} + \text{supp}(g), \end{aligned}$$

由此及 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ 知, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 在几乎处处意义下

$$|fg_k| \leq \|g_k\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} |f \mathbf{1}_{\text{supp}(g_k)}| \leq \|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \left| f \mathbf{1}_{\overline{B(0, 1)} + \text{supp}(g)} \right| \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

故由控制收敛定理

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{k \rightarrow \infty} f(x)g_{n_k}(x) dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g_{n_k}(x) dx \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} M \|g_{n_k}\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} = M.\end{aligned}$$

从而

$$\sup_{g \in L^\infty(\mathbb{R}^n), g \text{ 有紧支集}, \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}=1} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x) dx \leq M.$$

若 $p = 1$. 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 令

$$g_k := \text{sign}(f) \mathbf{1}_{B(0,k)},$$

则 $g_k \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, g_k 有紧支集且 $\|g_k\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = 1$, 从而

$$\int_{B(0,k)} |f(x)| dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g_k(x) dx \leq M.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 由Levi 定理知

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq M.$$

若 $p \in (1, \infty)$. 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 令

$$g_k := |f|^{p-1} \text{sign}(f) \mathbf{1}_{\{|f| < k\}} \mathbf{1}_{B(0,k)},$$

则 $g_k \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 g_k 有紧支集, 从而

$$\begin{aligned}\int_{B(0,k) \cap \{|f| < k\}} |f(x)|^p dx &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g_k(x) dx \leq M \|g_k\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \\ &= M \left[\int_{B(0,k) \cap \{|f| < k\}} |f(x)|^p dx \right]^{1/p'},\end{aligned}$$

故

$$\left[\int_{B(0,k) \cap \{|f| < k\}} |f(x)|^p dx \right]^{1/p} \leq M.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 由Levi 定理知

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq M.$$

综上, 断言成立.

因此, 当 $f \notin L^p(\mathbb{R}^n)$ 时,

$$\sup_{g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}=1} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x) dx = \infty$$

(1) 仍然成立. 至此Theorem 1.2 证毕. □

2 证明思路的来源

Theorem 1.2 的证明思路来源于[H. Brezis, Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations] 中Corollary 4.24 的证明. 同样的思路在张恭庆的泛函分析中也有提到.

Theorem 2.1 (Corollary 4.24). 设开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 且 $f \in L^1_{loc}(\Omega)$ 满足对 $\forall g \in C_c^\infty(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} f(x)g(x) dx = 0.$$

则 f 在 Ω 上几乎处处为0.

Proof. 为了方便, 只证 $\Omega = \mathbb{R}^n$ 时的情况. 令 $g \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且有紧支集. 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 设 $g_k := \rho_k * g$, 则 $g_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 从而

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)g_k(x) dx = 0.$$

因为 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|g_k - g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = 0$, 由Riesz 定理知, 存在子列 g_{n_k} 几乎处处收敛到 g . 又由 g_k 的定义知, $\|g_k\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$ 且

$$\begin{aligned} \text{supp}(g_k) &= \text{supp}(\rho_k * g) \subset \overline{\text{supp}(\rho_k) + \text{supp}(g)} \\ &= \overline{B(0, 1/k) + \text{supp}(g)} = \overline{B(0, 1/k)} + \text{supp}(g) \subset \overline{B(0, 1)} + \text{supp}(g), \end{aligned}$$

由此及 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ 知, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 在几乎处处意义下

$$|fg_k| \leq \|g_k\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} |f \mathbf{1}_{\text{supp}(g_k)}| \leq \|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \left| f \mathbf{1}_{\overline{B(0, 1)} + \text{supp}(g)} \right| \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

故由控制收敛定理

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{k \rightarrow \infty} f(x)g_{n_k}(x) dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g_{n_k}(x) dx = 0. \end{aligned}$$

对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 令

$$g_k := \text{sign}(f) \mathbf{1}_{B(0, k)},$$

则 $g_k \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且有紧支集, 从而

$$\int_{B(0, k)} |f(x)| dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g_k(x) dx = 0,$$

故对 a.e. $x \in B(0, k)$, $f(x) = 0$. 再由 k 的任意性知, 对 a.e. $x \in \mathbb{R}^n$, $f(x) = 0$. □