Análise Inferencial de Dados

Cannoli Foodtech

Entrega 1 — Estatísticas Descritivas

Projeto Interdisciplinar — 4CCOMP — 4º Semestre 2026 — FECAP

Integrantes do Grupo

- **Bruno Souza Lima** RA: 24026560
- **Felipe Toshio Yamaschita** RA: 24026779
- **Breno Costa do Nascimento** RA: 24026753
- **Vinícius Nishimura Reis** RA: 24026962

Disciplina: Análise Inferencial de Dados
Empresa Parceira: Cannoli Foodtech
Data: Março / 2026

Utilizamos o arquivo STOREORDER para fazer esta atividade, utilizando das tabelas totalamount (valor final com desconto) e subtotalamount (valor final sem desconto)

Média, Mediana e Moda — Total Amount

Média Total Amount

```
media_totalamount <- mean(tabelas$totalamount, na.rm = TRUE)
$media_totalamount
[1] 57.32761
```

Mediana Total Amount

```
mediana_totalamount <- median(tabelas$totalamount, na.rm = TRUE)
$mediana_totalamount
[1] 45.91
```

Moda Total Amount

```
moda <- function(x) {
  ux <- unique(x)
  ux[which.max(tabulate(match(x, ux)))]
}
moda_totalamount <- moda(tabelas$totalamount)
$moda_totalamount
[1] 31.48
```

Variância e Desvio Padrão — Total Amount

Variância Total Amount

```
variancia_totalamount <- var(tabelas$totalamount, na.rm = TRUE)
$variancia_totalamount
[1] 3131.602
```

Desvio Padrão Total Amount

```
desvio_totalamount <- sd(tabelas$totalamount, na.rm = TRUE)
$desvio_totalamount
[1] 55.96072
```

Média, Mediana e Moda — Sub Total Amount

Média Sub Total Amount

```
media_subtotalamount <- mean(tabelas$subtotalamount, na.rm = TRUE)
$media_subtotalamount
[1] 55.98553
```

Mediana Sub Total Amount

```
mediana_subtotalamount <- median(tabelas$subtotalamount, na.rm =
TRUE)
```

```
$mediana_subtotalamount
[1] 44.9
```

Moda Sub Total Amount

```
moda_subtotalamount <- moda(tabelas$subtotalamount)
$moda_subtotalamount
[1] 25
```

Variância e Desvio Padrão — Sub Total Amount

Variância Sub Total Amount

```
variancia_subtotalamount <- var(tabelas$subtotalamount, na.rm = TRUE)
$variancia_subtotalamount
[1] 3071.63
```

Desvio Padrão Sub Total Amount

```
desvio_subtotalamount <- sd(tabelas$subtotalamount, na.rm = TRUE)
$desvio_subtotalamount
[1] 55.42228
```

Lista Completa dos Resultados

```
list(
  media_totalamount    = media_totalamount,
  media_subtotalamount = media_subtotalamount,
  mediana_totalamount    = mediana_totalamount,
  mediana_subtotalamount = mediana_subtotalamount,
  moda_totalamount    = moda_totalamount,
  moda_subtotalamount = moda_subtotalamount,
  variancia_totalamount    = variancia_totalamount,
  variancia_subtotalamount = variancia_subtotalamount,
  desvio_totalamount    = desvio_totalamount,
  desvio_subtotalamount = desvio_subtotalamount
)
```

Visualizações Gráficas




```
hist(log(tabelas$totalamount), breaks=30, main="Histograma do Total
Amount (com log)", xlab="Total Amount", col="lightblue")
```




```
hist(log(tabelas$subtotalamount), breaks=30, main="Histograma do
Subtotal Amount (com log)", xlab="Subtotal Amount", col="lightgreen")
```




```
boxplot(log(tabelas$totalamount), log(tabelas$subtotalamount),
names=c("Total (log)", "Subtotal (log)"), main="Boxplot (escala
log)", col=c("lightblue","lightgreen"))
```