核准日期：2007 年 04 月 24 日

修改日期：2008 年 03 月 25 日　2010 年 10 月 01 日　2011 年 03 月 08 日　2012 年 12 月 10 日
2015 年 11 月 02 日　2019 年 03 月 25 日　2020 年 11 月 06 日　2020 年 12 月 30 日
2022 年 11 月 15 日　2025 年 10 月 05 日

人胰岛素注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
低血糖、有胰岛素过敏史者禁用。
运动员慎用

【药品名称】

通用名称：人胰岛素注射液

商品名称：甘舒霖®R

英文名称：Human Insulin Injection


汉语拼音：Ren Yidaosu Zhusheye

曾 用 名：重组人胰岛素注射液

【成份】主要组成成分

活性成份：人胰岛素　　非活性成份：甘油、间甲酚(2.5mg/ml)

化学结构式：



分子式：$C_{257}H_{383}N_{65}O_{77}S_6$

分子量：5807.69

【性状】

本品为无色澄明液体

【适应症】

1 型或 2 型糖尿病。

【规格】

3ml:300 单位（10.4mg）

【用法用量】

使用方法：

胰岛素的使用应根据医生的指示选择适当剂型、剂量和注射时间。本品通常用皮下注射的方式给药，也可采用肌肉注射或静脉注射的方式给药。

1、本品为无色澄明液体，一般于早晚餐前 15 分钟左右皮下注射，但需由医生根据每位患者的病情决定适宜的注射时间。

2、准备胰岛素的方法：

按照胰岛素注射笔的使用方法，将笔芯正确装入笔芯架后，再安装好东宝针。

转动剂量调节旋钮，调整到所需的剂量。

取下针帽，排尽气泡后，即可注射，注意在使用过程中切勿使针头接触任何物品，以防污染。

3、注射部位的选择：

注射部位应选择皮肤较松的部位，如上臂、大腿、臀部及腹部等，注射部位要轮流交替，两周内同一部位不能连续注射两次，每次注射部位应与上次注射部位间隔 1 厘米左右。

4、正确注射方法：

选好注射部位后，用酒精棉球消毒皮肤，1～2 分钟挥发后，用手捏起或按平以固定注射部位的皮肤，将注射器针头与皮肤形成约 45 度角，刺入皮肤，注射胰岛素。抽出针头后用消毒棉球轻压注射部位数秒钟，但不要按摩注射部位，以免损伤皮下组织和造成胰岛素渗出。

使用剂量：因每位患者的具体情况不同，使用胰岛素的剂型、剂量、注射时间也不同，另外胰岛素的用量也受食物、从事的工作或运动量的影响，所以必须在医生的指导下用药。

患有恶心、呕吐等疾病时；或在运动中或运动后；准备旅行时，都必须与您的医生保持联系，随时和医生讨论调整胰岛素的剂量。

5、本品也可用于静脉注射，但是必须由医务人员进行操作。

只有在没有瓶装产品可用的情况下，方可使用注射笔或笔芯中的胰岛素用于静脉注射。这时应从注射笔或笔芯中将药液抽入胰岛素注射器中，并将空气排除干净；或使用输注系统进行输注。此过程必须由医务人员进行操作。

用于静脉输注时，输注系统中本品浓度为 0.05IU/ml 至 1.0IU/ml，输注液为 0.9%氯化钠、5%葡萄糖或含 40mmol/L 氯化钾的 10%葡萄糖。上述输注液置于聚丙烯输注液袋中，在室温下 24 小时内是稳定的。而超过 24 小时后，尽管输注液仍然稳定，但袋内的部分胰岛素成份开始被输液袋的材料所吸收。在输注期间必须监测血糖值。

本品不能用于胰岛素泵做连续皮下胰岛素输注治疗。

【不良反应】

低血糖是胰岛素治疗中最频繁发生的不良反应，低血糖症状常突然出现。

据文献报道，偶有注射局部红肿、瘙痒等过敏反应及局部皮下脂质萎缩或脂质增生。全身过敏反应（全身皮疹、呼吸短促、气喘、血压下降、脉搏加快、多汗、严重病例可危及生命）罕有报道。

1、脂质营养不良

皮下注射胰岛素很少引起脂质萎缩或脂质增生。如发生上述情况，必须告知医生，改变注射技巧可能对此有所改善。

2、胰岛素过敏

局部过敏反应：患者偶有注射部位红肿、瘙痒现象称为局部过敏，通常在几天或几周内消失。某些情况下，也可能由其他原因引起而与注射胰岛素无关。如皮肤消毒剂的刺激，注射技术不佳等，如有局部反应发生，立即告知医生。

全身过敏反应，发生几率较低，一旦发生则病情严重，是对胰岛素的全身过敏。症状包括：全身皮疹、呼吸短促、气喘、血压下降、脉搏加快、多汗、严重病例可危及生命。如果有上述反应，必须立即通知医生。

【禁忌】

低血糖

有胰岛素过敏史者禁用。

【注意事项】

1、糖尿病病人应定期检查血糖或尿糖，如果血糖检查持续高于或低于正常值或尿糖持续阳性，表示糖尿病未得到适当控制，必须通知医生。经常保持足够的胰岛素、注射器和针头，经常携带糖尿病病人识别证件，以确保离家发生并发症时能得到适当的治疗。

2、胰岛素应用中的任何改变都必须小心，应在医生指导下进行。每次使用胰岛素之前都应仔细检查胰岛素的纯度、效价、注册商标、类型、种属（牛、猪、人）、生产方法（重组人胰岛素、动物提纯胰岛素）是否是医生所建议的，任何一项的改变都会导致剂量的改变。

3、以往使用动物胰岛素的病人在换用本品时必须在医生指导下调整剂量。

4、使用前应仔细检查瓶盖是否完好，并仔细查看瓶签上的名称、字母标志，以确认所取的药品与医药所开的处方一致。

5、在注射药液前要先检查瓶内内容物的外观，常规重组人胰岛素注射液应为均匀的无色透明溶液，如果出现轻度着色、云雾状浑浊、悬浮的颗粒切勿使用，如果发现任何异常或需要改变胰岛素剂量时，必须立即向医生咨询。

6、胰岛素应于 2～10℃避光冷藏，最好于冰箱中保存，切勿冷冻或接近冰格，冰冻过的胰岛素不可使用。一定不要使用超过有效期的胰岛素，若所买的药品保护盖不严，一定要退回药房。

7、甘舒霖 R 通常由皮下注射，在医生指导下，可肌肉注射，只有可溶性人胰岛素注射液可以静脉注射，而且必须由医务人员操作。

8、本品应与通化东宝生产的胰岛素注射笔和东宝针配合使用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

怀孕可使糖尿病更不易控制，因此计划怀孕及怀孕或哺乳期的育龄女患者，都必须向医生咨询。

【儿童用药】

儿童使用本药时，应注意运动量、饮食，以便于更好控制血糖。使用时应按医生调节的剂量由家长或医生进行注射操作。

【老年用药】

老年患者的各组织、器官结构功能发生变化，生理生化储备能力下降，调节机能和适应能力下降，在使用本品时更需注意。

1.肾上腺、垂体、甲状腺等病变或肝肾疾病恶化等易造成低血糖。

2.忘记或推迟进餐易造成低血糖。

3.必要时可由专人控制每次的剂量和注射操作。

【药物相互作用】

如果您正在使用口服避孕药、肾上腺皮质激素、甲状腺激素替代治疗等会引起血糖增高，同时应用时应增加胰岛素的剂量。

如果您正在使用口服降糖药、水杨酸制剂、磺胺类药物和某些抗抑郁药会引起血糖下降，同时应用，应减少胰岛素的剂量。

注意饮食，不要饮用含酒精的饮料。

同一时间服用其它药物时，应请示医生。

【药物过量】

在胰岛素治疗过程中，如果胰岛素用量过多，可出现低血糖反应。轻至中度的低血糖症状可能会突然发生，常常有以下表现：

虚汗	嗜睡
眩晕	失眠
心悸	焦虑
颤抖	视力模糊
饥饿	发音含糊
无力感	情绪低落
手、足、舌、唇部刺痛	易发怒

头晕	行为异常
精力不集中	行为不稳定
头痛	人格改变

严重低血糖时症状如下：

定向障碍	癫痫
意识丧失	死亡

在发生低血糖时获得及时处理是十分重要的。

在有些情况，早期低血糖症状不易察觉，例如长期糖尿病患者，伴有神经病变的糖尿病患者，使用β受体阻滞剂的糖尿病患者，更换胰岛素制剂以及接受胰岛素强化治疗的病人（每日接受3次或3次以上胰岛素注射的治疗方式）。

有少数患者在使用动物源性胰岛素向人体胰岛素转换时会发生低血糖反应，这时早期的低血糖反应不易察觉，且与以往的低血糖反应不同。

如果不能觉察早期低血糖症状，就无法避免严重的低血糖反应。为了警惕低血糖症状发生，必须经常监测血糖浓度。

轻至中度的低血糖可以通过进食或饮用含糖饮料来纠正。较严重的低血糖需要他人的帮助。这时病人可能意识丧失无法自行进食，则需要注射升糖素，或在医疗条件允许的情况下静脉注射葡萄糖。

您必须学会识别自身的低血糖症状，如果不能肯定这些症状，则需通过密切监测血糖来学会识别低血糖症状。

如果您经常发生低血糖且症状不易察觉，必须就医，与医生讨论是否改变治疗方案、饮食和运动计划以避免低血糖的发生。

【药理毒理】

本品是利用重组DNA技术生产的人胰岛素，与天然胰岛素有相同的结构和功能。可调节糖代谢，促进肝脏、骨骼和脂肪组织对葡萄糖的摄取和利用，促进葡萄糖转变为糖原贮存于肌肉和肝脏内，并抑制糖原异生，从而降低血糖。

【药代动力学】

本品皮下注射，因个体差异药物的起效和持续时间差异较大，一般注射后30分钟起效，1～3小时达到高峰，持续约4～8小时。

【贮藏】

于2～8℃避光保存及运输，避免冰冻。

【包装】包装材料：笔式注射器用硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖；1支/小盒

【有效期】24个月

【执行标准】《中国药典》2025年版 三部

【批准文号】国药准字S20020092

【药品上市许可持有人】

名　　称：通化东宝药业股份有限公司

注册地址：吉林省通化县东宝新村

【生产企业】

企业名称：通化东宝药业股份有限公司

生产地址：吉林省通化县东宝新村

邮政编码：134123

电话号码：0435-5088588　　免费咨询电话：800 846 5777

传真号码：0435-5088581　　400 846 5777

网　　址：www.thdb.com