

阶段一过关题集：极限与一元微积分

配套 阶段一_极限与一元微积分.md 讲义使用

用法建议：先闭卷做完题目篇（建议 90 分钟），再对照答案篇订正；错题回到讲义对应小节重看一遍"小妙招"，并把结论补进自测清单。

建议用时分配

篇目	题量	建议用时	说明
一、极限 (L)	21	40 min	A 组 5 min, B 组 15 min, C 组 20 min
二、一元微分学 (D)	10	20 min	高阶导与隐函数是重点
三、一元积分学 (I)	12	20 min	优先用对称性与区间反转，别硬算
四、中值定理 (P)	5	10 min	只写辅助函数与关键一步即可
合计	48	90 min	初赛填空平均 2 min/题，解答题 10 min/题

初次做不完很正常——先保证 A、B 组全对，C 组和 P 组可以留到二刷。

讲义对照表

题组	对应讲义小节	要先掌握的结论
L (极限)	§1.1 极限的计算	等价无穷小表、Taylor 展开表、"小妙招" 5 条
D (一元微分学)	§1.2 一元微分学	高阶导数公式 (拆项 / Leibniz / 复数法)
I (一元积分学)	§1.3 一元积分学	分部积分、区间反转、点火公式、对称性
P (中值定理)	§1.1 例 5 + §1.4 常见失分点	辅助函数构造口诀

难度与题型标记

标记	含义
☆☆☆ / ★☆☆ / ★★★	难度：基础过关 / 进阶 / 挑战
[填空]	只写结果，练速度（对应初赛填空题）
[计算]	要写关键步骤
[证明]	中值定理、不等式类

技巧标签： 等价无穷小 Taylor 洛必达 夹逼 定积分定义 单调有界 1^∞ 型 变限积分 对称性 区间反转
分部积分 拆项 Leibniz 辅助函数 柯西 积分不等式

题目篇

一、极限 (L)

讲义对应： §1.1 极限的计算 **先背熟：** 等价无穷小表 + Taylor 展开表（到 x^3 项）

本节核心： 加减结构必须 Taylor；乘除结构才能用等价无穷小；洛必达是最后的兜底，且**求导后极限不存在不代表原极限不存在**。

A 组 • 基础过关

L-A1 ☆☆☆ [填空] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ 。 等价无穷小陷阱

L-A2 ☆☆☆ [填空] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$ 。 根号差

L-A3 ☆☆☆ [填空] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}$ 。 Taylor

L-A4 ☆☆☆ [填空] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{3}{x}}$ 。 1^∞ 型

L-A5 ☆☆☆ [填空] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$ 。 Taylor

L-A6 ☆☆☆ [计算] 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \sin \frac{k}{n}$ 。 定积分定义

L-A7 ☆☆☆ [填空] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - x}{x^3}$ 。 Taylor

B 组 · 进阶

L-B1 ★★★ [填空] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/3} - 1 - \frac{x}{3}}{x^2}$ 。 Taylor 高精度

L-B2 ★★★ [填空] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x - \frac{x^3}{3}}{x^5}$ 。 Taylor 高精度

L-B3 ★★★ [填空] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$ 。 1^∞ 型

L-B4 ★★★ [计算] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$ 。 夹逼 / 洛必达失效

L-B5 ★★★ [计算] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{1-\cos x} \arcsin t \, dt}{x^4}$ 。 变限积分

L-B6 ★★★ [计算] 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n} \right)$ 。 夹逼

L-B7 ★★★ [计算] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right)$ 。 Taylor

L-B8 ★★★ [计算] 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{\sqrt{x+8} - 3}$ 。 洛必达 + 约分

C 组 · 挑战

L-C1 ★★★ [计算] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}$ 。 复合 Taylor

L-C2 ★★★ [计算] 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x}$ 。 洛必达陷阱

L-C3 ★★★ [计算] 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n - e \right]$ 。 Taylor

L-C4 ★★★ [计算] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^x}{x^3}$ 。 提公因式 + Taylor

L-C5 ★★★ [证明] 设 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ ($n \geq 1$)。证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。 单调有界

L-C6 ★★★ [计算] 设 f 在 $x=0$ 附近连续, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)(x-t) \, dt}{x^2}$ 。 含参变限积分

二、一元微分学 (D)

讲义对应: §1.2 一元微分学 **先背熟:** 高阶导数公式表

本节核心: 高阶导三种方法——**有理函数先拆项、乘积用 Leibniz、 $e^{ax} \sin bx$ 型用复数法**；隐函数求导记得“先求点处的 y 值”。

A 组 · 基础过关

D-A1 ★☆☆ [计算] 设 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$, 求 $f^{(n)}(0)$ 。 拆项

D-A2 ★☆☆ [填空] 设参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1 + t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx} \big|_{t=1}$ 。 参数求导

D-A3 ★☆☆ [填空] 求 $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \sin(t^2) dt$ 。 变限积分求导

D-A4 ★☆☆ [填空] 设 $y = x^x (x > 0)$, 求 y' 。 对数求导

B 组 · 进阶

D-B1 ★★★ [计算] 设 $f(x) = x^2 e^{2x}$, 求 $f^{(n)}(0) (n \geq 2)$ 。 Leibniz

D-B2 ★★★ [计算] 设 $y = y(x)$ 由 $e^y + xy = e$ 确定, 求 $y'(0)$ 与 $y''(0)$ 。 隐函数

D-B3 ★★★ [计算] 设 $f(x) = \int_0^x (t-1)(t-2) dt$, 求 f 的单调区间与极值。 变限 + 极值

D-B4 ★★★ [计算] 求 $f(x) = x^3 - 3x^2$ 的极值、凹凸区间与拐点。 单调性 + 凹凸

C 组 · 挑战

D-C1 ★★★ [计算] 设 $f(x) = x^3 \sin x$, 求 $f^{(6)}(0)$ 。 Leibniz

D-C2 ★★★ [计算] 设 $f(x) = e^x \sin x$, 求 $f^{(n)}(x)$ 。 高阶导通项

三、一元积分学 (I)

讲义对应: §1.3 一元积分学 **先背熟:** 分部积分公式 + 点火公式 + 对称性

本节核心: 动手前先看三件事——① 区间是否对称 (判奇偶)? ② 是否能用区间反转

$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$? ③ 分子次数是否 $\geq$ 分母 (先做除法"拆1")? 这三条能省掉大半计算。

A 组 · 基础过关

I-A1 ★☆☆ [计算] 求 $\int_0^\pi x \sin x dx$ 。 分部积分

I-A2 ★☆☆ [计算] 求 $\int_{-1}^1 \left(\frac{x^3 \cos x}{1+x^2} + \arctan x + 1 \right) dx$ 。 对称性

I-A3 ★☆☆ [计算] 求 $\int_0^1 x e^{2x} dx$ 。 分部积分

B 组 · 进阶

I-B1 ★★★ [计算] 求 $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ 。 区间反转

I-B2 ★★★ [计算] 求 $\int_0^1 x \arctan x dx$ 。 分部积分 + 拆1

I-B3 ★★★ [计算] 求 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$ 。 反常积分

I-B4 ★★★ [填空] 求 $\int_0^{\pi/2} \sin^4 x dx$ 。 点火公式

I-B5 ★★★ [计算] 求 $\int_0^1 x \ln(1+x) dx$ 。 分部积分 + 拆1

I-B6 ★★★ [计算] 求 $\int_0^1 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$ 。 换元

C 组 · 挑战

I-C1 ★★★ [计算] 求 $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$ 。 分部积分降次

I-C2 ★★★ [计算] 求 $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx$ 。 对称性 + 区间反转

I-C3 ★★★ [计算] 求 $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx$ 。 对称性 + 展开

四、中值定理与证明 (P)

讲义对应: §1.1 例 5 (罗尔定理构造) + §1.4 常见失分点

本节核心: 辅助函数构造口诀 —— 把结论里的 ξ 换成 x , 移项使右端为 0, 左端认成 $F'(x)$, 反推 F 。

看到"两个函数增量之比"想柯西; 看到" f + 系数 $\cdot f'$ "想乘积分因子; 看到"两个不同的中值点"想把区间切成两段各用一次。

P-A1 ★☆☆ [证明] 设 f 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导, $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 2\xi$ 。 罗尔

P-B1 ★☆☆ [证明] 设 f 在 $[a, b]$ 连续 ($a > 0$)、在 (a, b) 可导。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f(b) - f(a) = \frac{b^2 - a^2}{2\xi} f'(\xi).$$

柯西

P-B2 ★☆☆ [证明] 设 f 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导 ($0 < a < b$)。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi).$$

乘 $xf(x)$

P-C1 ★★★ [证明] 设 f 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导, $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明: 存在**两个不同的** $\xi, \eta \in (0, 1)$ 使

$$\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2.$$

介值 + 两次拉氏

P-C2 ★★★ [证明] 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续且单调递增。证明:

$$\int_0^1 xf(x) dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx.$$

积分不等式

答案篇

每题给出 **思路** → **关键步骤** → **答案** → **⚠ 易错点**。先自己做完再看。

一、极限

L-A1 ★☆☆ 答案 $\frac{1}{2}$

思路: 加减结构, **不能用**等价无穷小, 必须 Taylor。

$$\begin{aligned}\tan x &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ \tan x - \sin x &= \frac{x^3}{3} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) = \frac{x^3}{2} + o(x^3) \Rightarrow \frac{1}{2}\end{aligned}$$

⚠ **最高频失分点**: 把 $\tan x \rightarrow x, \sin x \rightarrow x$ 代入得 $x - x = 0$, 直接算出 0。记住: **做减法时若两项主部相同, 必须展开到第一个不抵消的阶。**

L-A2 ★☆☆ 答案 1

分子有理化:

$$\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} = \frac{2x}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \rightarrow \frac{2}{2} = 1$$

⚠ 别一上来就洛必达 (能做但慢)。**根式差先看有理化。**

L-A3 ★☆☆ 答案 $\frac{3}{2}$

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^2), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\text{分子} = x^2 + \frac{x^2}{2} + o(x^2) = \frac{3}{2}x^2 + o(x^2) \Rightarrow \frac{3}{2}$$

△ e^{x^2} 别写成 $1 + x + \dots$, 变量是 x^2 , x 的一次项系数为 0。

L-A4 ★☆☆ 答案 e^6

$$1^\infty \text{ 型: } \lim f^g = e^{\lim g(f-1)} = e^{\lim \frac{3}{x} \cdot 2x} = e^6.$$

△ 公式前提是 $f \rightarrow 1, g \rightarrow \infty$ 。若底数趋于 1 而指数有限, 直接代入即可, 别乱套。

L-A5 ★☆☆ 答案 $-\frac{1}{2}$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \Rightarrow \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{2}$$

L-A6 ★☆☆ 答案 $\sin 1 - \cos 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \sin \frac{k}{n} = \int_0^1 x \sin x \, dx = \left[-x \cos x + \sin x \right]_0^1 = \sin 1 - \cos 1 \approx 0.3012$$

△ 定积分定义的**标准形**是 $\frac{1}{n} \sum f\left(\frac{k}{n}\right)$: 先看有没有 $\frac{1}{n}$ (没有就凑), 再把 $\frac{k}{n}$ 认成 x 、区间认成 $[0, 1]$ 。

L-A7 ★☆☆ 答案 $\frac{1}{6}$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \Rightarrow \frac{1}{6}$$

△ 符号: $\arcsin x - x \sim +\frac{x^3}{6}$, 而 $x - \sin x \sim +\frac{x^3}{6}$ 、 $\arctan x - x \sim -\frac{x^3}{3}$ 。三个符号极易混, **建议记"arcsin 与 sin 同号 (正), arctan 与 tan 反号 (负)"**。

L-B1 ★★★ 答案 $-\frac{1}{9}$

$$(1+x)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}x + \frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)}{2}x^2 + o(x^2) = 1 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{9} + o(x^2)$$

$$\text{分子} = -\frac{x^2}{9} + o(x^2) \Rightarrow -\frac{1}{9}$$

△ 展开阶数不够 (只到 x) 会得出 0。减去几阶就要展开到几阶。

L-B2 ★★★ 答案 $-\frac{1}{5}$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$$

$$x - \arctan x = \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + o(x^5) \Rightarrow x - \arctan x - \frac{x^3}{3} = -\frac{x^5}{5} + o(x^5) \Rightarrow -\frac{1}{5}$$

L-B3 ★★★ 答案 $e^{-1/6}$

1^∞ 型:

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{\sin x}{x} - 1\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}} = e^{-1/6}$$

△ $\sin x - x \sim -\frac{x^3}{6}$, 负号别丢; **指数部分的极限本身就要用 Taylor**, 不能再等无穷小糊弄。

L-B4 ★★★ 答案 0

$$\left| \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} \right| = \left| \frac{x}{\sin x} \right| \cdot \left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq \left| \frac{x}{\sin x} \right| \cdot |x| \rightarrow 1 \cdot 0 = 0$$

△ **洛必达在这里失效**: 求导后得 $\frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x}$, 极限不存在, 但原极限存在。"求导后极限不存在"不代表原极限不存在——**洛必达是充分非必要条件**。有界量 $\times$ 无穷小, 优先夹逼。

L-B5 ★★★ 答案 $\frac{1}{8}$

上限 $u(x) = 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, 被积函数 $\arcsin t \sim t$:

$$\int_0^{u(x)} \arcsin t \, dt \sim \int_0^{u(x)} t \, dt = \frac{u(x)^2}{2} \sim \frac{(x^2/2)^2}{2} = \frac{x^4}{8} \Rightarrow \frac{1}{8}$$

△ 变限积分求极限的**两步走**: ① 被积函数先等价无穷小; ② 别漏掉上限的阶 (这里上限是 x^2 阶, 积分后变 x^4 阶)。若用洛必达, 一定记得乘上限导数 $\sin x \sim x$ 。

L-B6 ★★★ 答案 1

每一项都在 $\left[\frac{1}{n^2+n}, \frac{1}{n^2+1}\right]$ 内, 共 n 项:

$$\frac{n}{n^2+n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2+k} \leq \frac{n}{n^2+1}$$

乘 n : $\frac{n^2}{n^2+n} \leq (\cdot) \leq \frac{n^2}{n^2+1}$, 两端 $\rightarrow 1$, 由夹逼知极限为 1。

△ 别误当成定积分定义 (这里没有 $\frac{k}{n}$ 的结构, 凑不出来)。**"和式里每一项都差不多大" $\rightarrow$ 夹逼。**

L-B7 ★★★ 答案 $\frac{1}{3}$

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \frac{(x - \sin x)(x + \sin x)}{x^2 \sin^2 x} \sim \frac{\frac{x^3}{6} \cdot 2x}{x^4} = \frac{1}{3}$$

△ 这是 $\infty - \infty$ 型，**先通分再算**，不能分别对两项取极限。因式分解 $x^2 - \sin^2 x = (x - \sin x)(x + \sin x)$ 是关键一步。

L-B8 ★★★ 答案 $\frac{3}{2}$

洛必达：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x+3}}}{\frac{1}{2\sqrt{x+8}}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8}}{\sqrt{x+3}} = \frac{3}{2}$$

△ 求导后**先约掉公共因子**（本题约掉 2 和根号结构）再代值，能省一半计算。

L-C1 ★★★ 答案 $\frac{1}{6}$

$$\begin{aligned} \sin^2 x &= \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4), & \sin^4 x &= x^4 + o(x^4) \\ \cos(\sin x) &= 1 - \frac{\sin^2 x}{2} + \frac{\sin^4 x}{24} + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^4) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \Rightarrow \cos(\sin x) - \cos x = \frac{4x^4}{24} + o(x^4) = \frac{x^4}{6} \Rightarrow \frac{1}{6} \end{aligned}$$

△ **复合函数要展开到底**： $\cos(\sin x)$ 不能先把 $\sin x$ 替成 x （那就是 $\cos x - \cos x = 0$ ）。必须先把内层写到 x^3 阶，再代进外层的 $\cos$ 。

L-C2 ★★★ 答案 1

$$\frac{x + \sin x}{x} = 1 + \frac{\sin x}{x} \rightarrow 1 + 0 = 1 \quad (\text{有界量}/\infty \rightarrow 0)$$

△ **洛必达陷阱题**：洛必达给出 $\frac{1 + \cos x}{1}$ ，极限不存在——于是有人误答“极限不存在”。记住：**洛必达失效时回到定义**（ $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$ 是“有界÷无穷”），这是初赛最爱挖的坑之一。

L-C3 ★★★ 答案 $-\frac{e}{2}$

$$\begin{aligned} n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) &= n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o(n^{-3})\right) = 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + o(n^{-2}) \\ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= e \cdot e^{-\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + o(n^{-2})} = e \left(1 - \frac{1}{2n} + o(n^{-1})\right) \end{aligned}$$

$$n\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n - e\right] = e\left(-\frac{1}{2} + o(1)\right) \rightarrow -\frac{e}{2}$$

△ 展开必须**保留到** $\frac{1}{n}$ **项**：只写 e^1 会得到 0。另外 $e^u = 1 + u + o(u)$ 中的 $u = -\frac{1}{2n} + O(n^{-2})$, $O(n^{-2})$ 乘 n 后仍 $\rightarrow 0$, 故可丢。

L-C4 ★★★ 答案 $\frac{1}{3}$

$$e^{\tan x} - e^x = e^x (e^{\tan x - x} - 1) \sim 1 \cdot \left(\frac{x^3}{3}\right) \Rightarrow \frac{1}{3} \quad (\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}, e^u - 1 \sim u)$$

△ **先提公因式再等价**：若分别对 $e^{\tan x}$ 、 e^x 做等价无穷小，会得到 $(1 + \tan x) - (1 + x) = \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$ ——答案碰巧对，但这是错的运气，因为 $e^u - 1 \sim u$ 只在 $u \rightarrow 0$ 时成立，而 $e^{\tan x} \neq 1 + \tan x$ 作为整体替换并不可靠。**规范做法永远是先提 e^x** 。

L-C5 ★★★ 答案 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$

有界性 (归纳)： $a_1 = \sqrt{2} < 2$ ；若 $a_n < 2$ ，则 $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{4} = 2$ 。故 $a_n < 2$ 。

单调性：

$$a_{n+1} - a_n = \sqrt{2 + a_n} - a_n = \frac{2 + a_n - a_n^2}{\sqrt{2 + a_n} + a_n} = \frac{(2 - a_n)(1 + a_n)}{\sqrt{2 + a_n} + a_n} > 0$$

(因 $0 < a_n < 2$)，故 $\{a_n\}$ 单调递增。

单调有界 $\Rightarrow$ 收敛，设极限为 A 。对递推式取极限： $A = \sqrt{2 + A} \Rightarrow A^2 - A - 2 = 0 \Rightarrow A = 2$ (舍 $A = -1$)。

△ ① 单调性证明**不能跳过**：先有界、后单调，或先单调、后有界都行，但两个都要写；② 解方程得两个根时，用 $a_n > 0$ 舍负根。

L-C6 ★★★ 答案 $\frac{f(0)}{2}$

把 x 提出积分号 (对 t 积分时 x 是常数)：

$$\int_0^x f(t)(x-t)dt = x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt$$

洛必达一次：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt + xf(x) - xf(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt}{2x} = \text{洛} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2} = \frac{f(0)}{2}$$

△ **最大的坑**：上层积分里藏着 x ，不能直接套 $\int_0^x g(t)dt \sim g(0)x$ (被积函数依赖于 x)。必须先拆成两项，或直接洛必达。

二、一元微分学

D-A1 ★☆☆ 答案 $f^{(n)}(0) = -\frac{n!}{2}[1 + (-1)^n]$, 即 n 为偶数时 $-n!$, n 为奇数时 0

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^2-1} &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right) \\ f^{(n)}(x) &= \frac{(-1)^n n!}{2} \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right] \\ f^{(n)}(0) &= \frac{(-1)^n n!}{2} [(-1)^{n+1} - 1] = -\frac{n!}{2} [1 + (-1)^n]\end{aligned}$$

△ ① 分母必须**先因式分解再拆项**, 别对 $x^2 - 1$ 硬求导; ② 代入 $x = 0$ 时 $(-1)^{n+1}$ 的符号最容易错, 建议用 $n = 0$ (得 $-1 = f(0)$ ✓)、 $n = 1$ (得 $0 = f'(0)$ ✓) 验一遍。

D-A2 ★☆☆ 答案 $\frac{1}{2}$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \frac{dy}{dt} = 1 - \frac{1}{1+t^2} = \frac{t^2}{1+t^2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{t^2/(1+t^2)}{2t/(1+t^2)} = \frac{t}{2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} \Big|_{t=1} = \frac{1}{2}$$

△ 别把 $\frac{dy}{dx}$ 算成 $\frac{dx/dt}{dy/dt}$ (分子分母颠倒); 先化简再代值。

D-A3 ★☆☆ 答案 $3x^2 \sin(x^6) - 2x \sin(x^4)$

$$\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \sin(t^2) dt = \sin((x^3)^2) \cdot 3x^2 - \sin((x^2)^2) \cdot 2x$$

△ 上限导数是 $3x^2$ 、下限导数是 $2x$, **两处都不能漏**; 且代入的是 t^2 中的 t 后再平方:
 $\sin(t^2) \Big|_{t=x^3} = \sin(x^6)$, 别写成 $\sin(x^3)$ 。

D-A4 ★☆☆ 答案 $y' = x^x(1 + \ln x)$

取对数: $\ln y = x \ln x$, 求导 $\frac{y'}{y} = \ln x + 1 \Rightarrow y' = x^x(1 + \ln x)$ 。

△ x^x 既不是幂函数也不是指数函数, **只能用对数求导** (或写成 $e^{x \ln x}$)。

D-B1 ★★☆☆ 答案 $f^{(n)}(0) = n(n-1)2^{n-2} (n \geq 2)$

Leibniz 公式, 取 $u = e^{2x}$, $v = x^2$ (v 只有 $0, 1, 2$ 阶导非零):

$$f^{(n)}(x) = \binom{n}{0} 2^n e^{2x} x^2 + \binom{n}{1} 2^{n-1} e^{2x} \cdot 2x + \binom{n}{2} 2^{n-2} e^{2x} \cdot 2$$

代入 $x = 0$, 前两项含因子 x 归零:

$$f^{(n)}(0) = 2 \binom{n}{2} 2^{n-2} = n(n-1)2^{n-2}$$

△ ① **把多项式当 v** (指数当 u) , 这样只有 3 项非零; 反过来把多项式当 u 也能做但更烦; ② 用级数验证:

$$x^2 e^{2x} = x^2 (1 + 2x + 2x^2 + \cdots), \quad x^n \text{ 系数} = \frac{2^{n-2}}{(n-2)!}, \quad \text{故 } f^{(n)}(0) = n! \cdot \frac{2^{n-2}}{(n-2)!} = n(n-1)2^{n-2} \checkmark$$

D-B2 ★★★ 答案 $y'(0) = -\frac{1}{e}, \quad y''(0) = \frac{1}{e^2}$

$x=0$ 时 $e^y = e \Rightarrow y(0) = 1$ 。

一阶: $e^y y' + y + xy' = 0$ 。代入 $(0, 1)$: $e \cdot y'(0) + 1 = 0 \Rightarrow y'(0) = -\frac{1}{e}$ 。

二阶: 对 $e^y y' + y + xy' = 0$ 再求导:

$$e^y (y')^2 + e^y y'' + y' + y' + xy'' = 0$$

$$\text{代入 } x=0, y=1, y' = -\frac{1}{e}: e \cdot \frac{1}{e^2} + e y'' + 2 \left(-\frac{1}{e}\right) = 0 \Rightarrow \frac{1}{e} + e y'' - \frac{2}{e} = 0 \Rightarrow y''(0) = \frac{1}{e^2}$$

△ ① 隐函数求导时 y 是 x 的函数, $(xy)' = y + xy'$ 别漏 y ; ② 二阶导要**对一阶导方程整体求导**, 而不是对原方程求两次 (后者也行但更易错); ③ 必须先由原方程求出 $y(0) = 1$ 。

D-B3 ★★★ 答案 在 $(-\infty, 1)$ 与 $(2, +\infty)$ 递增, $(1, 2)$ 递减; 极大值 $f(1) = \frac{5}{6}$, 极小值 $f(2) = \frac{2}{3}$

$$f'(x) = (x-1)(x-2), \quad f(x) = \int_0^x (t^2 - 3t + 2)dt = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x$$

$$f(1) = \frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 2 = \frac{5}{6}, \quad f(2) = \frac{8}{3} - 6 + 4 = \frac{2}{3}$$

△ 变限积分求导**不要先算出原函数再求导** (绕远且易算错), 直接 $f'(x) =$ 被积函数在上限处的值。

D-B4 ★★★ 答案 极大 $f(0) = 0$, 极小 $f(2) = -4$; $x > 1$ 时 $f'' > 0$ (凹弧), $x < 1$ 时 $f'' < 0$ (凸弧); 拐点 $(1, -2)$

$$f' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2), \quad f'' = 6x - 6 = 6(x-1)$$

f' 在 $x=0$ 处由 $+$ $\rightarrow$ $-$ (极大), $x=2$ 处由 $-$ $\rightarrow$ $+$ (极小); f'' 在 $x=1$ 变号。

△ 极值看 f' **变号**, 不要只看 $f' = 0$ 的点; 拐点看 f'' 变号, 且该点处曲线要有切线 (本题处处可导, 满足)。

D-C1 ★★★ 答案 -120

$$\text{Leibniz: } (x^3 \sin x)^{(6)} = \sum_{k=0}^6 \binom{6}{k} (\sin x)^{(k)} (x^3)^{(6-k)}.$$

$(x^3)^{(m)} \neq 0$ 仅当 $m \leq 3$, 故只需 $6-k \leq 3$, 即 $k \geq 3$; 代入 $x=0$ 时 $(x^3)^{(m)}|_{x=0} = 0$ 对 $m < 3$, 仅 $m=3$ (即 $k=3$) 存活:

$$f^{(6)}(0) = \binom{6}{3} (\sin x)^{(3)}|_{x=0} \cdot (x^3)^{(3)} = 20 \cdot (-\cos x)|_{x=0} \cdot 6 = 20 \cdot (-1) \cdot 6 = -120$$

△ 用级数验证最快: $x^3 \sin x = x^3 \left(x - \frac{x^3}{6} + \dots \right) = x^4 - \frac{x^6}{6} + \dots$, 故 $\frac{f^{(6)}(0)}{6!} = -\frac{1}{6} \Rightarrow f^{(6)}(0) = -120 \checkmark$ 。

遇到“求某一点的高阶导”，优先想到幂级数（阶段三会系统讲）。

D-C2 ★★★ 答案 $f^{(n)}(x) = 2^{n/2} e^x \sin \left(x + \frac{n\pi}{4} \right)$

方法一（复数）： $e^x \sin x = \operatorname{Im} e^{(1+i)x}$ ，而 $(1+i)^n = 2^{n/2} e^{in\pi/4}$ ，故

$$f^{(n)}(x) = \operatorname{Im} [(1+i)^n e^{(1+i)x}] = 2^{n/2} e^x \sin \left(x + \frac{n\pi}{4} \right)$$

方法二（归纳）： $f' = e^x (\sin x + \cos x) = \sqrt{2} e^x \sin(x + \frac{\pi}{4})$ ，每求一次导振幅乘 $\sqrt{2}$ 、相位加 $\frac{\pi}{4}$ 。

△ 别把 $(e^x \sin x)^{(n)}$ 拆成 e^x 乘 $\sin$ 的 n 阶导——乘积的高阶导必须用 **Leibniz 或复数法**。

三、一元积分学

I-A1 ★☆☆ 答案 π

$$\int_0^\pi x \sin x \, dx = \left[-x \cos x \right]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x \, dx = \pi + 0 = \pi$$

△ 分部时把**多项式取作 u** （求导降次）； $[-x \cos x]_0^\pi = -\pi \cos \pi + 0 = \pi$ ，符号别错。

I-A2 ★☆☆ 答案 2

$\frac{x^3 \cos x}{1+x^2}$ 是奇函数（奇/偶）， $\arctan x$ 是奇函数，1 是偶函数：

$$\int_{-1}^1 (\text{奇}) dx + \int_{-1}^1 (\text{奇}) dx + \int_{-1}^1 1 \, dx = 0 + 0 + 2 = 2$$

△ **看到对称区间先判奇偶，能省掉 90% 的计算**。判断时逐项处理： $\frac{\text{奇} \times \text{偶}}{\text{偶}} = \text{奇}$ 。

I-A3 ★☆☆ 答案 $\frac{e^2 + 1}{4}$

$$\int_0^1 x e^{2x} dx = \left[\frac{x e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} \right]_0^1 = \left(\frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} \right) - \left(0 - \frac{1}{4} \right) = \frac{e^2 + 1}{4}$$

I-B1 ★★★ 答案 $\frac{\pi}{4}$

设 $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ 。用 $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$ ：

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx$$

两式相加: $2I = \int_0^{\pi/2} 1 dx = \frac{\pi}{2} \Rightarrow I = \frac{\pi}{4}$

△ 这是“**区间反转**”神技的标准例题。同类: $\frac{\sin^p x}{\sin^p x + \cos^p x}$ 、 $\frac{1}{1 + \tan^a x}$ 、 $\ln \sin$ 型都能用。直接硬算原函数几乎算不出来。

I-B2 ★★★ 答案 $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \arctan x dx &= \left[\frac{x^2}{2} \arctan x \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

△ $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$ 这个“**拆1**”技巧, 凡被积函数分子次数 $\geq$ 分母次数时先做除法。

I-B3 ★★★ 答案 $\frac{\pi}{4}$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)^2 + 1} = \left[\arctan(x+1) \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

△ 反常积分要写极限形式 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A$; 配方后直接套 $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$ 。

I-B4 ★★★ 答案 $\frac{3\pi}{16}$

点火公式 (n 偶): $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$

△ 双阶乘别跳项: $3!! = 3 \cdot 1$, $4!! = 4 \cdot 2$ 。 n 为偶数时**必须乘** $\frac{\pi}{2}$, 奇数时不乘。

I-B5 ★★★ 答案 $\frac{1}{4}$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \ln(1+x) dx &= \left[\frac{x^2}{2} \ln(1+x) \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx = \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(x - 1 + \frac{1}{1+x} \right) dx \\ &= \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} - x + \ln(1+x) \right]_0^1 = \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

△ $\frac{x^2}{1+x} = x - 1 + \frac{1}{1+x}$ (多项式除法)。这类题 $\ln$ 项会**恰好抵消**, 若算完还剩 $\ln 2$ 说明算错了。

I-B6 ★★★ 答案 $2 - 2\ln 2$

令 $t = \sqrt{x}$, $x = t^2$, $dx = 2t dt$:

$$\int_0^1 \frac{2t}{1+t} dt = 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt = 2 \left[t - \ln(1+t)\right]_0^1 = 2 - 2\ln 2$$

△ 换元**必须同步换上下限** (本题恰好都是 $0 \rightarrow 1$, 但别养成不换的坏习惯)。

I-C1 ★★★ 答案 2

分部两次 (或记 $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n!$) :

$$\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx = \left[-x^2 e^{-x}\right]_0^\infty + 2 \int_0^\infty x e^{-x} dx = 0 + 2 \left(\left[-x e^{-x}\right]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-x} dx\right) = 2$$

△ $x \rightarrow +\infty$ 时 $x^2 e^{-x} \rightarrow 0$ (指数压倒多项式), 边界项为 0。结论 $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$ 值得背下来。

I-C2 ★★★ 答案 $-\frac{\pi}{2}\ln 2$

设 $I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx$ 。由区间反转 $I = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos x) dx$, 故

$$2I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x \cos x) dx = \int_0^{\pi/2} \ln \frac{\sin 2x}{2} dx = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x) dx - \frac{\pi}{2} \ln 2$$

令 $u = 2x$: $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x) dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi \ln(\sin u) du = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^{\pi/2} \ln(\sin u) du = I$

$$2I = I - \frac{\pi}{2} \ln 2 \Rightarrow I = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

△ ① $x=0$ 处 $\ln \sin x \rightarrow -\infty$, 是**瑕积分**, 需说明收敛 (与 $\int_0^\varepsilon \ln x dx$ 比较, 收敛); ② 关键恒等式 $\int_0^\pi \ln \sin u du = 2 \int_0^{\pi/2} \ln \sin u du$ 来自 $\ln \sin(\pi-u) = \ln \sin u$ 。

I-C3 ★★★ 答案 2

$$(x + \sqrt{1-x^2})^2 = x^2 + 2x\sqrt{1-x^2} + 1 - x^2 = 1 + 2x\sqrt{1-x^2}$$

中间项是奇函数, 在 $[-1, 1]$ 上积分为 0:

$$\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx = \int_{-1}^1 1 dx = 2$$

△ **先展开、再看奇偶**, 比直接硬算三角换元快得多。这题的陷阱是一上来就令 $x = \sin t$ 。

四、中值定理与证明

P-A1 ☆☆☆ 提示

令 $F(x) = f(x) - x^2$, 则 $F(0) = f(0) - 0 = 0$, $F(1) = f(1) - 1 = 0$ 。由罗尔定理, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 2\xi$ 。

△ 口诀：把结论里的 ξ 换成 x ，移项使右端为 0，左端认成 $F'(x)$ ，反推 F 。

P-B1 ★★★ 提示

取 $g(x) = x^2$ ，在 $[a, b]$ 上对 f, g 用柯西中值定理 ($a > 0$ 保证 $g'(x) = 2x \neq 0$)：

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi} \Rightarrow f(b) - f(a) = \frac{b^2 - a^2}{2\xi} f'(\xi)$$

△ ① 用柯西必须说明 $g' \neq 0$ ，这就是题目给 $a > 0$ 的原因；② 看到“两个函数增量之比”或含 $\frac{f'(\xi)}{\text{某式}}$ 的结论 → 柯西。

P-B2 ★★★ 提示

令 $F(x) = xf(x)$ ，则 F 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导。拉格朗日：

$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(\xi) = f(\xi) + \xi f'(\xi) \Rightarrow \frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi)$$

△ 识别特征：结论里的 $f(\xi) + \xi f'(\xi)$ 正好是 $(xf(x))'$ ——看到“ $f + \text{系数} \cdot f'$ ”就想“乘个积分因子”。本题其实也可用柯西（取 $g(x) = x$ 作用在 $F = xf$ 上）。

P-C1 ★★★ 提示

f 连续且 $f(0) = 0, f(1) = 1$ ，由介值定理 $\exists c \in (0, 1)$ 使 $f(c) = \frac{1}{2}$ 。

在 $[0, c]$ 用拉氏： $f(c) - f(0) = cf'(\xi) \Rightarrow \frac{1}{2} = cf'(\xi) \Rightarrow \frac{1}{f'(\xi)} = 2c$ ；

在 $[c, 1]$ 用拉氏： $f(1) - f(c) = (1 - c)f'(\eta) \Rightarrow \frac{1}{2} = (1 - c)f'(\eta) \Rightarrow \frac{1}{f'(\eta)} = 2(1 - c)$ 。

相加： $\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2c + 2(1 - c) = 2$ 。由 $\frac{1}{2} > 0$ 且 $c, 1 - c > 0$ 知 $f'(\xi), f'(\eta) \neq 0$ ，且 $\xi < c < \eta$ 故 $\xi \neq \eta$ 。

△ ① “两个不同的中值点” = 把区间切成两段各用一次中值定理，切点靠介值定理找；② 必须论证 $f' \neq 0$ 才能取倒数。

P-C2 ★★★ 提示

$$\int_0^1 xf(x)dx - \frac{1}{2} \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x)dx = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) [f(x) - f(\frac{1}{2})]dx$$

(因 $\int_0^1 (x - \frac{1}{2})dx = 0$ ，可自由减去常数 $f(\frac{1}{2})$ 。)

$x > \frac{1}{2}$ 时， $x - \frac{1}{2} > 0$ 且由单调性 $f(x) - f(\frac{1}{2}) \geq 0$ ； $x < \frac{1}{2}$ 时两项都 ≤ 0 。故被积函数处处 ≥ 0 ，积分 ≥ 0 。

△ 核心技巧: **"减去一个常数使积分不变"** (因为权重积分为 0) , 从而把单调性转化成"分段同号相乘"。这是证明积分不等式的通用套路。

附：技巧 → 题号速查表

技巧	对应题号
加减结构必须 Taylor (不可等价替换)	L-A1, L-B1, L-B2, L-C1
复合函数 Taylor 展开到底	L-C1, L-C4
1^∞ 型 $\lim f^g = e^{\lim g(f-1)}$	L-A4, L-B3
洛必达 (含约分优化)	L-B5, L-B8, L-C6
洛必达失效 / 陷阱	L-B4, L-C2
夹逼准则 (有界×无穷小、和式放缩)	L-B4, L-B6
定积分定义	L-A6
单调有界 (递推数列)	L-C5
变限积分 (求导 / 求极限 / 含参)	D-A3, L-B5, L-C6, D-B3
高阶导: 拆项	D-A1
高阶导: Leibniz	D-B1, D-C1
高阶导: 复数 / 归纳	D-C2
隐函数、参数方程、对数求导	D-A2, D-A4, D-B2
中值定理辅助函数构造	P-A1, P-B1, P-B2, P-C1
分部积分 + 拆 1	I-A1, I-A3, I-B2, I-B5
对称性 (奇偶)	I-A2, I-C3
区间反转	I-B1, I-C2
点火公式	I-B4
反常积分	I-B3, I-C1
积分不等式	P-C2

自测评分标准

结果	判断	下一步
A 组全对, B 组对 80%+	阶段一过关	直接进阶段二
A 组错 ≥2 题	基础有洞	重背讲义的等价无穷小与 Taylor 表, 重做 L-A1/L-A7
B 组错 ≥4 题	技巧不熟	按上表按技巧分类重刷, 重点 L-B4、L-B7、I-B2
C 组错 ≥5 题	正常	C 组是拉分题, 留到冲刺期二刷; 现阶段先搞懂 L-C1、L-C5、I-C2
P 组写不出辅助函数	套路没内化	把 P-A1/P-B2 的构造口诀抄在卡片上, 隔天默写一遍

附二：公式速查卡（考前 10 分钟看）

等价无穷小 (x → 0)

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x$$
$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \ln(1 + x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad (1 + x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

三阶项（做减法时才用得到，符号极易混）

$$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6} (+), \quad \arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6} (+), \quad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3} (+), \quad x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3} (+)$$

记法：arcsin 与 sin **同号**（都偏大），arctan 与 tan **反号**（tan 偏大、arctan 偏小）。做题时先写出一项再定符号，别硬背。

Taylor 展开（到 x⁵ 项）

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$$
$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$
$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4), \quad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$$
$$(1 + x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha - 1)(\alpha - 2)}{6}x^3 + o(x^3)$$

1[∞] 型

$$\lim f^g = e^{\lim g(f-1)} \quad (f \rightarrow 1, g \rightarrow \infty)$$

高阶导数

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)} &= \frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}, & (e^{ax})^{(n)} &= a^n e^{ax} \\ (\sin ax)^{(n)} &= a^n \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right), & (\cos ax)^{(n)} &= a^n \cos\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right) \\ (uv)^{(n)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)} \quad (\text{Leibniz}) \\ (e^x \sin x)^{(n)} &= 2^{n/2} e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

积分

$$\begin{aligned} \int u dv &= uv - \int v du \\ \int_0^a f(x) dx &= \int_0^a f(a-x) dx \quad (\text{区间反转}) \\ \int_{-a}^a f(x) dx &= \begin{cases} 2 \int_0^a f(x) dx, & f \text{ 偶} \\ 0, & f \text{ 奇} \end{cases} \\ \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx &= \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 偶} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 奇} \end{cases} \\ \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx &= n!, & \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx &= -\frac{\pi}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

变限积分求导

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt = f(b(x))b'(x) - f(a(x))a'(x)$$

附三：高频易错点清单（考前自检）

按出现频率排序，**每条都在本套题里有对应题号**：

#	易错点	对应题
1	加减结构用等价无穷小 ($\tan x - \sin x \rightarrow 0$)	L-A1
2	展开阶数不够 (减了几阶就要展到几阶)	L-A1、L-B1、L-B2
3	洛必达失效时误答"极限不存在"	L-B4、L-C2
4	变限积分漏掉上限的导数 (上限是 $\sin^2 x$ 时漏 $2\sin x \cos x$)	L-B5、D-A3
5	被积函数含 x 时直接套 $\int_0^x g \sim g(0)x$	L-C6
6	$\infty - \infty$ 型分别取极限 (必须先通分)	L-B7
7	复合函数 Taylor 只展开内层 ($\cos(\sin x)$ 不能把 $\sin x$ 替成 x)	L-C1
8	$e^u - 1 \sim u$ 在不等价时硬用 (应先提公因式)	L-C4
9	单调性证明只写一半 (有界与单调都要证)	L-C5
10	隐函数求导不先求点处的 y 值	D-B2
11	高阶导不用 Leibniz 而硬求导	D-B1、D-C1
12	$f' = 0$ 就断言极值 (要看 f' 变号)	D-B4
13	对称区间不判奇偶就硬算	I-A2、I-C3
14	双阶乘跳项 ($3!! = 3 \cdot 1$, 不是 $3 \cdot 2 \cdot 1$)	I-B4
15	换元不换上下限	I-B6
16	中值定理取倒数前不论证 $f' \neq 0$	P-C1
17	辅助函数构造不出 (背口诀)	P-A1、P-B2