

# フーリエ反転公式

1

命題 1.1.  $f \in L^1(\mathbb{R})$ ,  $\mathcal{F}f \in L^1(\mathbb{R})$  であるならば,

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}f(x)$$

が成り立つ.

証明.

$$f_t(x) := \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{ix\xi} e^{-t\xi^2} \left( \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi y} f(y) dy \right) d\xi$$

と定める.  $e^{ix\xi} e^{-t\xi^2} e^{-i\xi y} f(y)$  が  $y$  に関して可積分で,  $e^{-t\xi^2} \|f\|_{L^1}$  が  $\xi$  に関して可積分であるので, フビニの定理より,

$$\begin{aligned} f_t(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \left( \int_{\mathbb{R}} e^{i(x-y)\xi} e^{-t\xi^2} d\xi \right) f(y) dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \left( \frac{\pi}{t} \right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}} f(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{1}{2}}} e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}} f(y) dy \end{aligned}$$

が成り立つ.  $\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{1}{2}}} e^{-\frac{\|x-y\|^2}{4t}}$  は  $\mathbb{R}$  における熱核であるので,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|f_t - f\|_{L^1} = 0$$

が成り立つ. 従って, 概収束部分列がとれることと,  $\left| e^{ix\xi} e^{-t\xi^2} \mathcal{F}f(\xi) \right| \leq |\mathcal{F}f(\xi)| \in L^1$  より優収束定理が成り立つことから,

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} f_t(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{ix\xi} \left( \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi y} f(y) dy \right) d\xi = \mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}f(x)$$

が成り立つ. □

命題 1.2.  $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$  に対して,

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}f(x)$$

が成り立つ.

証明.  $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^1(\mathbb{R})$  であることと, 急減少関数のフーリエ変換が急減少関数であることから, 主張が従う. □