

## 局所テストと同値な条件

### 1

設定 1.1.  $\mathcal{D}' = \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  とする.

定義 1.2.  $T \in \mathcal{D}'$  が  $x \in \mathbb{R}^n$  において局所的に  $C^\infty$  であるとは,  $x$  の開近傍  $U_x$  と  $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$  で,  $\text{supp} \varphi \subset U_x$  である  $\varphi \in \mathcal{D}$  に対して

$$T\varphi = \int f(x)\varphi(x)dx$$

を満たすものが存在することをいう.

注意 1.3. こういう  $f$  を,  $T$  を  $U_x$  において代表する関数ということにする.

命題 1.4.  $T \in \mathcal{D}'$  が  $x \in \mathbb{R}^n$  において局所的に  $C^\infty$  であることと,  $\chi(x) \neq 0$  である  $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  に対して  $\chi T \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  が成り立つことは必要十分である.

証明.  $(\Leftarrow)$ . 明らか.  $(\Rightarrow)$ . 適当な開集合  $U_x$  と,  $T$  を  $U_x$  において代表する関数  $f \in C^\infty(U_x)$  をとる.  $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  として,  $x$  で局所的に  $\chi(x) \neq 0$  であるようなものをとると, 任意の  $\varphi \in \mathcal{D}'$  に対して,

$$(\chi T, \varphi) = (T, \chi\varphi)$$

であるが,  $\text{supp} \chi\varphi \subset U_x$  であるので,

$$(T, \chi\varphi) = \int f(x)\chi(x)\varphi(x)dx$$

が成り立つので, 超関数の意味で  $\chi T = \chi f$  であるが, 右辺が  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  であるので, 主張が従う.  $\square$