

Dimensionality Reduction in Scikit-Learn

Scikit-Learn 降维

通过投影、旋转这两个几何视角理解主成分分析



读书好比生火,每一个字都是一个火花。

To learn to read is to light a fire; every syllable that is spelled out is a spark.

—— 雨果 (Victor Hugo) | 法国文学家 | 1802 ~ 1885



- sklearn.preprocessing.StandardScaler() 用于对数据进行标准化处理
- sklearn.decomposition.PCA() 执行主成分分析 PCA 以减少数据维度
- sklearn.covariance.EmpiricalCovariance() 计算基于样本的经验协方差矩阵




31.1 隆维

降维 (dimensionality reduction) 是机器学习和数据分析领域中的重要概念,指的是将高维数据映射到低维空间中的过程。在现实世界中,很多数据集都具有很高的维度,每个数据点可能包含大量特征或属性。然而,高维数据在处理和分析时可能会面临一些问题,例如计算复杂度增加、维度诅咒、可视化困难等。

维度诅咒 (curse of dimensionality) 用来描述数据特征 (维度) 增加时,数据特征空间体积指数增大。如所示,一个特征选取 6 个采样点,一维空间就 6 个点,二维空间有 36 (6^2) 个点,三维空间有 216 (6^3) 个点。如所示,四维空间有 1296 (6^4) 个点。而 10 个特征则达到惊人的 60466176 (6^{10})个点。

而降维的目标是通过保留尽可能多的信息,将高维数据投影到一个更低维的子空间,以便更有效地 处理和分析数据,减少计算负担,提高模型的性能和可解释性。



本书第 27 章介绍过主成分分析。简单来说,主成分分析 (Principal Component Analysis, PCA) 将原始特征投影到新的正交特征空间上,以保留最大方差的特征。PCA 能够去除数据中的冗余信息,提取最重要的特征。本章还会采用几何视角继续探讨如何用 PCA 完成降维。

此外,我们也可以利用流形学习完成非线性降维。流形学习 (manifold learning) 是一种无监督学习方法,用于在高维数据中发现潜在的低维结构。在高维空间中,数据点通常是分散的,而流形学习算法的

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。

版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466

欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

目标是将这些分散的数据点映射到一个低维流形中,从而更好地理解数据的结构和特征。本书不展开讲解流形学习。

本书前文主要是从数据角度介绍如何使用主成分分析完成数据降维和近似还原;本章则要用几何视角和大家聊聊主成分分析,让大家深度理解主成分分析背后的思想。

当然想要真正理解主成分分析,离不开线性代数、概率统计工具,这是鸢尾花书《矩阵力量》、《统计至简》要解决的问题。

31.2 主成分分析

本书前文介绍过,一般情况,PCA的基本思路是将数据投影到由主成分构成的新坐标系中,其中主成分是一组方向上方差最大的基向量。

为了方便讨论,如图 3 所示,我们先对数据进行去均值 (中心化) 处理。几何上来看,就是把数据的 质心 (centroid) μ 移动到原点 θ 。

此外,图3中椭圆和散点的关系是通过协方差矩阵联系起来的。本书前文介绍高斯分布时,大家已经建立了各种协方差矩阵和椭圆的联系。




图 3. 将质心移到原点

本书前文介绍过,在进行 PCA 前一般要对数据进行标准化 (standardization)。标准化可以消除数据不同特征尺度不同的影响,标准化过程还完成了去单位化,每个特征数据都变成了 Z 分数。PCA 的目标是找到数据中方差最大的方向,即主成分。如果某个特征具有很大的方差,即使它在原始数据中不是最主要的特征,它在 PCA 中仍然可能成为主成分,导致降维后损失了其他重要信息。标准化可以将所有特征的标准差调整为 1,从而避免方差主导的问题。而标准化包含两步——平移、缩放。其中,平移就是数据去均值,即中心化。

想要了解主成分分析,就必须理解数据投影 (projection)。图 4 所示为二维数据最简单的投影,分别向横轴、纵轴投影。在平面上,二维数据可以用散点图可视化。散点的横轴坐标就是数据的第一特征,散点的纵坐标就是数据的第二特征。因此,图 4 的投影过程实际上就是将数据的第一、第二特征分离,然后分别计算各个特征的均值、标准差。由于数据已经中心化,各个特征的均值为 0。

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。

版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466

欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

我们在《矩阵力量》中会详细了解数据投影使用的数学工具。




图 4. 分别向横轴、纵轴投影、并绘制一维数据分布

主成分分析的目标是将原始数据投影到一个新的坐标系中,使得投影后的数据具有最大的方差。通过这种方式,可以捕获数据中的主要变化方向,从而实现数据降维和特征提取。在进行投影时,第一个主成分的方向被选择为能够使投影后方差最大化的方向。

显然,图4所示的两个投影方向并不完美,我们可以尝试找到更好的投影方向。

如图 5 所示,平面散点朝 16 个不同方向投影,并计算投影结果的方差值。从图 5 中每个投影结果的分布宽度,用标准差量化,我们就可以得知 C、K 这两个方向就是我们要找的第一主成分方向。G、O 这两个方向也值得我们关注,因为这两个方向上投影结果的方差 (标准差的平方) 最小。

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载:https://github.com/Visualize-ML

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466




图 5. 二维数据分别朝 16 个不同方向投影

换个视角来看,如图 6 所示,主成分分析无非就是在不同的坐标系中看同一组数据。数据朝不同方向投影会得到不同的投影结果,对应不同的分布;朝椭圆长轴方向投影,得到的数据标准差最大;朝椭圆短轴方向投影得到的数据标准差最小。 ν_1 对应的便是第一主成分 PC1。这里用到的几何工具就是旋转 (rotation)。

从椭圆的视角来看,图 6 中, v_1 第一主成分 PC1 方向就是椭圆长轴所在方向, v_2 第二主成分 PC2 方向就是椭圆短轴所在方向。显然, v_1 和 v_2 垂直! 我们管这个新的直角坐标系叫做 [v_1 , v_2]。原来数据的坐标系记做 [e_1 , e_2]。图 6 的坐标系旋转也完成了旋转椭圆到正椭圆的几何转换过程。图 7 所示为在 [v_1 , v_2] 中看数据投影。

大家可能要问,究竟采用怎样的数学工具才能计算得到 v_1 和 v_2 ?

这就需要我们首先计算协方差矩阵 Σ ,然后对协方差矩阵 Σ 进行特征值分解。特征向量就是我们要找的主成分方向。

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466

欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 6. 坐标系旋转




图 7. 换个坐标系看投影

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

成队归用于八字面版社所有,唱勿简用,引用谓注明面风。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

此外,除了特征值分解协方差矩阵,还有其他不同的主成分分析技术路线。鸢尾花书《数据有道》会专门比较不同技术路线的异同。

虽然,我们不会具体介绍计算协方差、特征值分解背后的数学工具,以及这两个工具和椭圆的联系;但是大家可能已经发现,想要深入理解主成分分析,离不开概率统计、线性代数、几何这些视角。这都是鸢尾花"数学三剑客"要介绍的内容。

在主成分分析中,主成分通常是原始特征的线性组合。也就是说,PCA是一种线性降维方法,它只能捕捉数据中的线性相关性。如果数据具有复杂的非线性关系,PCA可能无法很好地捕捉这些模式,从而导致信息丢失。

而核主成分分析 (Kernel Principal Component Analysis) 在高维特征空间中使用核技巧 (kernel trick) 来进行 PCA,从而能够处理非线性关系。核 PCA 可以解决传统 PCA 无法处理的非线性问题。在处理非线性数据时,传统 PCA 可能会损失数据的重要信息,因为它只能发现线性关系。核 PCA 通过将数据映射到高维特征空间,将数据从原始空间中的非线性关系转化为高维空间中的线性关系,因此可以有效地保留数据的非线性结构信息。

与传统的主成分分析不同,核 PCA 不直接使用原始数据来计算主成分,而是通过将数据映射到高维特征空间来获取主成分。核技巧的基本思想是通过核函数 (kernel function) 将数据映射到高维特征空间中,从而使得线性模型能够处理非线性数据。常用的核函数包括,径向基核函数 (radial basis function kernel, RBF kernel),也叫高斯核函数,多项式核 (polynomial kernel),Sigmoid 核 (Sigmoid kernel)。我们在本书第 32 章讲解支持向量机 (Support Vector Machine, SVM) 还会用到核技巧。本书不展开讲解核主成分分析。

下面,我们还是利用本书前文用过的利率数据,用几何视角 (投影、旋转) 和 Scikit-Learn 函数,和大家分别聊聊两特征、三特征主成分分析。

31.2 两特征 PCA

图 8 所示为标准化数据的散点图。在这幅图上,我们还用椭圆代表数据的分布;更准确地说,这些椭圆代表了数据的协方差矩阵。这些椭圆等高线实际上是马氏距离 (Mahalanobis distance)。与欧氏距离 (Euclidean distance) 不同,马氏距离考虑了数据之间的协方差结构,因此可以更准确地捕捉数据的相关性和分布情况。图 8 这些同心椭圆就是马氏距离的等距线。

图9展示了数据的主成分方向。容易发现, v1对应椭圆的长轴方向, v2对应椭圆的短轴方向。

图 10 所示为数据朝第一主成分方向 ν_1 投影的结果。根据前文介绍的内容,大家应该清楚朝 ν_1 投影的得到结果的方差最大。图 11 所示为数据朝第一主成分方向 ν_2 投影的结果,对应方差最小。

 $[v_1, v_2]$ 本身也是一个直角坐标系,在 $[v_1, v_2]$ 中看到的数据如图 12 所示。




图 8. 标准化数据的散点图




图 9. 主成分方向

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 成权归有平人字面版在所有,有勿向用,引用有压切面处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 10. 朝第一主成分方向投影




图 11. 朝第二主成分方向投影

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 成权归有平人字面版在所有,有勿向用,引用有压切面处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 12. [v1, v2] 中看数据散点

31.4 **三特征 PCA**

既然,我们可以用一个旋转椭圆代替二维散点图;这一节,我们则把三维散点抽象成一个椭球。

图 13 所示为在直角坐标系 $[e_1,e_2,e_3]$ 中看椭球。显然这是一个旋转椭球。红色箭头 v_1 、绿色箭头 v_2 、蓝色箭头 v_3 分别指向了椭球的三个主轴方向。这三个方向也就是主成分分析中三个主成分方向。

主成分分解得到的载荷矩阵 V 的每一个列依次对应红色箭头 ν_1 、绿色箭头 ν_2 、蓝色箭头 ν_3 。[ν_1 , ν_2 , ν_3] 也是一个三维直角坐标系。数据在 ν_1 上投影结果的方差最大,在 ν_2 上投影结果的方差次之,在 ν_3 上投影结果的方差最小。

图 14 所示为在平面直角坐标系 $[e_1, e_2]$ 中看椭球。也就是说,椭球在 $[e_1, e_2]$ 投影为旋转椭圆。图 14 这个椭圆就是图 8 中马氏距离为 1 的椭圆。

图 14 还展示了红色箭头 v_1 、绿色箭头 v_2 、蓝色箭头 v_3 在 $[e_1, e_2]$ 中的投影。

图 15 所示为在平面直角坐标系 $[e_1, e_3]$ 中看椭球。

图 16 所示为在平面直角坐标系 $[e_2, e_3]$ 中看椭球。

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com





图 13. $[e_1, e_2, e_3]$ 中看椭球



本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466

欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 15. [e1, e3] 中看椭球




图 16. [e2, e3] 中看椭球

由于 $[v_1, v_2, v_3]$ 也是一个三维直角坐标系,我们当然也可以在 $[v_1, v_2, v_3]$ 中观察椭球。如图 17 所示,在 $[v_1, v_2, v_3]$ 中,我们看的是正椭球。这幅图中,我们还看到了 $[e_1, e_2, e_3]$ 。图 18 所示为在 $[v_1, v_2]$ 中看椭球;而 e_1 、 e_2 、 e_3 在 $[v_1, v_2]$,即第一、第二主成分方向,中的投影也叫双标图 (biplot)。双标图可以用于可视化原始多维数据在主成分分析下的投影降维结果。

图 19 所示为在 $[v_1, v_3]$ 中看椭球。图 20 所示为在 $[v_2, v_3]$ 中看椭球。

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 17. [v1, v2, v3] 中看椭球




图 18. [v1, v2] 中看椭球

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

成队归用于八字面版社所有,唱勿简用,引用谓注明面风。 代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套徽课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466 欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com




图 19. [v1, v3] 中看椭球




图 20. [v2, v3] 中看椭球

本 PDF 文件为作者草稿,发布目的为方便读者在移动终端学习,终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。版权归清华大学出版社所有,请勿商用,引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: https://github.com/Visualize-ML 本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: https://space.bilibili.com/513194466

欢迎大家批评指教,本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com