玉米常见病虫害识别图谱

==========
真菌性病害
==========

1. 玉米大斑病
症状：叶片出现大型梭形或长梭形病斑，灰褐色，边缘颜色较深。病斑中央灰褐色，
外部暗褐色，周围有时有黄色晕圈。多个病斑可愈合成大斑块，后期枯死。
病原：大斑病凸脐蠕孢（Exserohilum turcicum）
防治：75%百菌清可湿性粉剂500-800倍液

2. 玉米小斑病
症状：叶片上出现小型椭圆形病斑，黄褐色，有同心轮纹，病斑周围有明显的黄色晕圈。
后期病斑可连成一片，叶片枯死。
病原：玉蜀黍平脐蠕孢（Bipolaris maydis）
防治：50%多菌灵可湿性粉剂500倍液，或70%甲基硫菌灵1000倍液

3. 玉米纹枯病
症状：茎基部出现云纹状褐色病斑，病斑中央灰褐色，边缘深褐色，界限清晰。
严重时病斑扩展到茎秆中部，导致茎秆变软倒伏。叶鞘上也有类似云纹状病斑。
病原：立枯丝核菌（Rhizoctonia solani）
防治：5%井冈霉素A水剂1500倍液喷雾茎基部

4. 玉米丝黑穗病
症状：系统侵染性病害，病株矮小，果穗被破坏成黑粉包状，内部充满黑色粉状孢子。
雄穗也可被侵染形成黑色粉状物，有时呈畸形分枝状。
病原：玉米丝黑穗菌（Sporisorium reilianum）
防治：25%多菌灵可湿性粉剂拌种（种子重量的0.3%）

==========
害虫
==========

5. 玉米螟
危害：以幼虫蛀入茎秆、叶鞘和果穗，造成排孔、风折、籽粒缺损。
在滦州市一年发生2-3代，第一代幼虫在6月下旬危害心叶，
第二代在8月危害果穗，第三代在9月蛀茎越冬。
防治：释放赤眼蜂（1万头/亩）；心叶末期喷Bt乳剂；秋季深翻灭茬

6. 玉米蚜虫
危害：多聚集在叶片背面、心叶和雄穗上刺吸汁液，造成叶片变黄卷曲。
分泌的蜜露诱发煤污病，影响光合作用。还能传播玉米粗缩病毒。
防治：10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液；黄板诱杀有翅蚜

7. 玉米粘虫
危害：迁飞性暴食害虫，大发生时可将叶片吃光，仅剩叶脉。

1-2龄幼虫群集取食叶肉，3龄后分散，4-5龄进入暴食期。
防治：糖醋液+性诱剂诱杀成虫；20%氰戊菊酯乳油2000倍液

==========
病毒病
==========

8. 玉米粗缩病
症状：病株严重矮化，节间缩短，叶片浓绿、宽厚，状如君子兰。
叶背沿脉产生白色蜡条。不能正常抽穗结实。
病原：玉米粗缩病毒（MRDV），由灰飞虱带毒传播
防治：调整播期避开灰飞虱传毒高峰；选用耐病品种；清除田边杂草