

Zone-I

हिमाचल प्रदेश HIMACHAL PRADESH

हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से एक पहाड़ी राज्य है, जहाँ पर अधिकतर क्षेत्र (लगभग 80 प्रतिशत) वर्षा पर निर्भर है। रबी मौसम के दौरान खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, दालों में चना व मसर और तिलहनी फसलों में सरसों प्रमुख फसलें हैं। सब्जियों में गोभी वर्गीय, मटर, प्याज और लहसुन प्रमुख फसलें हैं। खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी फसलों, सब्जी व फल उत्पादन तथा पशुपालन व्यवसाय से बेहतर लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह निम्नानुसार दी जाती है।

गेहूँ

- एच एस 542, एच पी डब्ल्यू 360 गेहूँ की किस्मों को राज्य के निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्र में अगेती बिजाई के लिए (20 अक्टूबर तक) अनुमोदित किया गया है जबकि इन क्षेत्रों में समय पर बिजाई (15 अक्टूबर- 15 नवंबर) के लिए एच पी डब्ल्यू 155, एच पी डब्ल्यू 349, एच पी डब्ल्यू 249, एच पी डब्ल्यू 236, वी एल 907, एच एस 507, एच पी डब्ल्यू 368 अनुमोदित किस्में हैं। निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में देर से बोई जाने वाली स्थिति (दिसंबर के अंत तक) में वी एल 892, एच पी डब्ल्यू 373 अनुमोदित किस्में हैं। ऊँचे पहाड़ी क्षेत्र में समय पर बिजाई की स्थिति (1-15 अक्टूबर) में एच पी डब्ल्यू 155 और एच पी डब्ल्यू 236 तथा ऊँचे बर्फ से ढके क्षेत्रों में सप्तधारा व हिम प्रथम (डी एच 114) अनुमोदित किस्में हैं।
- समय पर और देर से बिजाई की स्थिति के लिए क्रमशः 100 किग्रा और 150 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर की दर से 22 सेमी की दूरी की कतारों में बिजाई करें। बिजाई से पहले बैविस्टिन 2.5 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से से बीज का उपचार करें। एसएसपी (375 किग्रा), एमओपी (50 किग्रा) की पूरी मात्रा, 50 प्रतिशत यूरिया (130 किग्रा) के साथ सड़ी हुई गोबर की खाद बिजाई के समय डालें जबकि यूरिया की शेष आधी मात्रा मूसल जई निकलने पर या पहली बारिश होने पर प्रयोग करें।
- चूँकि, खरपतवार से गेहूँ की फसल को भारी आर्थिक नुकसान होता है और इन नुकसानों से बचने के लिए खरपतवारों में 2-3 पत्ती अवस्था पर खरपतवारनाशी वेस्टा 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर या क्लोडिनाफॉफ 400 ग्राम व क्लोडिनाफॉफ स्प्रे के 2-3 दिनों के बाद 2, 4-डी 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें।
- गेहूँ की फसल में पीला रतुआ और करनाल बंट प्रमुख रोग हैं जिनके प्रबन्धन के लिए रोग के लक्षण दिखने पर टिल्ट 1 मिली प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। दीमक इस फसल के सभी कीटों में प्रमुख कीट है। इसके प्रबन्धन के लिए बिजाई के समय 4 मिली क्लोरोपायरीफॉस 20 ईसी प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का उपचार करें साथ ही 2 लीटर क्लोरोपायरीफॉस 20 ईसी को 25 किलोग्राम रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बिजाई के समय खेत में मिलाएं।

चना

- हिमाचल चना -1, हिमाचल चना -2, जीपीएफ -2, पालम चना -1, एचपीजी 17 चने की अनुमोदित किस्में हैं। बिजाई पूर्व फफूंदनाशक (बैविस्टिन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज) और राइजोबियम और फॉस्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया जैसे जैव उर्वरकों से बीजों का उपचार करें। फसल की बिजाई के समय मिट्टी में उचित नमी का होना अनिवार्य है। मध्य अक्टूबर इसकी बिजाई के लिए सबसे अच्छा समय है। एचपीजी 17 को छोड़कर सभी किस्मों को 30 सेमी की दूरी की कतारों में बिजाई करें जबकि एचपीजी 17 को 50 सेमी की दूरी की कतारों में बिजाई करें। बीज को 10-12.5 सेमी की गहराई तक बिजाई करें। छोटे और मध्यम आकार बीज वाली चने की किस्मों हिमाचल चना -1, हिमाचल चना -2, जीपीएफ -2, पालम चना -1 के लिए बीज दर 40-45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि एचपीजी 17 बोल्ट बीज वाली किस्मों के लिए बीज दर 80 किग्रा प्रति हेक्टेयर अनुमोदित है।
- चने की खेती के लिए यूरिया 65 किग्रा, एसएसपी 375 किग्रा और 50 किग्रा एमओपी प्रति हेक्टेयर की सिफारिश की जाती है। एसएसपी, एमओपी की पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा बिजाई के समय और बाकी बची यूरिया की आधी मात्रा बिजाई के 4-5 सप्ताह बाद प्रयोग करें।

- चने में फली छेदक के प्रबंधन के लिए फसल पर 1250 ग्राम कार्बेरिल 50 डब्ल्यू पी प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें और एस्कोकाइट झुलसा रोग के प्रबंधन के लिए 1 ग्राम बैविस्टिन प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।

मसर

- विपाशा और मार्कडेय मसर की अनुशंसित किस्में हैं जिन्हें अक्टूबर के अंत से मध्य नवंबर के बीच 25-30 किग्रा प्रति हेक्टेयर की बीज दर के साथ बीजा जा सकता है। बिजाई के समय 22 किग्रा यूरिया और 250 किग्रा एसएसपी प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का प्रयोग करें।

भूरी सरसो और गोभी सरसो

- केबीएस 3, एचपीबीएस 1 भूरी सरसों और एचपीएन 3, ओएनके 1, जीएससी 7 गोभी सरसों की अनुमोदित किस्में हैं। इन फसलों की खेती के लिए अक्टूबर का पहला पखवाड़ा सबसे अच्छा समय है। इन फसलों के लिए 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है और बिजाई 30 सेमी कतार से कतार और 10 सेमी पौधे से पौधे की दूरी पर करें।
- भूरी सरसों में एसएसपी (250 किग्रा), एमओपी (65 किग्रा), जिप्सम (140 किग्रा) की पूरी मात्रा व 50 प्रतिशत यूरिया (65 किग्रा) बिजाई के समय डालें जबकि यूरिया की शेष खुराक फूल आने से पहले डालें। गोभी सरसों के लिए एसएसपी (375 किग्रा), एमओपी (65 किग्रा) की पूरी मात्रा और 50 प्रतिशत यूरिया (125 किग्रा) प्रति हेक्टेयर बिजाई के समय डालें और शेष यूरिया को दो भागों में पहला भाग बिजाई के 60 दिनों के बाद और दूसरा भाग 80-90 दिनों के बाद प्रयोग करें।
- खरपतवारों के प्रबंधन के लिए बिजाई के 40-70 दिनों के बीच दो बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन के लिए 1.5 किग्रा पेंडीमेथेलिन (स्टॉम्प 30 ईसी) प्रति हेक्टेयर का छिड़काव बिजाई के 48 घण्टे के भीतर या 1 किग्रा आइसोप्रोटुरॉन प्रति हेक्टेयर 700-800 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के 30-35 दिन बाद छिड़काव करें।
- एफिड इस फसल से जुड़ा प्रमुख कीट है, जिसे 1 मिली मिथाइल डेमेटॉन 25 ईसी या डाइमिथोएट 30 ईसी प्रति लीटर पानी के छिड़काव द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है।

सब्जियाँ

गोभी वर्गीय फसलें (फूलगोभी, गोभी और ब्रोकली)

- हिमाचल प्रदेश के निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में अगस्त-सितंबर में फूलगोभी की संकर किस्में (गिबाउंट, फुसियामा, कैस्पर आरजेड, स्वाति, श्वेता, बायो पर्ल व्हाइट) और जुलाई-अगस्त (मध्य समूह) और अक्टूबर-नवंबर (पहुजा-71 और आईएचएस-9803) और सितंबर में देर समूह वाली किस्मों की नर्सरी की बिजाई करें। प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों में अप्रैल-मई में देर समूह वाली किस्मों को क्यारियों या पॉली ट्रे या संरक्षित संरचना में नर्सरी की बिजाई करें।
- निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में बंद गोभी की संकर किस्मों (पूसा गोभी संकर 1, पूसा गोभी संकर -81, वरुण, पुष्कर) की नर्सरी की बिजाई अगस्त-सितंबर में क्यारियों या पॉली ट्रे या संरक्षित संरचना में नर्सरी की बिजाई करें और अक्टूबर-जनवरी तक रोपाई का कार्य पूरा करें।
- निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में ब्रोकली की सामान्य या संकर किस्मों (पालम समृद्धि, पालम हरीतिका, पालम कंचन, पालम वचित्र, केटीएस-1 और पंजाब ब्रोकली-1) की नर्सरी की बिजाई सितंबर से अक्टूबर तक पूरी करें।
- इन फसलों में एनपीके 120-180: 75-80: 60-75 किग्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। खेत की तैयारी के समय 200 - 250 किटल सड़ी गली गोबर की खाद, फास्फोरस की पूरी मात्रा, एक तिहाई नाइट्रोजन तथा पोटाशियम की आधी मात्रा डालें। नाइट्रोजन के शेष भाग को एक-एक महीने के अंतराल पर टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए, जबकि दूसरी टॉप ड्रेसिंग के दौरान नाइट्रोजन के साथ आधा पोटाशियम डालना चाहिए। फूलगोभी में ब्राउनिंग के प्रबंधन के लिए मिट्टी में बोरेक्स मिलाया जा सकता है।

- पहली हल्की सिंचाई पौध की रोपाई के तुरंत बाद देनी चाहिए और फसल की वृद्धि और फूल विकास के दौरान उचित नमी का नियमित रखरखाव आवश्यक है। जैसे ही गोभी का फूल परिपक्वता और सघनता प्राप्त कर लेता है, उसे तोड़ लेना चाहिए।
- ब्रोकली की कटाई सही समय पर यानी कलियों के खुलने से पहले कर लेना चाहिए।
- पौध का कमरतोड़ रोग इन फसलों में एक प्रमुख समस्या है। इसके नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 25 ग्राम + कार्बेन्डाजिम 10 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी का प्रयोग करें। बलैक रॉट रोग से बचाव के लिए बीज को 30 मिनट के लिए गर्म पानी (50 डिग्री से.) से उपचार करें साथ ही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन (1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी) के साथ बीज उपचार की सलाह दी जाती है। तेले और गोभी की तितली के प्रकोप में, मैलाथियान 1 मि.ली. प्रति लीटर का प्रयोग किया जा सकता है। कटुआ कीट के प्रबन्धन के लिए 1 मिली साइपरमेथिन प्रति लीटर पानी की दर से को शुरुआती चरण में छिड़काव करें।

मटर

- निचले और मध्य पहाड़ियों में मटर की अग्रेती किस्मों (अर्कल, पाम त्रिलोकी, जीएस-10, एस-10) की बिजाई सितंबर-अक्टूबर में और ऊँची पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च-जून में पूरी करें।
- हिमाचल के निचले और मध्य पहाड़ियों में मुख्य मौसम मटर की किस्मों जैसे पीबी-89, हिम पालम मटर-1, एपी-3, जीएस-10 की बिजाई अक्टूबर-नवंबर के अंत तक और ऊँची पहाड़ी क्षेत्रों में अक्टूबर-नवंबर तक पूरी करें।
- 20 -30 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 20-50 किलो नाइट्रोजन, 30-60 किलो फास्फोरस और 30-60 किलो पोटेशियम प्रति हेक्टेयर मिट्टी की उर्वरता की स्थिति के आधार पर बिजाई के समय प्रयोग करें।
- पहली निराई-गुड़ाई बिजाई के 2-3 सप्ताह बाद और दूसरी फूल आने के समय की जानी चाहिए ताकि अधिक उपज मिल सके। प्रारंभिक विकास चरणों में खरपतवारों के प्रबन्धन के लिए 3 लीटर एलाक्लोर या पेंडीमेथालिन प्रति हेक्टेयर बिजाई के 48 घण्टे के भीतर छिड़काव करें।
- उचित फली व अधिक उपज के लिए फूल आने से पहले, फूल आने के दौरान और फली बनने के समय सिंचाई आवश्यक है।
- फलियों की तुड़ाई या तो सुबह जल्दी या दोपहर में देर से करनी चाहिए। मध्याह्न में तुड़ाई नहीं करनी चाहिए जिससे गर्मी के कारण मटर की फली की गुणवत्ता खराब हो जाती है।
- मटर में चूर्णलासिता रोग एक गंभीर समस्या है जिसे केराथेन 0.5 मिली या वेटेबल सल्फर 2.0 ग्राम या हेक्साकोनाजोल 0.5 मिली प्रति लीटर पानी का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। लीफ माइनर और फली छेदक के नियन्त्रण के लिए 0.75 मिली लैम्बडा साइहलोथिन और 2 मिली मैलाथियान प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

प्याज और लहसुन

- निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में प्याज की किस्मों (पालम लोहित, नासिक रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड) की नर्सरी की बिजाई अक्टूबर-मध्य नवंबर में और दिसंबर-जनवरी में रोपाई पूरी करें।
- लहसुन की जीएचसी-1, एग्रीफाउंड पार्वती, लार्ज सेगमेंटेड और सोलन सिलेक्शन की बिजाई करें।
- गोबर की खाद 200-300 क्विंटल, नाइट्रोजन 60-150 किलो, फास्फोरस 35-150 किलो और पोटेशियम 25-120 किलो प्रति हेक्टेयर मिट्टी परीक्षण के आधार पर डालें। 50 प्रतिशत नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश की पूरी मात्रा रोपाई या बुवाई के समय डालें। शेष नाइट्रोजन का आधा भाग रोपाई के 5-6 सप्ताह बाद प्रयोग करें।
- बल्ब परिपक्व हो जाने पर ही कटाई मई के अंतिम सप्ताह में पूरी कर लेनी चाहिए जिससे उनकी भंडारण अवधि बढ़ जाती है।

जड़ और पत्तेदार सब्जियाँ

- जड़ वाली सब्जियों (मूली, गाजर और शलजम) की बिजाई अगस्त-सितंबर (निचली पहाड़ी), जुलाई-अक्टूबर (मध्य पहाड़ी) और मार्च-अगस्त (ऊँची पहाड़ी) में पूरी कर लेनी चाहिए।

- मूली (पूसा हिमानी, जापानी सफेद, सफेद आइकल और अर्ली मेन्यू व्हाइट), गाजर (नैनटेस, सोलन रचना) और शलजम (बैंगनी टॉप व्हाइट ग्लोब, गोल्डन बॉल, स्नो बॉल) की अनुशंसित किस्मों की बिजाई करें।
- गोबर की खाद 100 क्विंटल, नाइट्रोजन 50-90 किग्रा, फास्फोरस 50-80 किग्रा और पोटाश 40-80 किग्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। गोबर की खाद, फास्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बिजाई के समय और नाइट्रोजन की बाकी बची मात्रा को दो समान किशतों में एक महीने के अंतराल पर प्रयोग करें।
- पत्तेदार सब्जियों (पालक, बीट पत्ता, मेथी और धनिया) की बिजाई निचली पहाड़ी क्षेत्रों में अगस्त-नवंबर और फरवरी-मार्च, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में जुलाई-अक्टूबर और फरवरी-अप्रैल और ऊँचे पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च-जून में पूरी की जानी चाहिए।
- पालक (पूसा हरित, बनर्जी जैट), बीट लीफ (वर्जीनिया सेवॉय, लॉन्ग स्टैंडिंग), मेथी (आईसी-74, पालम सौम्या, कसूरी मेथी, पूसा कसूरी) और धनिया (महक और स्थानीय) की अनुमोदित किस्मों की बिजाई करें।

फलदार पौधे

सेब

- पौधों के तैलिये बनाएं और 10 वर्ष या इससे अधिक आयु के पौधों में सिफारिश की गई मात्रा में गोबर की खाद (100 कि.ग्रा प्रति पौधा) नाइट्रोजन (1.5 कि.ग्रा. यूरिया प्रति पौधा) फॉस्फोरस (सुपर फॉस्फेट 2 कि.ग्रा.प्रति पौधा) और पोटाश (1.2 कि.ग्रा प्रति पौधा) की दर से डालें। दिसम्बर और जनवरी के महीने में गोबर की खाद के साथ-साथ पोटाश और फॉस्फोरस की पूरी मात्रा का प्रयोग करें।
- नाइट्रोजन की कुल मात्रा का आधा भाग (750 ग्राम यूरिया प्रति पौधा) फूल आने से 2-3 सप्ताह पहले और बाकि का शेष आधा भाग (750 ग्राम यूरिया प्रति पौधा) इसके एक महीने बाद डालें।
- सेब के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा करें व उन्हें विघटित करने के लिए गड्डे में डालें या संक्रमित पत्तों के तेजी से अपघटन को सुनिश्चित करने के लिए बागीचे में नीचे गिरी हुई पत्तियों पर 5 प्रतिशत यूरिया (10 कि.ग्रा प्रति 200 लीटर पानी) का छिड़काव करें।
- सर्दियों (नवम्बर-दिसम्बर) में सफेद जड़ सडन से संक्रमित पौधों की जड़ों को खोलकर संक्रमित हिस्से को काट कर उस पर बोड़ो पेंट या चौबाटिया पेस्ट लगाएं।
- काट छांट के समय सभी मृत, रोगग्रस्त तथा कीड़ों से ग्रसित तथा आपस में उलझ रही शाखाओं को काटें तथा उन पर बोड़ो पेंट या चौबाटिया पेस्ट या कोई अन्य कवकनाशी आधारित पेंट लगाएं।
- तने-जड़ों के संंधि स्थान पर रोग ग्रसित छाल को चाकू से हटा लें व उस पर चौबाटिया पेस्ट बोर्डो पेंट या अन्य कॉपर आधारित कवकनाशी पेंट लगाएं।
- सर्दियों में कैंकर से ग्रसित भाग को स्वस्थ हिस्से तक खुर्चे, अच्छी तरह साफ करें व इस पर बोर्डो पेंट या चौबाटिया पेंट या चौबाटिया यू एच एफ पेंट (कॉपर कार्बोनेट + रेड लेड + सफेद अनैमल पेंट 1:1:15) या कारबेंडाजिम पेंट (कारबेंडाजिम सफेद अनैमल पेंट 1:1:100) लगाएं।
- जमीन से 2-3 फुट की ऊँचाई तक तने पर चूना, कॉपर सल्फेट एवं अलसी के तेल के मिश्रण (30 कि.ग्रा. चूना + 500 ग्राम नीला थोथा + 500 मि. ली. अलसी का तेल 100 लीटर पानी में) का लेप अक्टुबर से नवम्बर माह में लगाएं।
- सेंजोस स्केल की रोकथाम के लिए हरी कली अवस्था पर 2 प्रतिशत मिनरल आयल (20 मि. ली. प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।
- नवजात रेंगते हुए स्केल कीट को नष्ट करने के लिए मैलाथियॉन 50 ईसी (1 मि. ली. प्रति लीटर पानी) या आक्सी-डैमेटान मिथाईल 25 ई सी (1 मि. ली. प्रति लीटर पानी) का छिड़काव फल स्थापित होने के बाद करें।
- वूली एपल एफिड की रोकथाम के लिए अप्रैल और फिर अक्टुबर में फोरेट (25-30 ग्रा. थिमेट या फोरेट 10 जी) या कार्बोप्थूरॉन (70-80 ग्राम फयुराडॉन 3 जी) तने के चारों ओर 5 सें.मी. गहरी नाली बना कर डालें।

- जिन वृक्षों में फल लग जाए उन में फोरेट की जगह अक्टुबर- नवम्बर में क्लारपाइरिफॉस 20 ईसी (4 मि.ली. प्रति लीटर पानी) से तने के चारो ओर के हिस्से को सिंचित करें। पेड़ों पर इस कीट के नियंत्रण के लिए सितम्बर- अक्टुबर में क्लारपाइरिफॉस 25 ईसी (2 मि.ली. प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।
- तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए छेद को किसी लचीली तार से साफ करके उसमें पेट्रोल या डाइमिथोएट 30 ईसी (1 मि.ली. प्रति लीटर पानी) में रुई भिगोकर डालें तथा छेद को बाहर से चिकनी मिट्टी से बंद कर दें।
- जड़ छेदक कीट के नियन्त्रण के लिए पौधों के तौलिये में तने के चारों ओर के घेरे को 0.1 प्रतिशत क्लोरपाइरिफॉस (5 मि.ली. प्रति लीटर पानी) से नवम्बर-दिसम्बर में पूरी तरह सिंचित करें।
- सेब की परागण क्रिया के लिए 5-10 प्रतिशत फूल आने पर सेब के बागीचों में 3-4 मधुमक्खी के छत्ते प्रति हैक्टेयर रखने का प्रबंध करें।
- सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए सूक्ष्म-तत्वों के मिश्रण (2-5 ग्राम प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।
- स्कैब एवं चूर्णी फफूंद रोग के प्रबंधन के लिए डोडीन (1 ग्राम प्रति लीटर पानी) या फलूक्सापाईरोक्सेड+ डाइफिनकोनाजोल (30 मि. ली. प्रति 100 लीटर पानी) का हरी कली अवस्था में स्प्रे करें।

ओलावृष्टि के बाद की सिफारिशें

- ओलावृष्टि के 24 घंटो के अंदर कारबेन्डाजिम (100 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी) और मैन्कोजेब (100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी) का छिड़काव करें।
- ओलावृष्टि के 3-4 दिन के भीतर बोरिक एसिड (200 ग्राम) + जिंक सल्फेट (500 ग्राम) \$ चूना (250 ग्राम) प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- ओलावृष्टि के 10-12 दिन के बाद एग्रीमिन, मल्टीप्लेक्स या माइक्रोवित (सूक्ष्म तत्वीय मिश्रण) (400-600 ग्राम प्रति 200 लीटर प्रति) के छिड़काव करें।

गुठलीदार फल (प्लम, खुमानी, आलू, बादाम, चैरी)

- पौधों के तौलिए बनाएं तथा सात वर्ष या इससे अधिक आयु वाले पौधों में नाइट्रोजन (1 किलो यूरिया), फॉस्फोरस (सुपर फॉस्फेट 1.5 कि.ग्रा. प्रति पौधा) और पोटाश (म्यूरेट ऑफ पोटाश 1.2 कि.ग्रा. प्रति पौधा) की दर से डालें। दिसम्बर और जनवरी माह में गोबर की खाद के साथ-साथ पोटाश और फॉस्फोरस की पूरी मात्रा का प्रयोग करें।
- नाइट्रोजन की कुल मात्रा का आधा भाग (500 ग्राम यूरिया प्रति पौधा) फूल आने से 2-3 सप्ताह पहले और शेष आधा भाग एक महीने के उपरांत प्रयोग करें।
- फफूंद जनित पत्ता मुड़न रोग की रोकथाम के लिए पौधे की सुप्तावस्था (दिसम्बर-जनवरी) में कॉपरआक्सीक्लोराइड (3 ग्रा. प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें तथा गुलाबी कली अवस्था में कारबेन्डाजिम (1 ग्राम प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।
- तेला जनित पत्ता मुड़न के लिए गुलाबी कली अवस्था में मिथाएल डेमेटान या डाइमिथोएट (1 मि. ली. प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।
- गोंदिन रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त हिस्से को छीलकर उस पर मशोबरा पेस्ट लगाएं।

आम

- मिली बग के रेंगते हुए शिशुओं या व्यस्कों को रोकने हेतु पेड़ के तने के चारों ओर (जमीन के सतह से 0.5 मीटर ऊपर) चिपचिपा बैंड अथवा एलकाथीन शीट का प्रयोग करें। कीट के प्रवेश को बन्द करने हेतु इस शीट के चारों ओर चिकनी मिट्टी का लेप लगाएं।
- आम में गुच्छा या गुम्मा रोग के नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त शाखाओं या पत्तियों या फूलों को हटा दें और अक्टुबर माह में पोटाशियम मैटाबाइसल्फाइड (120 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी) का छिड़काव करें तथा इसे जनवरी माह में भी दोहराएं।

- चूर्णी फफूंद रोग के नियंत्रण के लिए फूल या बोर आने पर फल स्थापित होने पर और फल मटर के दाने के बराबर होने पर घुलनशील सल्फर (5 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी) या कैराथेन या कारबेन्डाजिम या हैक्साकोनाजोल (1 ग्राम प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।

नींबू वर्गीय फल

- नींबू वर्गीय फलों में कैंकर रोग की रोकथाम के लिए पौधे के ग्रसित भाग को काटकर नष्ट करें व प्रभावित पौधों पर कैपराक्सीक्लोराइड (3 ग्राम प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।

पशुपालन

- पशुओं को चिचड़ियों एवं अन्य बाह्य परजीवियों के प्रकोप से बचाने के लिए बाड़ों में साफ सफाई रखें तथा डैल्टामैथरिन (4 मि० ली० प्रति लीटर पानी) का स्प्रे करें।
- वाहय परजीवियों से ग्रसित पशुओं के उपचार हेतु डैल्टामैथरिन, अमिट्राज या फलूमैथरिन आदि दवाइयों का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से करें।
- विभिन्न संक्रामक रोगों जैसे खुर मुँह पका रोग, लंगड़ी बुखार, गलघोटू आदि से बचाव के लिए पशुओं का टीकाकरण करवाएं। यह टीके पशुपालन विभाग द्वारा मुफ्त लगाए जाते हैं।
- पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए दूध दोहन से पहले अपने हाथ एवं पशु के अयन को एंटीसेप्टिक घोल से अवश्य धो लें, साफ-सफाई का ध्यान रखें एवं पशुओं को विटामिन ई तथा सीलेनियम युक्त खनिज मिश्रण खिलाएं। थनों में चोट लगने पर चिकित्सक को दिखाएं तथा पूर्ण हाथ दोहन विधि अपनाएं।
- पशुओं को खनिज लवणों (50 ग्राम प्रति पशु प्रति दिन) का सेवन अवश्य करवाएं ताकि उनमें रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे एवं दूध उत्पादन भी बढ़े। खनिज मिश्रण नियमित रूप से देने पर पशुओं का प्रजनन चक्र भी सुचारु रूप से चलता है।
- बहुवर्षीय घासों जैसे नेपियर, सिटेरिया, गिन्नी घास आदि की रोपाई खाली पड़ी भूमि अथवा खेतों की मेढ़ों पर जुलाई-अगस्त अथवा फरवरी- मार्च में करें। यह घास तीन से चार कटार्यों में 400-500 क्विंटल पौष्टिक हरा चारा प्रति हेक्टेयर उपलब्ध करवाते हैं।
- अक्टूबर से दिसम्बर तथा अप्रैल से जून के बीच हरे चारे की भारी कमी रहती है। रबी और खरीफ में आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हरे चारे से साइलेज बनाएं। हरे चारे के अभाव में पशुओं को पौष्टिक साइलेज खिलायें तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करें।
- यूरिया शीरा खनिज पिंड एक उपयोगी पूरक आहार है जो पशुओं के पोषण तत्वों की पूर्ति के लिए एक सुविधाजनक और सस्ता तरीका है। इससे पशु को ऊर्जा, सूक्ष्म खनिज लवण तथा प्रोटीन उपलब्ध होती है। इसे पशु के सामने 10-15 मिनिट चाटने के लिए सुबह और शाम को दुहने के समय रखें।
- पशु आहार के विकल्प के तौर पर अजोला जो कि एक सदाबहार एवं पौष्टिक हरा चारा है, का प्रयोग करें। इस आहार में उच्च प्रोटीन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं तथा निम्न लिगनिन होने के कारण यह बहुत ही सुपाच्य है। इसके पशु आहार में प्रयोग करने पर खली की मात्रा को कम किया जा सकता है तथा दूध उत्पादन के व्यवसाय को लाभकारी बनाया जा सकता है।
- दुधारू पशुओं को संतुलित आहार देना अति आवश्यक है। पशुओं को एक किलोग्राम दाना मिश्रण प्रति तीन लीटर दूध उत्पादक की दर से और इसके इलावा शरीर के रखरखाव के लिए एक से डेढ़ किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन दें। दाना मिश्रण घर पर तैयार करने के लिए 40 प्रतिशत अनाज, 30 प्रतिशत खली (सरसों या बिनौला), 27 प्रतिशत चोकर, 2 प्रतिशत खनिज मिश्रण एवं 1 प्रतिशत नमक का प्रयोग करें।