

38 森林

カルパティア山脈のブナ林

アルバニア共和国／イタリア共和国／ウクライナ／オーストリア共和国／北マケドニア共和国／クロアチア共和国／スイス連邦／スペイン／スロバキア共和国／スロベニア共和国／チェコ共和国／ドイツ連邦共和国／フランス共和国／ブルガリア共和国／ベルギー王国／ポーランド共和国／ボスニア・ヘルツェゴヴィナ／ルーマニア



カルパティア山脈と他のヨーロッパ地域の ブナ原生林

Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe

登録年 2007年／2011年、2017年、2021年範囲拡大、2023年範囲変更
登録基準 (ix)



原始の姿を残すヨーロッパのブナ林

10種の原生ブナが茂るブナ林は、氷河期後期における陸上生態系の生物学的、生態学的な進化や、北半球の多彩な環境におけるブナの分化の過程がわかる貴重な遺産である。2007年にウクライナとスロバキアの遺産として登録され、2011年にはドイツが、2017年には他の9カ国にまで拡大された。さらに2021年に6カ国増え、計18カ国にまたがる世界遺産となっている。広大なブナ林には、IUCNのレッドリストにも記載されている**キンメフクロウ**も生息し、ブナ林が動物にとっても大切な環境であることがわかる。

この地のブナ原生林は、現存する**ヨーロッパブナ**(ファグス・シルヴァティカ)の原生林としては世界最大である。あらゆる樹齢や発達段階のブナが存在し、さらには世界最大で、樹高が最も高いブナの標本も含まれている。最終氷期が終了して以来、現在も続いている陸上生態系の進化の代表例であり、北半球のさまざまな環境の中におけるブナ林の拡大を理解する上で不可欠な地域となっている。かつてヨーロッパの40%を占めたヨーロッパブナ林は、世界の他地域と同様に減少しているものの、この地では広範囲で残り、北半球でのブナ林の変遷を伝える貴重な場所である。

ポルトガル共和国



マデイラ島の照葉樹林

Laurisilva of Madeira

自然遺産

登録年 1999年 登録基準 (ix)(x)



氷河期以前の太古の姿をとどめた森林地帯

リスボンの南西約1,000km、大西洋上にあるポルトガル領マデイラ島の照葉樹林は、約6,500万～170万年前という、**氷河期以前の太古の姿**を残した森林地帯である。

この森林はマデイラ島中央部、標高600～1,300mの山岳部にあり、島が形成された**第三紀**の植物分布を残した極めて貴重な地域である。約200km²に及ぶ自然保護区のうち、約150km²が世界遺産に指定されており、カタツムリをはじめとした500種以上の無脊椎動物や、66種の維管束植物など島固有の動植物が多数生息、生育している。



マデイラ島の森林地帯

ロシア連邦



シホテ・アリニ山脈中央部

Central Sikhote-Alin

自然遺産


登録年 2001年／2018年範囲拡大 登録基準 (x)



南方系の動物と北方系の動物が共存する山脈

日本海に面し、ロシアのプリモルスキー地方とハバロフスク地方にまたがるシホテ・アリニ山脈は、亜寒帯の針葉樹林であるタイガと、亜熱帯林が複雑に混生する巨大な森林地帯である。さらにこの地域は、トラやヒマラヤグマなど南方系の動物と、ヒグマやオオヤマネコなど北方系の動物がともに見られる貴重な場所でもある。

また、**アムールトラ**や、日本にも生息している**シマフクロウ**など、絶滅が心配されている希少動物が比較的多く生息していることも重要視されている。



アムールトラ



コルキスの多雨林群と湿地群

Colchic Rainforests and Wetlands

自然遺産

登録年 2021年/2023年範囲変更 登録基準 (ix)(x)

貴重な絶滅危惧種が生息する多雨林

温暖湿潤な黒海の東海岸沿いに延びる全長80kmのエリアには、非常に豊かな生物相を誇る多雨林や湿地帯などが広がる。コルキスの多雨林は、世界で最も古い温帯広葉樹林の1つで、固有種や氷河期を生き延びた遺存固有種が多く見られる。絶滅が危惧される44種の維管束植物を含めた約1,100種の植物や、**コルキスチョウザメ**など19種の絶滅危惧種の生育・生息地であり、多くの鳥類の重要な中継地でもある。



ポルト湾:ピアナのカランケ、ジロラッタ湾、スカンドラ保護区

Gulf of Porto, Calanche of Piana, Gulf of Girolata, Scandola Reserve

自然遺産

登録年 1983年 登録基準 (vii)(viii)(x)

フランスに属する地中海西部のコルシカ島にある、切り立った断崖の海岸線と2,000m級の山並が織りなす美しい景観を持つ自然保護区。コルシカ島は、フランスの文豪モーパッサンによって「海からそびえる山」と称された。ポルト湾周辺は高さ1,200mの赤い花こう岩の断崖が続き、島固有の常緑灌木^{かんびく}**マキ**に覆われた斜面が特徴のスカンドラ半島は、ロブスターやイカなどの海洋生物が豊富で、それを狙う鳥類たちの楽園である。



アルタイ・ゴールデン・マウンテン

Golden Mountains of Altai

自然遺産

登録年 1998年 登録基準 (x)

アルタイ*自然保護区とテレツコヤ湖周辺の緩衝地帯、カトゥン自然保護区とペルーカ山周辺の緩衝地帯、ウコック高原保護区の3つの地域が登録されており、総面積は1万6,115km²に及ぶ。シベリア中央部における高山植生をほぼ網羅しており、ステップ、森林ステップ、混交林、亜高山植生、高山植生といった多彩な植生を含む。**ユキヒョウ**など絶滅の危機に瀕する生物の重要な生息地。

アルタイ: タタール語で「黄金の山」を意味し、古くから金など豊富な鉱物資源が眠る場所として知られていた。



タラマンカ山脈地帯: ラ・アミスタ自然保護区群とラ・アミスタ国立公園

Talamanca Range-La Amistad Reserves / La Amistad National Park

自然遺産

登録年 1983年/1990年範囲拡大 登録基準 (vii)(viii)(ix)(x)

中央アメリカ最大の熱帯雨林

コスタリカとパナマの国境沿いに広がるタラマンカ山脈一帯に、両国をまたいで広がる自然保護地域。1983年にラ・アミスタ自然保護区群、1990年にパナマ側のラ・アミスタ国立公園が登録された。氷河湖のある標高3,820mの**チリボ山**がそびえ、高低差のある地形と気候が多様な生態系を生み出している。雲霧林、低地熱帯雨林などの8つの植生帯があり、ピューマ、ジャガーといった大型哺乳類など多くの動物が生息する。



ロス・アレルセス国立公園

Los Alerces National Park

自然遺産

登録年 2017年 登録基準 (vii)(x)

パタゴニア北部のアンデス山脈に位置する『ロス・アレルセス国立公園』は、氷河作用によって形成され、モレーンや圈谷*、透明湖といった風光明媚な景観が見られる。一帯は温帯林に覆われているが、岩だらけのアンデス山脈山頂近くでは高山草原が広がる。現地の言葉で「**アレルセ**」と呼ばれるパタゴニアヒバの森が特徴で、保全状態がよい。世界的に絶滅の危機にあるパタゴニアヒバは、世界で2番目に長い3,600年以上の樹齢を誇る。



ロス・カティオス国立公園

Los Katios National Park

自然遺産

登録年 1994年 登録基準 (ix)(x)

チョコ平原を南から北に流れるアトラト川流域に広がる熱帯雨林帯。100万年間の氷期で海面が上昇し多くの熱帯雨林が水没したが、この一帯は免れたことから太古の種が現存している。パナマの『ダリエン国立公園』に隣接し、**中米と南米の境界**にあたるため、互いの生態系が混在している。また、ジャングル地帯、丘陵、湿原などの多様な自然環境が形成されているため、動植物の種類は多岐にわたる。

圈谷: 氷河の侵食によってできた半碗状の地形。ドイツ語では「カール」という。

ホンジュラス共和国



自然遺産

リオ・プラタノ生物圏保存地域

Río Plátano Biosphere Reserve

登録年 1982年 / 2011年危機遺産登録 登録基準 (vii)(viii)(ix)(x)

ホンジュラス最大規模の熱帯雨林帯

ホンジュラス北東部のプラタノ川流域と、その河口付近に広がる密林地帯。流域はホンジュラス最大の熱帯雨林帯で、**コンゴウインコ**など約380種の鳥類の他、ジャガーやオオアリクイといった絶滅危惧種が生息。沿岸地帯にはマングローブが繁茂する湿地帯が広がる。保護域内にはマヤ遺跡の1つも残る。森林伐採や密猟などにより1996～2007年に一度危機遺産となり、2011年に再び危機遺産リストに記載された。



ペルー共和国



複合遺産

リオ・アビセオ国立公園

Rio Abiseo National Park

登録年 1990年 / 1992年範囲拡大 登録基準 (iii)(vii)(ix)(x)

ペルー北部、アマゾン川上流のマラニョン川とワジャガ川に挟まれた熱帯雨林地帯。一帯は間氷期の解氷による水没から免れ、多くの古代種が生き残った。園内には、約2万個の小さな花をつけるパイナップル科の植物プヤや、黄色の尾を持つ**ヘンディーウーリーモンキー**など、貴重な動植物も多い。標高2,500～4,000mのアンデス山脈の急斜面には、約8,000年前に築かれたチャチャボヤス文化*のグラン・パハテン遺跡などが確認された。

ブラジル連邦共和国



自然遺産

サウス・イースト大西洋沿岸森林保護区群

Atlantic Forest South-East Reserves

登録年 1999年 登録基準 (vii)(ix)(x)

ブラジル南東部の**大西洋沿岸森林**のうち、25の保護区域からなる広大な森林保護区。氷河期以来、他の地域から隔絶されたことで、豊かな自然環境が形成された。ウーリークモザルなどの絶滅危惧種をはじめとする120種の哺乳類、1,000万種を超える昆虫、5万種以上の植物などが生息・生育する。現在、保護区の総面積はおよそ4,700km²に及ぶが、土地開発が始まった16世紀以前に比べ、森林全体の面積は10分の1以下に減少している。

チャチャボヤス文化：7～15世紀にペルー北部のアマゾンで栄えた人々の文化で、「雲の上の人々」という意味がある。

アメリカ合衆国



自然遺産

レッドウッド国立・州立公園群

Redwood National and State Parks

登録年 1980年 登録基準 (vii)(ix)

希少な古木が群生する公園

カリフォルニア州北西部にある『レッドウッド国立・州立公園』は、現在ではアメリカ太平洋岸の一部にしか自生していないレッドウッドの大木が生い茂る公園である。レッドウッドはスギ科の常緑樹**セコイア**の別名。樹脂が赤みを帯びていることからその名がつけられた。平均樹齢は500年以上、平均樹高は100mに迫り、最も高いものは約110mを超える。園内にはシカの一種ワピチなどが生息しており、海岸部ではトドを見ることができる。



アメリカ合衆国



自然遺産

グレート・スモーキー山脈国立公園

Great Smoky Mountains National Park

登録年 1983年 登録基準 (vii)(viii)(ix)(x)

アメリカ東部にある、東京都とほぼ同じ面積を誇る広大な公園。園内の約3分の1を占める森林は、土地の高低差が激しいため多様な植物分布が見られ、高地にはマツやトウヒなど約130種の針葉樹が、低地にはナラ、ブナなどの落葉樹が生育している。また、この森林はアメリカグマやアカギツネ、有袋類のキタオポッサムなどの哺乳類が多種生息しており、減少傾向にあった**カナダカワウソ**は再移入され、アメリカビーバーなども順調に増えている。

ギニア共和国及びコートジボワール共和国



自然遺産

ニンバ山厳正自然保護区

Mount Nimba Strict Nature Reserve

登録年 1981年 / 1982年範囲拡大、1992年危機遺産登録 登録基準 (ix)(x)

ギニア南東部、標高1,752mのニンバ山を中心とした、面積およそ350km²の保護区。一帯は、サハラから吹く熱風や**ハルマッタン**と呼ばれる砂嵐、大西洋からの湿った季節風の影響で、1年を通して高温多湿である。ふもとの熱帯雨林には2,000種以上の植物が茂る。また、動物は500種以上が生息し、うち固有種は200種に上る。中でも、胎内で卵を孵化させるニシコモチヒキガエルや、一般的なカバの半分の大きさのコビトカバが有名。



ジャー動物保護区

Dja Faunal Reserve

自然遺産

登録年 1987年 登録基準 (ix)(x)

自然が自然を守る動物たちの楽園

カメルーン南部にあるアフリカ有数の熱帯雨林保護区。三方をジャー川に囲まれて人間社会と隔絶されているため、全体の9割を占める熱帯雨林がそのまま保たれてきた。保護区一帯には、ランやシダなど原始的な植物が生育。絶滅危惧種の**ニシローランドゴリラ**や、世界最小のサル的一种であるコビトグエノン、チンパンジーなどの霊長類の他107種の哺乳類が生息する。保護区内では、バカ(ピグミー)族が共同体を形成している。



カディーシャ渓谷(聖なる谷)と神の杉の森(ホルシュ・アルツ・エルラブ)

Quadi Qadisha (the Holy Valley) and the Forest of the Cedars of God (Horsh Arz el-Rab)

文化遺産

登録年 1998年 登録基準 (iii)(iv)

レバノン北部、レバノン山脈のカディーシャ渓谷は、耐久性に優れ、古くから建材や船材として用いられた**レバノン杉**の数少ない群生地である。古代にこの地域を支配していたフェニキア人はこの木でガレー船をつくり、全地中海を支配した。彼らに富をもたらした国旗にも描かれるレバノン杉は、現在ではレバノン国内全体で1,200本ほどしか残っていない。また、ネストリウス派*やマロン派などの教会も残る。



湖北の神農架

Hubei Shennongjia

自然遺産

登録年 2016年/2021年範囲変更 登録基準 (ix)(x)

中国の中部に位置する湖北省の**神農架**は、西の**神農頂**／**巴東**と、東の**老君山**の2つからなる約733km²の自然遺産。中国中部に現存する最大の原生林の保護区であり、キンシコウ(ゴールデンモンキー)の他、ウンピョウやヒョウ、ツキノワグマ、世界最大の両生類である**チュウゴクオオサンショウウオ**など多くの動物が生息している。また、19～20世紀には植物採集の名所として国際的に知られ、植物学の歴史においても重要な役割を果たしている。

ネストリウス派: 431年のエフェソス公会議で異端とされた古代キリスト教の一派。景教とも。



オーストラリアの Gondwana 雨林

Gondwana Rainforests of Australia

自然遺産

登録年 1986年/1994年範囲拡大 登録基準 (viii)(ix)(x)

ナンキョクブナなど太古の森林が残る多雨林群

オーストラリア中東部のクイーンズランド州とニューサウスウェールズ州の一部に広がり、多くの保護区からなる多雨林地帯。総面積は約3,700km²にも及び、コアラやカンガルー、パルマヤブワラビーなどの希少動物が生息する他、**ナンキョクブナ***などの太古の森林が残る。以前は入植者による森林伐採が行われており、保護のため世界遺産に登録された頃には、森林面積の約4分の3が失われていた。1994年には登録範囲が拡大された。



クイーンズランドの湿潤熱帯地域

Wet Tropics of Queensland

自然遺産

登録年 1988年 登録基準 (vii)(viii)(ix)(x)

オーストラリアの北東部、グレート・ディヴァイディング山脈に沿って広がるクイーンズランドの湿潤熱帯地域は、貿易風の影響によって年間雨量1,200～9,000mmに上る多量の雨が降り注ぐ熱帯雨林。この湿潤熱帯地域には800種以上の樹木が生育し、1億2,000万年前のシダ植物から裸子植物、被子植物へと進化した過程が見られる。また、最も原始的な有袋類といわれる**ニオイネズミカンガルー**をはじめ、さまざまな動物が生息する。



スリランカ中央高地

Central Highlands of Sri Lanka

自然遺産

登録年 2010年 登録基準 (ix)(x)

スリランカ島の中央部、海拔2,500mに広がる『スリランカ中央高地』は、**ホートン・プレインズ国立公園**、ナックルズ森林保護区、ピーク・ウィルダネス保護区の3つから構成される山岳森林帯である。太古の自然環境がそのまま残ったような山地雨林は、世界的にも珍しく、霊長類の**ニシカオムラサキラングール**をはじめ、ホートンプレインズホソロリス、スリランカヒョウなどの絶滅危惧種や固有種が暮らす。

ナンキョクブナ: Gondwana大陸の被子植物を代表するもの。温帯から熱帯に生息する。

39 固有の生態系と絶滅危惧種

野生絶滅したヨーロッパバイソン

ロシア連邦



西カフカス山脈

Western Caucasus

自然遺産

登録年 1999年 登録基準 (ix)(x)



「野生動物の楽園」と呼ばれる山脈

『西カフカス山脈』はコーカサス山脈の西端、黒海の50kmほど北東に位置する、約3,000km²にわたり人の手の入らない原生林が広がる山岳地域である。『コミの原生林*』とともに、ヨーロッパで唯一、**人為的な影響を受けていない大規模な山岳地帯**であり、ヨーロッパでも類を見ない手付かずの山林が広がっている。

原生林以外にも、氷河地形や、多くの洞窟をもつラゴナキ山塊といったカルスト台地が広がる他、先カンブリア時代から古生代までの堆積岩や変成岩、火成岩が見られ、地質学的にも貴重な地域である。

また、生態系、種の多様性においても際立っている。植物の多様性の中心的な場所として、世界的に重要な地位を占めている。約1,600種もの多様な植物を育み、高山帯だけで約1,000種の植物が生育。植物の3種に1種が固有種となっている。動物相も豊かで、2,500種の昆虫、246種の鳥類、60種の哺乳類などが確認されている。一帯は、すでに野生絶滅した**ヨーロッパバイソン**の亜種の起源とされる場所である。1940年以降、飼育された個体を自然の生息地に戻し、定着させる再導入の取り組みが行われてきた。

コミの原生林：ロシア連邦のコミ共和国、ウラル山脈北部に位置する世界遺産。p.353参照。

マレーシア



キナバル自然公園

Kinabalu Park


自然遺産

登録年 2000年 登録基準 (ix)(x)



高山地帯が育む動植物環境

ボルネオ島北部にあるキナバル公園は、標高約4,100mの**キナバル山**がそびえる自然公園。**フタバガキ**が優占する低地熱帯雨林から丘陵地熱帯雨林、熱帯山地林など、高度差によってさまざまな環境が広がり、6つの植物帯を含む。5,000種を超える維管束植物が生育し、固有種も含めおよそ1,000種のランが確認されている他、食虫植物ウツボカズラ属、世界最大の花ラフレシアなどを見ることができる。また、絶滅の危機に瀕している哺乳類や鳥類、両生類なども多く生息している。



キナバル山

エクアドル共和国



サンガイ国立公園

Sangay National Park

自然遺産

登録年 1983年 登録基準 (vii)(viii)(ix)(x)



変化に富む自然がもたらす多様な生物相

エクアドル中央部、アンデス山脈の東側からアマゾン川上流域の熱帯雨林にわたって広がる、総面積約2,700km²の公園である。標高約800m地点から、5,000mを超えるサンガイ山の山頂まで、標高差は4,000m以上に及び、園内には熱帯雨林や雲霧林、高山ツンドラなど、多様な**植物の垂直分布**が見られる。動物の分布も多様で40種以上のオウムや、絶滅危惧種のヤマバク、南米唯一のクマである**メガネグマ**、白い襟のような羽毛が特徴的なアンデスコンドルなど、希少な動物も生息している。



活発な火山活動を行う成層火山のトゥングラフ山



マヌー国立公園

Manú National Park

自然遺産

登録年 1987年/2009年範囲変更 登録基準 (ix)(x)



膨大な種類の動物が生息する自然の楽園

マヌー川流域に広がる熱帯雨林帯、湿原地帯、高原、山岳地帯などを含む、総面積約1万6,000km²に及ぶ**ペルー最大の国立公園**。地球に生息する鳥類の約10%にあたる約850種の鳥類をはじめ、甲殻類やクモ、ムカデなど約50万種の節足動物、カピバラやオセロットなど、約100種の哺乳類が生息。1億年前に**アマゾン川流域がギアナ高地とブラジル中央高原に挟まれた内海であった痕跡**をとどめる。また、絶滅危惧種の生息を維持するため、総面積の90%が学術研究区域とされ、一般人の立ち入りが禁じられている。



多彩な鳥類が見られるマヌー国立公園



マナス野生動物保護区

Manas Wildlife Sanctuary

自然遺産

登録年 1985年 登録基準 (vii)(ix)(x)



野生の姿が残された動物たちの聖地

インド北東部にある湿潤な草原と広葉樹林、サバンナ草原、半常緑樹林などからなる、南アジアでも特に多くの種類の動物が生息する地域。確認されているだけで60種以上の哺乳類、約500種の鳥類などが生息している。特に哺乳類は絶滅危惧種も多く、絶滅したと思われていた世界最小のイノシシである**コビトイノシシ**や、数年前に発見された美しい毛を持つ**ゴールデンラングール**などの希少動物は特筆に値する。また、純粋な野生のスィグユウの個体群も見ることができる。1989年から独立を求める少数民族とインド政府の戦闘が始まり、その影響で動物が殺されるなどの被害を受け、1992～2011年まで危機遺産リストに記載されていた。



ゴールデンラングール



イヴィンド国立公園

Ivindo National Park

自然遺産

登録年 2021年 登録基準 (ix)(x)

赤道直下に位置するほぼ手つかずの自然

ガボン北部の赤道直下、ギニア低地の熱帯雨林地帯に位置するイヴィンド国立公園には、約3,000km²にわたって手つかずの自然が広がる。園内にはイヴィンド川やコンゴウ滝などが流れており、13種の絶滅危惧種を含む固有種の淡水魚が多数生息しているが、未だ分類されていない種もある。また、**マルミミゾウ**や**ニシローランドゴリラ**、**ズアカハゲチメドリ**などの絶滅が危惧される哺乳類や鳥類の希少な生息地でもある。



雲南保護地域の三江併流群

Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas

自然遺産

登録年 2003年/2010年範囲変更 登録基準 (vii)(viii)(ix)(x)

中国南西部、『雲南保護地域の三江併流群』は、1万7,000km²の山岳地帯に金沙江、瀾滄江、怒江の**3つの川が並行して流れる**地域である。およそ5,000万年前に、ユーラシア大陸とインド亜大陸が衝突して生まれた地形が見られるこの一帯は、地質学的にも極めて重要な価値がある。この地域は中国で最も多様な生態系を有しており、中国全土の25%にも及ぶ700種以上の動物が生息。また、植物も20%にあたる約6,000種が自生している。



シャーク湾

Shark Bay, Western Australia

自然遺産

登録年 1991年 登録基準 (vii)(viii)(ix)(x)

『シャーク湾』は、世界最大の海草藻場や絶滅危惧種のジュゴンの最大の生息地として知られる。ハメルン・プールに群生する**ストロマトライト***は、19億年前に光合成を開始し、現在の地球の大気をつくり出した原核生物の子孫と考えられており、今現在も成長しながら群生する。海草藻場は4,800km²と世界最大であり、ミサゴなど230種の鳥類、マンタなど323種の魚類が生息している。

ストロマトライト：藍藻類など微生物の集合体で、日中に光合成、夜間に海中の砂などを取り込んで固定することを繰り返しドーム型に成長したもの。



カリフォルニア湾の島々と自然保護区群

Islands and Protected Areas of the Gulf of California

自然遺産

登録年 2005年/2007年、2011年範囲変更/2019年危機遺産登録
登録基準 (vii)(ix)(x)

豊かな海が築いた「自然の水族館」

メキシコ北西部の『カリフォルニア湾の島々と自然保護区群』は、244の島々や周辺の海域で構成され、内陸部のソノラ砂漠*も含まれる。固有種90種を含む891種の魚類、世界中に存在する約4割の海生哺乳類が生息する。

狭小の地域には大陸島と海洋島が同時に存在する。大陸島はかつて陸続きだった島のことで、淡水性の動物が分布しやすいという特徴がある。一方、海洋島は火山活動によって生じた島で、鳥類や海水性の動物が分布しやすい。2つの異なる環境が成立していることで、メキシコで最も海洋生物の多様性に富んだ場所となっている。



バランドラ・ビーチ



ウランゲリ島保護区の自然生態系

Natural System of Wrangel Island Reserve

自然遺産

登録年 2004年 登録基準 (ix)(x)

独自の変化を遂げた生態系で知られる孤島

ロシアの最北東端、東シベリア海のウランゲリ島保護区は、北極圏にありながら氷河期にも凍結しなかったため、独自の生態系が育まれた島である。保護区はウランゲリ島とヘラルド島、その周辺海域。島の植物の多くはユーラシア大陸、アメリカ大陸の亜種だが、23の固有種も確認されている。小さな島の周辺にはタイヘイヨウセイウチ、ホッキョクグマが世界一の密度で生息。また、メキシコの『エル・ビスカイノ鯨保護区』からやってくるコクジラの主要な餌場となっている。また、アジア及び北アメリカの渡り鳥をはじめ、さまざまな動物の繁殖地でもある。



ホッキョクグマ



コイバ国立公園と特別海洋保護区


Coiba National Park and its Special Zone of Marine Protection

自然遺産

登録年 2005年 登録基準 (ix)(x)

独特の生態系を育む熱帯の諸島

パナマ西部のチリキ湾にあるコイバ島と、38の小島及びその周辺海域を保護する海洋保護区で、東部熱帯太平洋海洋回廊*の一部を成す。登録面積は2,700km²以上もある。コイバ島の海洋性熱帯雨林は、エルニーニョ現象の影響が及ばない湾内に位置しているため、独自の生態系が形成された。パナマの他の地域では姿を消したヒメオウギワシやコンゴウインコなどの希少種も生息している。



アレハンドロ・デ・フンボルト国立公園

Alejandro de Humboldt National Park

自然遺産

登録年 2001年 登録基準 (ix)(x)

キューバ南東部の山岳地帯に位置する国立公園。近代地理学の祖といわれ、中南米の自然を調査したドイツの学者アレクサンダー・フォン・フンボルトを記念して命名された。複雑な地形とさまざまな土壌に加え、氷河期には一帯に生息する生物の避難所となったことから、独特の生態系が形成された。他のカリブ諸地域には見られない固有の植物が多数生育し、約1,300種の種子植物のうち、約70%が固有種。動物の種類も多彩である。



マルペロ動植物保護区

Malpelo Fauna and Flora Sanctuary

自然遺産

登録年 2006年 登録基準 (vii)(ix)

コロンビア沖の『マルペロ動植物保護区』は、東太平洋の熱帯地域において最大の禁漁区で、絶滅危惧種を含む海洋生物の重要な生息域である。複数の海流の影響と、マルペロ海底山脈の変化に富んだ地形によって複雑な生態系が形成され、魚類や甲殻類など多種多様な生物が生息している。深水域は大型捕食魚や遠洋性硬骨魚に適した環境であり、シュモクザメやジンベエザメなどが生息。珍しい深海ザメのメガマウスも目撃されている。

東部熱帯太平洋海洋回廊：コスタリカ、パナマ、コロンビア、エクアドルの海洋保護区のネットワークで、総面積は200万km²。海洋生物を違法漁業などから保護するため、2021年に設定された。

ソノラ砂漠：面積は31万1,000km²で、日本の本州がすっぽり入る大きさ。世界最大のサボテンであるオオハシラサボテンが林立している。



40 密猟

ケニアで飼育されている最後のキタシロサイ

コンゴ民主共和国



ガランバ国立公園

Garamba National Park

自然遺産

登録年 1980年/1996年危機遺産登録 登録基準 (vii)(x)

危機遺産



キタシロサイの生息地だった広大なサバンナと森林

『ガランバ国立公園』は、コンゴ民主共和国と南スーダンとの国境付近に位置し、コンゴ盆地の熱帯林とスーダン・ギニアサバンナの移行地帯にある。広大なサバンナと森林地帯に、川岸や湿地帯に沿って河畔林*が点在しており、**大型哺乳動物の生息に適した環境**となっている。絶滅の危機に瀕するマルミミゾウとアフリカゾウのどちらも観察することができ、さらにそのハイブリッドも生息している。森林地帯ではボンゴやモリイノシシ、チンパンジーを含む数種の霊長類が見られ、サバンナにはライオンやアンテロープ類が暮らす。

かつて一帯には**キタシロサイ**が1,000頭以上生息していたが、その角は漢方薬として高額で取引されるため、密猟が後を絶たず15頭にまで激減。1984年には危機遺産に登録された。一時は密猟者の排除に成功し、1992年に危機遺産リストから脱するも、1996年に2頭が殺されて再び危機遺産となった。2008年以降、園内ではその姿が確認されず、野生のキタシロサイは絶滅*したとされる。また、キリンの亜種である**コルドファンキリン**も生息数を激減させている。キリンの尾を狙った密猟の対象となっているため、2020年時点で40頭ほどしか生存していないと考えられている。

河畔林：河川や湿地帯に沿って形成される森林。野生のキタシロサイは絶滅：2023年12月現在、キタシロサイはケニアのオル・ベジェタ自然保護区で保護されている雌2頭しか生存していないとされる。

タンザニア連合共和国



セルー動物保護区

Selous Game Reserve

自然遺産

登録年 1982年/2012年範囲変更、2014年危機遺産登録 登録基準 (ix)(x)

密猟と戦うアフリカ最大の動物保護区

タンザニア南東部、ルフィジ川の両岸に広がるアフリカ最大級の動物保護区。保護区の大部分を西部の森林が占め、東部にはサバンナが広がる。2,000種以上の植物が自生し、雨季にはクロサイやチーター、カバなど75万頭以上の動物が集まる。世界遺産登録時には**世界最大規模のアフリカゾウの生息地であった**が、象牙目的の密猟が横行しているため危機遺産に登録された。



ウガンダ共和国



ブウィンディ原生国立公園

Bwindi Impenetrable National Park

自然遺産

登録年 1994年 登録基準 (vii)(x)

ウガンダ南西部の『ブウィンディ原生国立公園』は、世界有数の**マウンテンゴリラ**の生息地である。この地のマウンテンゴリラは、内戦や密猟で一時は約100頭まで減ったが、1986年に保護区に指定されて以降、全世界の半数にあたる約300頭にまで回復した。その他、アフリカゾウ、チンパンジー、オナガザルなど、絶滅の危機に瀕しているものを含む120種の哺乳類が生息し、200種のチョウ、300種以上の鳥なども見られる。

エチオピア連邦民主共和国



シミエン国立公園

Simien National Park

自然遺産

登録年 1978年 登録基準 (vii)(x)

標高4,620mのアフリカ第4の山、ラスダシャン山がそびえる山岳地帯の公園。険しい地形が広がる一帯は、一日の寒暖差が激しく、限られた動植物しか生息できない。かつてアフリカ大陸がヨーロッパ大陸と地続きだったことの証明となるワリアアイベックスや、ここでしか見られない**ゲラダヒヒ***などが観察できる。密猟や新道路の建設計画などにより1996～2017年まで危機遺産リストに記載されていた。

ゲラダヒヒ：ライオンのようなたてがみが特徴の霊長類。現地ではキリストの使いとして珍重されている。



ニョコロ・コバ国立公園

Niokolo-Koba National Park

自然遺産

登録年 1981年 / 2007年危機遺産登録 登録基準 (x)

2つの環境を持つ自然豊かな公園

セネガル南東部、『ニョコロ・コバ国立公園』は、総面積9,130km²の自然公園。乾燥地帯の**スーダン・サバンナ**と湿地帯であるギニア森林の移行地帯にあって2つの植生を持ち、1,500種の植物が生育する。動物相も豊かで、哺乳類80種その他、鳥類330種、魚類60種などが生息。1970年代に狩猟と農業が禁止されたが、アフリカゾウやキリンなどの密猟が絶えず、2007年以降危機遺産となっている。



コモエ国立公園

Comoé National Park

自然遺産

登録年 1983年 / 2023年範囲変更 登録基準 (ix)(x)

約11,500km²の広さを持つ**西アフリカ最大の国立公園**。230km以上のコモエ川の流れてによって多様な動植物が生息する。植民地時代から一帯には象牙を狙う密猟者が多く、かつては1,500頭も見られたアフリカゾウが200頭程にまで減少した。2003年に危機遺産に登録されたが政府による密猟対策が功を奏し、ゾウやチンパンジーなどの動物種の個体数が回復しつつある。2017年には、動物の生息環境は非常に良好であるとして危機遺産リストから脱した。



サロンガ国立公園

Salonga National Park

自然遺産

登録年 1984年 登録基準 (vii)(ix)

コンゴ民主共和国中央のコンゴ盆地に広がる、広大な熱帯多雨林保護区。コンゴ川の支流が複雑に流れ込んで隔絶された密林には、オカピやミズジャコウネコなど、絶滅危惧種を含む野生動物が生息する。しかし密猟や森林伐採などによって生態系の維持が危ぶまれ、1999～2021年まで危機遺産リストに記載された。同国固有種の**ボノボ**(ピグミーチンパンジー)は約2万頭が生息すると推定されるが、近年は食用目的の密猟も増加し数を減らしている。



W-アルリ-ペンジャーリ国立公園群

W-Arly-Pendjari Complex

自然遺産

登録年 1996年 / 2017年範囲拡大 登録基準 (ix)(x)

アフリカで最も暑い自然保護区

サバンナ草原地帯と森林地帯の境界域に位置する、アフリカでも最も暑い地帯の1つ。1996年の世界遺産登録当初はニジェールのW国立公園のみであったが、その後ベナンのアルリ国立公園と、ブルキナファソのペンジャーリ国立公園などを含めて拡大された。サバンナ、灌木地帯、熱帯雨林と多彩な自然環境には、**セーブルアンテロープ**などの貴重な野生生物が生息する。また、西アフリカ最大のゾウの生息域でもある。



チトワン国立公園

Chitwan National Park

自然遺産

登録年 1984年 登録基準 (vii)(ix)(x)

インドとの国境地帯のタライ平原にある、ジャングルと草原が広がる自然保護区。不法な移住、森林伐採、動物の乱獲が行われたことに加え、**マラリア撲滅のために1950年代から大量の農薬が撒かれた**結果、自然破壊が進み森林や野生動物が激減。1973年、自然破壊を止めるためネパール初の国立公園に指定され、軍隊による密猟者の取り締まりが行われるなど、ベンガルトラやインドサイなどの保護が徹底された。



カジランガ国立公園

Kaziranga National Park

自然遺産

登録年 1985年 登録基準 (ix)(x)

インド北東部に位置する、**インドサイ**の最大の保護区。定期的な川の氾濫で形成される小湖沼が点在し、インドサイの絶好の生息地となっている。漢方薬の材料となる角を狙い、密猟によって数を減らしていたインドサイを保護するため、1974年に国立公園に指定された。現在では、地球上で2,000頭しかいないとされるインドサイのうち、約1,200頭が生息する。スイギュウやガンジスカワイルカなど絶滅の危機に瀕する哺乳類も見られる。

41 環境問題



ヘンダーソン島

英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)



ヘンダーソン島

Henderson Island

自然遺産

登録年 1988年 登録基準 (vii)(x)



世界のプラスチックごみが漂着する島

南太平洋のポリネシア東端に浮かぶイギリス領ピトケアン諸島に属する『ヘンダーソン島』は、独自の生態系が残る、面積37km²に及ぶ環状サンゴ礁の無人島である。1606年、スペイン人航海士**デ・キロス**がヨーロッパ人として初めて上陸したが、**18世紀以降は無人島となったため、島の自然は原始のままの状態**で保存された。陸上に哺乳動物が存在しないため、多くの固有種が確認されている。被子植物では記録された51種中10種が固有種で、確認された陸鳥4種*もすべて固有種である。

近年では世界各地の**プラスチックごみ**が大量に漂着することが問題となっている。オーストラリアの海洋生物学者のジェニファー・レイバースらによる研究によると、ヘンダーソン島に漂着したプラスチックごみの数は3770万個におよび、世界で最もプラスチックごみが高密度に集積されている地域だという。プラスチックごみの中には日本で捨てられて流れ着いたと思われるものも見られる。プラスチックごみに絡まり怪我をしたり、誤って食べて命を落とす生物もいる。生態系に与える影響も懸念されている。年間800万tものプラスチックごみが海へ流出していると推定されており、2050年までに海洋中に存在するプラスチックの量が魚の量を上回ると予想されている。

陸鳥4種：ヘンダーソン・クイナ、ムネムラサキインコ、ヘンダーソン・フルーツハト、ヘンダーソン・ウグイスの4種。

チェコ共和国



文化遺産

チェスキー・クルムロフの歴史地区

Historic Centre of Český Krumlov

登録年 1992年 登録基準 (iv)



洪水被害を受けたヴルタヴァ河畔の古都

オーストリアとの国境付近に位置する、交通の要所であるヴルタヴァ河畔の古都。ボヘミア*の中世以来の街並を今に伝える。クルムロフという地名が初めて記録に現れるのは13世紀半ばのことで、この頃街の中心をなす城が建築された。14世紀からは、南ボヘミアの貴族ロジュンベルク家に支配が移り、銀山経営を中心に発展した。15世紀建造の後期ゴシック様式の**聖ヴィート教会**なども残る。2002年には大雨によるヴルタヴァ川が氾濫して洪水に見舞われ、歴史的な建造物も大きな被害を受けた。気候変動で大雨が増えると見られており、対策が求められている。



チェスキー・クルムロフ市街

デンマーク王国



自然遺産

イルリサット・アイスフィヨルド


Ilulissat Icefjord

登録年 2004年/2019年範囲変更 登録基準 (vii)(viii)



温暖化の影響を受けるグリーンランドの巨大氷河

グリーンランド西部に位置するイルリサット・アイスフィヨルドは、約1万年前に終わった最終氷期に形成された**セルメク・クジャレク氷河**と、フィヨルドからなる地域。世界遺産登録された総面積は約4,000km²で氷河地帯は約3,200km²にも及ぶ。セルメク・クジャレク氷河は、標高1,200m地点から海までつながる広大な氷河。ここから分離する氷は毎年40km³にもものぼり、南極大陸を除くと世界最大の氷河である。**地球温暖化の影響で近年グリーンランドの氷床は広範囲で溶け始めており、イルリサット・アイスフィヨルドも影響を受けている。**



イルリサット・アイスフィヨルドの氷河

ボヘミア：プラハを中心とするチェコ西部の地域。



隊商都市ウワダン、シンゲッティ、ティシット、ウワラタ

Ancient Ksour of Ouadane, Chinguetti, Tichitt and Oualata

文化遺産

登録年 1996年 登録基準 (iii)(iv)(v)



交易とイスラム教文化で栄えた4つの隊商都市

モーリタニア内陸部のサハラ砂漠とその周辺に点在する、ウワダン、シンゲッティ、ティシット、ウワラタの4つの都市は、サハラ交易の中継地として12世紀頃から栄えた。中でもシンゲッティはイスラム神学や科学の拠点となり、現在も1万冊以上の蔵書が残る。どの都市にも、石壁に囲まれた「クサル(複数形はクスール)」と呼ばれる旧市街が残る。モスクを中心に細い道が広がり、道沿いには中庭とテラスを備えた家が並ぶなど、西サハラの遊牧民の伝統文化と生活様式を伝える。しかし近年は、気候変動などによって砂漠化が進み、都市の脅威となっている。



ウワダンの遺構



エヴァーグレイズ国立公園

Everglades National Park

自然遺産

登録年 1979年/2010年危機遺産登録 登録基準 (viii)(ix)(x)



多様な生態系を育んできた巨大湿原

北米最大の亜熱帯自然保護区にあり、約5,600km²が世界遺産。湿原の上流には、常緑高木や熱帯植物が生育するハンモック*と呼ばれる島々が点在する。湿原下流の海岸地帯は汽水域で、マングローブ*の森林が広がる。エヴァーグレイズでは海水と淡水、また温帯と亜熱帯の動植物が入り交じり、複雑な生態系を形成している。

周囲の大都市が大量の生活用水を湿原地帯から引いていることから、地下水位の低下や水質汚染が進み、1993年に危機遺産リストに記載された。2007年にリストを脱するも、水質汚染が改善されず、2010年に再び危機遺産となった。



エヴァーグレイズ国立公園内に広がる湿原

ハンモック：大半は水面上の高さが数cmほどしかないが、多彩な植物によって、島ごとに独立した生態系がつけられている。
マングローブ：海水に浸った土地に生息する熱帯や亜熱帯の植物の総称。



ハ・ロン湾とカット・バ諸島

Ha Long Bay-Cat Ba Archipelago

自然遺産

登録年 1994年/2000年、2023年範囲拡大 登録基準 (vii)(viii)



奇岩、奇形の島々が点在するベトナム随一の景勝地

ベトナム北東部に位置するハ・ロン湾は、大小1,600以上の島が点在するベトナム随一の景勝地。約11万5,000年前の氷河期に中国南西部の石灰岩台地が沈み、海上に残った部分が風化してできた。鍾乳石や石筍^{せきじゆん}が見られる洞窟の島もある。海中には美しいサンゴ礁が広がり、アワビやロブスター、ナマコなど暖流を好む多くの生き物が生息している。

近年ハ・ロン湾では、石炭発掘による水質悪化によってサンゴ礁が激減し、また年間100万人を超える観光客による環境汚染や農地拡大によって生じる生態系の破壊などが問題となっており、早急な対処が求められている。



長年の侵食、風化で形づくられた島々



グレート・ヒマラヤ国立公園保護地区

Great Himalayan National Park Conservation Area


自然遺産

登録年 2014年 登録基準 (x)



人々や動植物の生活を支える大自然

ヒマラヤ山脈西部に位置するグレート・ヒマラヤ国立公園は、いくつもの高峰や、高山の牧草地、川辺の森林などが特徴。ヒマラヤ山脈の生物多様性のホットスポットの一部であり、ハイイロジュケイやジャコウジカなど、希少な動物種が生息する25種類の森林が広がっている。山頂付近には氷河や万年雪が存在し、その雪解け水を水源とする河川がいくつも流れている。しかし近年では、地球温暖化などの世界的な気候変動の影響のためか、氷河や万年雪が減少傾向にあり、河川下流域に住む人々への生活も懸念されている。



森林が広がるグレート・ヒマラヤ国立公園保護地区



グレート・バリア・リーフ

Great Barrier Reef

自然遺産

登録年 1981年 登録基準 (vii)(viii)(ix)(x)



気候変動で危機に立つ世界最大のサンゴ礁

オーストラリア北東の海岸に沿うように、全長約2,300kmにわたって広がる『グレート・バリア・リーフ』は、**世界最大のサンゴ礁**である。ここでサンゴ礁が形成され始めたのは、約1,800万年前だと推測される。その後氷河期を経て、現在目にできるサンゴ礁が誕生したのは約8,000～6,000年前といわれており、グレート・バリア・リーフは地球の歴史を知る上でも重要なものとされている。

グレート・バリア・リーフの本格的調査が開始されたのは、20世紀に入ってからであった。1950年には、オーストラリアの地理学協会により、同地の調査委員会が設立され、南回帰線上に位置するサンゴ島のヘロン島に研究所が常設された。調査開始後、この地には多くの海洋生物が生息していることがわかった。魚の数だけでも1,500種を数えるこの海域には、ほかにも約4,000種の軟体動物や海綿動物、甲殻類など多様な生態系が確認されている。これは、**サンゴ礁が外敵から守る役割を果たす**ことから、多くの海洋生物の安住の地となっていることを示している。また、それらを餌にする生物が多く現れるのも、グレート・バリア・リーフの特徴。危急種のジュゴンや筆頭、7～9月には40t級のザトウクジラが、10～3月にはウミガメ類が毎年この地にやってくる。

グレート・バリア・リーフは、地球規模の**気候変動による海水温の上昇**、サイクロンの影響、沿岸の港湾工事や工事による土砂の流入などの理由でサンゴが約半数にまで減少してしまった。

世界遺産委員会で、たびたび危機遺産リスト入りが審議されているが、オーストラリア政府の環境保全計画「リーフ2050年長期持続可能性計画」が評価されていることもあり、危機遺産リストには記載されていない。



グレート・バリア・リーフ



ブルー・マウンテンズ地域


Greater Blue Mountains Area

自然遺産

登録年 2000年 登録基準 (ix)(x)

山火事に悩まされるユーカリの森

オーストラリアの南東部にある、標高1,300m級の砂岩の峰々が連なる山岳地帯。この地域には森林地帯が広がり、全世界の約13%に相当する90種以上の**ユーカリ**が生育する。小型ユーカリのマリーの原野が広がるほか、12種のユーカリはシドニー砂岩地域にのみ生育しているとされる。近年は地球温暖化の影響もあり山火事が頻発しており、2019年から2020年まで続いた山火事でも大きな被害を受けた。



ソコトラ諸島

Socotra Archipelago

自然遺産

登録年 2008年 登録基準 (x)

インド洋の北西に浮かぶ『ソコトラ諸島』には、変化に富んだ地形に、キノコのような形をした**リュウケツジュ**が生えた独特な景観が広がる。2,300万年から500万年前頃に大陸移動でゴンドワナ大陸から分離して以来独自の生態系がつけられたため、動植物の多様性と固有種の割合の高さが際立っている。しかし近年の地球温暖化により島の乾燥が進み、固有種の半数が絶滅の危機にある。



ウアスカラン国立公園

Huascarán National Park

自然遺産

登録年 1985年 登録基準 (vii)(viii)

ペルーのアンデス中央部、国内最高峰のウアスカラン山(6,768m)をはじめとする山脈地帯。高度によって気候が異なるため、変化に富んだ景色が広がり、プヤ・ライモンディ*などさまざまな動植物の姿が見られる。南緯10度前後の熱帯地域に位置しながらも、氷河や万年雪、ツンドラの荒れ地などが点在。250の湖のうち氷河湖はトルコブルーの美しい**ヤングヌコ湖**など120に上るが地球温暖化によって氷河は大きく後退している。

プヤ・ライモンディ：パイナップル科の植物で、アンデスの高山帯に植生するが、基本的に亜熱帯でしか生育しない。生物学的な周期は40年と長く、「100年に1度花を咲かせる」ともいわれる。



42 開発による危機

オーストリア共和国



ウィーンの歴史地区

Historic Centre of Vienna

登錄年 2001年／2017年危機遺產登錄 登錄基準 (ii)(iv)(vi)



再開発計画で危機遺産リスト入りした「音楽の都」

ウィーンは13世紀に神聖ローマ帝国皇帝であるルドルフ1世の領土となり、**ハプスブルク家**の王都として発展した。17世紀後半にオスマン帝国の大軍勢に包囲されたが撃退に成功。それまでオスマン帝国を警戒して城壁内に押し込められていた市街が城壁の外へと急速に拡大し、建築ブームが到来すると、バロック様式の建物が次々と建造され、ヨーロッパ文化の中心地として繁栄した。

19世紀半ば、**フランツ・ヨーゼフ1世**によるウィーン中心部の都市改造で城壁が壊され、その跡地にリンクシュトラセと呼ばれる環状道路が敷設された。環状道路沿いにはゴシック・リバイバル様式や**ネオ・ルネサンス様式***の国立歌劇場や市庁舎など、新たな公共建築が建設された。第一次世界大戦での敗戦でハプスブルク家によるオーストリア支配が終わると、それまでの伝統的な建築様式から、より現代的で機能性を追求した建築様式の時代へと移行していった。

登録範囲内での高層ビル建築を含む再開発計画が問題となり、2017年に危機遺産リストに記載された。2023年現在、遺産の法的保護を強化し適切な保全状況を実現するため、開発計画の見直しが進められている。

ネオ・ルネサンス様式：歴史主義様式の1つ。19世紀ヨーロッパで興ったルネサンス様式を復興しようとした。

英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)



ロンドン塔

Tower of London

登錄年 1988年 登錄基準 (ii)(iv)

景観悪化に揺れるノルマン様式建造物

テムズ川河畔にたつロンドン塔は、イングランドを征服しノルマン朝を開いたノルマンディー公ウィリアム1世が、11世紀に建設した要塞施設で、**ノルマン様式**軍事施設の代表例である。近年、ロンドン市内の都市開発に伴い、景観悪化が問題となっている。バッファー・ゾーン*の外側に高層ビルが建てられているが、現在の世界遺産保護の方法では規制することができず、対策が求められている。



ドイツ連邦共和国



ケルンの大聖堂

Cologne Cathedral

登錄年 1996年 / 2008年範圍變更 登錄基準 (i)(ii)(iv)

ドイツ西部、ライン川河畔にあるドイツ有数の古都ケルンに、ひときわ高くそびえ立つケルンの大聖堂は、1248年の建築開始から632年もの長い歳月を費やし、1880年に**最初の図面通り純粋なゴシック様式で完成**した。周辺に高層建築物が計画されたことから、2004年に危機遺産リストに記載されたが、大聖堂の周囲に高さ規制をするなどの対応をとったことから2006年に解除された。

ハンガリー



ブダペスト:ドナウ河岸とブダ城地区、アンドラーシ通り

Budapest, including the Banks of the Danube, the Buda Castle Quarter and Andrassy Avenue

登錄年 1987年／2002年範圍擴大 **登錄基準** (ii)(iv)

ドナウ川西岸のブダ地区と東岸のペスト地区からなるブダペストは、もともとブダと
オーブダ、ペストの3つの街であった。1849年にドナウ川に架けられたくさり橋によって
結ばれたことで合併の機運が高まり、1873年に合併することとなった。近年では、都市開
発や、ブダ城地区を第二次世界大戦前の状態に戻す改修工事の真正性と完全性の問題か
ら、危機遺産入りも提言されている。

バッファー・ゾーン：緩衝地帯。詳しくはp.034参照。

スペイン



ドニャーナ国立公園

Doñana National Park

自然遺産

登録年 1994年/2005年範囲拡大 登録基準 (vii)(ix)(x)

スペイン最大の広さを誇る国立公園

大西洋に注ぐグアダルキビル川河口からアンダルシア3県にまたがる、湿原や砂丘、森林など多様な自然からなるスペイン最大の国立公園。中世以来、スペイン王室の狩り場として、人の定住が禁じられてきた。毎年50万羽を超える水鳥の越冬地であり、動く砂丘**ドゥナス・モビレス***などの奇観も見られる。近年、過剰な灌漑などによって湿原が危機にさらされており、対策が求められている。



ルーマニア



ロシア・モンタナの鉱山景観

Rosia Montană Mining Landscape

文化遺産

登録年 2021年/2021年危機遺産登録 登録基準 (ii)(iii)(iv)

ルーマニア西部のロシア・モンタナは、**ローマ帝国時代に大規模な金採掘が行われた**場所である。106年から166年間にわたり、ローマ人はこの場所から高度な技術を駆使し約500tの金を採掘した。この遺跡は、輸入されたローマ帝国の採掘技術と地元で開発された技術の融合を示している。2006年に閉山したが、採掘の再開計画はまだ残っている。再開されると遺跡の劣化が危惧されるため、世界遺産登録と同時に危機遺産となった。

ソロモン諸島



東レンネル

East Rennell

自然遺産

登録年 1998年/2013年危機遺産登録 登録基準 (ix)

ソロモン諸島の最南端、環状のサンゴ礁が隆起して生まれたレンネル島は、この種の島としては世界最大の全長約86km、幅約15kmあり、総面積370km²が世界遺産に登録されている。森林伐採などが環境や生態系に悪影響を与え、海岸線の浸食なども引き起こしているとして、2013年に危機遺産リストに記載された。また**テガノ湖**の湖面が、海水の流入などで上昇していることも懸念されている。

ドゥナス・モビレス：高さ40mもの砂丘が年間6mも移動する。

チュニジア共和国



スースの旧市街

Medina of Sousse

文化遺産

登録年 1988年/2010年範囲変更 登録基準 (iii)(iv)(v)

初期イスラム都市の典型例

地中海に面するスースは、イスラム王朝の**アグラブ朝**時代(800~909年)に主要港として栄えた。旧市街は初期イスラム都市の典型例とされ、難攻不落の都市として名を馳せたスースの面影を今に伝える。建物は海からの脅威に備え軍事的機能を有しており、正方形の要塞であるリバトや、城壁で囲まれたグランド・モスクなどが残る。現在は周囲での都市開発が、旧市街の景観を乱すとして問題視されている。



ケニア共和国



トゥルカナ湖国立公園群

Lake Turkana National Parks

自然遺産

登録年 1997年/2001年範囲拡大、2018年危機遺産登録 登録基準 (vii)(x)

ケニア北部、トゥルカナ湖東岸のシビロイ国立公園、湖に浮かぶ火山島のセントラル・アイランド国立公園、及びサウス・アイランド国立公園を合わせた総面積約1,600km²の公園群。トゥルカナ湖では渡り鳥やフラミンゴを含む350種以上の鳥類が見られる他、一帯はナイルワニやカバの一大生息地でもある。隣国**エチオピア**での**ダム開発**による生態系への影響が懸念されることから、2018年に危機遺産リストに記載された。

マダガスカル共和国



アツィナナナの熱帯雨林

Rainforests of the Atsinanana

自然遺産

登録年 2007年/2010年危機遺産登録 登録基準 (ix)(x)

世界で4番目に大きい島の**マダガスカル島**にある、6つの国立公園に広がる熱帯雨林。島は6,000万~8,000万年前に大陸から切り離され、動植物が独自の進化を遂げた。1万2,000種の植物の固有種が確認されている他、マダガスカルで見られる120種以上の哺乳類のうち、78種がアツィナナナの熱帯雨林に生息。うち72種は絶滅危惧種である。森林の不法伐採と密猟により、2010年に危機遺産となった。園内での金採掘も問題となっている。



シルヴァンシャー宮殿と 乙女の塔のある城壁都市バクー

Walled City of Baku with the Shirvanshah's Palace and Maiden Tower

文化遺産

登録年 2000年 登録基準 (iv)

多様な文化の影響を受けたアゼルバイジャン建築の傑作

カスピ海に面するバクーは、古くから交通の要衝で、9～10世紀頃から油田の採掘で繁栄した。ペルシア、オスマン帝国、ロシアなど多様な文化の影響を受けた歴史的建造物が残る。**城壁内(イチェリ・シェヘル)**にはモスクやゾロアスター教寺院などがあり、12世紀建造の見張り塔である乙女の塔と、15世紀に築かれたシルヴァンシャー宮殿は、アゼルバイジャン建築の傑作とされる。2000年の地震の被害や都市開発の影響で、一時危機遺産となった。



シャフリサブズの歴史地区

Historic Centre of Shakhrisayabz

文化遺産

登録年 2000年/2016年危機遺産登録 登録基準 (iii)(iv)

ウズベキスタン南東部のシャフリサブズは、14世紀に一代で帝国を築きあげた**ティムールの生誕地**。多くの庭園と砂漠が調和を示すティムール朝第2の都市であった。首都サマルカンドにも劣らぬ多彩な建造物が築かれたが、16世紀後半にブハラ・ハン国のアブドゥール・ハンに破壊され、一部の建造物及び遺構のみが残る。観光・都市開発による再建工事によって歴史地区の価値は大きく損傷し、2016年から危機遺産となっている。



スマトラの熱帯雨林遺産

Tropical Rainforest Heritage of Sumatra

自然遺産

登録年 2004年/2011年危機遺産登録 登録基準 (vii)(ix)(x)

3つの国立公園にまたがり、総面積2万5,000km²に達する広大な自然遺産。17種の固有種を含む1万種の植物、15種の固有種を含む200種の哺乳類、21種の固有種を含む580種の鳥類が生息しており、スマトラオランウータンなどの絶滅危惧種も確認されている。道路の建設や鉱山採掘、**プランテーション開発**と森林伐採、密猟などのため、2011年に危機遺産リストに記載された。



ベリーズ・バリア・リーフ自然保護区

Belize Barrier Reef Reserve System

自然遺産

登録年 1996年 登録基準 (vii)(ix)(x)

「カリブ海の真珠」と称される世界で2番目に大きなサンゴ礁

ベリーズ・バリア・リーフは、約250kmにわたって広がる、**世界で2番目に大きなサンゴ礁***である。65種に及ぶ多様な形態のサンゴや、500種以上の魚類、350種の軟体動物が生息し、絶滅危惧種のアメリカマナティやウミガメなども見られる。観光開発や石油探査計画などにより2009年に危機遺産リストに記載。その後全海域で油田開発につながる石油探査が禁止され、2018年に危機遺産リストから脱した。



パンタナル自然保護区

Pantanal Conservation Area

自然遺産

登録年 2000年 登録基準 (vii)(ix)(x)

ブラジル、ボリビア、パラグアイの3カ国には**世界最大の淡水湿地であるパンタナル湿原**が広がり、ブラジル側の一部が世界遺産となっている。クイアバ川とパラグアイ川の源流があり、雨季の氾濫・浸水によって養分が行きわたるため、肥沃な大地が培われている。サギやカモなどの水鳥の繁殖地で、約650種の鳥類など多種多様な生物が確認されているが、農地開発や頻発する山火事が、一帯の生物多様性に深刻な影響を与えている。



フレーザー島

K'gari (Fraser Island)

自然遺産

登録年 1992年 登録基準 (vii)(viii)(ix)

オーストラリアの東海岸、南北約120kmに広がる、**世界最大の砂の島**。約80万年前からオーストラリア大陸の東部にあるグレート・ディヴァイディング山脈で風化によって削られた砂が、堆積していったことで誕生した。20世紀に入ると製材所や鉄道などが建設され、フレーザー島は荒廃していくが、1972年に環境保護団体が島の北部3分の1を保護下に置き、環境が守られた。

世界で2番目に大きなサンゴ礁：オーストラリアの「グレート・バリア・リーフ」(p.396参照)に次いで、世界で2番目。北半球にあるサンゴ礁としては最大である。



43 観光課題

サン・マルコ大聖堂

イタリア共和国



ヴェネツィアとその潟

Venice and its Lagoon

文化遺産

登録年 1987年 登録基準 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)



オーバーツーリズムに悩まされる「水の都」

イタリア北東部のアドリア海に浮かぶヴェネツィアは、海上に築かれた都市。118の島、176の運河、400以上の橋からなっている。ヴェネツィアの地盤は泥土であるため、**無数の杭を打ち込むことで土台が作られている**。そこにイストリア石と呼ばれる耐水性に優れた石灰質の石を積むことによって、ヴェネツィア特有の基盤が形づくられた。

それでも有効に使える土地は狭いため、繁栄期には建築物が過密に建てられていった。832年に創建されたサン・マルコ大聖堂は、一時火災により焼失したが1094年に現在も残るビザンツ様式で再建された。内部には総面積約4,000㎡のモザイク画があり、マルコの福音書やヴェネツィアの歴史などが描かれている。**ドゥカーレ宮殿**は9世紀に建造され、14世紀にヴェネツィア共和国総督の邸宅へ改築された。16世紀にヴェネツィア派の画家ティントレットが描いた「天国」でも有名。

近年では観光客の増加が問題となっており、2023年にはUNESCOから危機遺産リストへ記載するよう勧告が出された。ヴェネツィアは観光税の徴収などの対策を行い、危機遺産リスト入りは免れた。

イタリア共和国



フィレンツェの歴史地区

Historic Centre of Florence

文化遺産

登録年 1982年/2015年、2021年、2023年範囲変更 登録基準 (i)(ii)(iii)(iv)(vi)

ルネサンスが咲き誇った「花の都」

イタリア中部トスカーナ地方のアルノ河畔に広がるフィレンツェは、14世紀末から17世紀にかけてルネサンス*の中心となった商業都市。赤茶色の瓦が広がる街でひととき目を引く、サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂は、**コジモ・デ・メディチ**の援助によって建設されたルネサンス様式の建物。観光客向けの民泊が増えすぎたことから、2023年6月から歴史地区での民泊は禁止された。



クロアチア共和国



ドゥブロヴニクの旧市街

Old City of Dubrovnik

文化遺産

登録年 1979年/1994年範囲拡大、2018年範囲変更 登録基準 (i)(iii)(iv)

クロアチア南部、アドリア海に面するドゥブロヴニクは、7世紀初頭から海上交易の重要拠点として発展した。城壁に囲まれた旧市街と城壁外の歴史地区の一部が世界遺産に登録されており、**高さ約25mの城壁が街の4つの要塞を結んでいる**。ゴシック様式やルネサンス様式、そしてバロック様式の建造物と各種施設が混在する。オーバーツーリズムによる問題が深刻で、さまざまな対応が取られている。

フランス共和国



ヴェゼール渓谷の装飾洞窟と先史遺跡

Prehistoric Sites and Decorated Caves of the Vézère Valley

文化遺産

登録年 1979年/2023年範囲変更 登録基準 (i)(iii)

ヴェゼール渓谷には、147の先史遺跡と25の装飾洞窟がある。1940年に発見された**ラスコー洞窟**の壁画*は、岩肌の凹凸を活用し、細かな描写と豊かな色彩で動物たちが生き生きと描かれていて、先史時代の芸術研究にとってきわめて重要である。ラスコーの洞窟は発見当初は観光客に公開されていたが、人々の息に含まれる二酸化炭素によって壁画が劣化したため、現在は公開されていない。

ルネサンス：14世紀から16世紀にかけてイタリアで始まり、西欧各国に広まった芸術、思想の新しい動き。中世の世界観から人間中心の世界観への転換が図られた。ラスコー洞窟の壁画：1940年に近隣の子供たちによって偶然発見された。

スペイン



アントニ・ガウディの作品群

Works of Antoni Gaudi

文化遺産

登録年 1984年/2005年範囲拡大 登録基準 (i)(ii)(iv)

美しい曲線を描く天才建築家ガウディの作品群

スペイン東部、カタルーニャ地方の中心都市バルセロナに点在する、建築家アントニ・ガウディ・イ・コルネが設計した建築物群。**カサ・ミラ**、グエル公園、グエル邸の3件が1984年に、サグラダ・ファミリア贖罪聖堂の一部、カサ・ヴィセンス、カサ・パトリョ、コロニア・グエル聖堂の地下聖堂の4件が2005年に世界遺産に追加登録された。サグラダ・ファミリア贖罪聖堂については、現在も建設中で、完成している「誕生のファサード」と「地下聖堂」のみが登録されている。バルセロナには人口の約20倍の観光客が訪れ、オーバーツーリズムの問題が顕著なため、市は観光客の削減に乗り出している。



建築中のサグラダ・ファミリア贖罪聖堂



中華人民共和国



麗江の旧市街

Old Town of Lijiang


文化遺産

登録年 1997年/2012年範囲変更 登録基準 (ii)(iv)(v)

納西族の営みを今に伝える古都

中国南西部の雲南省に位置する麗江は、12世紀の宋代末に少数民族**納西族**が築いた古都。納西族は、交易のため街を訪れる漢民族やチベット族などの諸民族の文化を取り入れて、象形文字の一種である**東巴文字**など、独自の文化を生み出した。旧市街に軒を連ねるのは、瓦葺きで2階建ての木造家屋。漢民族の建築様式で中庭の四方を建物で囲んだ「**四合院**」を基に、「**四合五天井**」や「**三坊一照壁**」といった方法で建てられている。

世界遺産登録後は大量の観光客が流入し、商売目的の新住民が移住してきたことで納西族などの旧住民が旧市街の外へ転居する事態を招いている。



麗江の街並



ベトナム社会主義共和国



古都ホイアン

Hoi An Ancient Town

文化遺産

登録年 1999年 登録基準 (ii)(v)

多様な文化を取り込んだ古い街並が残る港街

ベトナム中部のトゥボン川河口に位置するホイアンは、16～19世紀に国際貿易港として繁栄した港街。中国、インド、アラブを結ぶ中継貿易の拠点として、ヨーロッパ諸国の船も多数寄港した。16～17世紀には**朱印船貿易**の中継地点として多くの日本人が移住し、日本の職人が建築したと伝えられる来遠橋(カウライヴィエン橋)や、ホイアン独特の街並が残る。観光客の増加に伴い、ごみや騒音などの問題が生じている。



インドネシア共和国



ボロブドゥールの仏教寺院群

Borobudur Temple Compounds

文化遺産

登録年 1991年 登録基準 (i)(ii)(vi)

ジャワ島中部に位置する、8～9世紀にシャイレンドラ朝が築いた世界最大規模の仏教遺跡。ピラミッド状のボロブドゥール寺院は、内部構造がないため内部に入ることはできない。約115m四方の基壇の上に5層の方形壇、その上に3層の円形壇が重なる構造は、大乘仏教の宇宙観である「**三界**」を表しており、回廊を上階へと上っていくことで、仏教の真理へ到達するとされる。世界中から観光客が訪れ、観光公害が問題となっている。

インドネシア共和国



コモド国立公園

Komodo National Park

自然遺産

登録年 1991年 登録基準 (vii)(x)

インドネシア南東部の『コモド国立公園』は、2つの大陸プレートが接する場所に位置し、熱帯の島々でありながら緑は少ない。周辺は美しいサンゴ礁が広がる海洋生物の保護区となっている。また、世界最大のトカゲで、危急種の**コモドオオトカゲ**の貴重な生息地でもある。コモドオオトカゲは密猟と乱獲によって生息数が激減しており、近年では観光客の増加が生態系へ影響を与えることも懸念されている。

四合五天井：1つの中庭(天井)を囲むように4つの建物を配置し、その隅に4つの小さな庭を設ける建築様式。
三坊一照壁：中庭を囲むように、3つの建物と「照壁」と呼ばれる装飾された壁を配置する建築様式。



アジャンターの石窟寺院群

Ajanta Caves

文化遺産

登録年 1983年 登録基準 (i)(ii)(iii)(vi)

1,000年の眠りから覚めた森林の仏教石窟寺院群

ムンバイの北東約360km、紀元前2～後7世紀にかけて断続的に開窟された、断崖に点在する大小30の石窟寺院群。仏教窟にはストゥーパを安置し礼拝するチャイティヤ窟と、僧侶たちが居住したヴィハーラ窟があるが、**アジャンターでは大半がヴィハーラ窟**。第1窟に描かれた蓮華手菩薩像は、日本を含むアジア各地に影響を与えた。壁画は湿気や観光客の増加などにより急速に劣化している。



ロック・アイランドの南部ラグーン

Rock Islands Southern Lagoon

複合遺産

登録年 2012年 登録基準 (iii)(v)(vii)(ix)(x)

ミクロネシアに位置する、約1,000km²の美しい海に広がる地域。火山活動によってつくられた445もの無人の島々やサンゴ礁などで、植物や鳥類、海洋生物の生態系や生物多様性が評価された。湖も特徴で、淡水湖と海水湖、汽水湖などからなる52の湖は、多様な水生生物の宝庫となっている。タコクラゲの生息地として知られる「**ジェリーフィッシュ・レイク**」などで、観光地化に伴いエコシステムに問題が出ている。



ウルル、カタ・ジュタ国立公園

Uluru-Kata Tjuta National Park

複合遺産

登録年 1987年/1994年範囲拡大 登録基準 (v)(vi)(vii)(viii)

オーストラリア大陸中央に位置するウルル*とカタ・ジュタからなる国立公園。ウルルは、周辺がまだ海底だったおよそ6億年前、造山運動と地殻変動によって海底の堆積層が地表へと隆起したもので、浸食と風化に耐えた強固な部分が残し、現在の形となった。オーストラリア政府は2019年、先住民**アボリジニのアナング族**の訴えを受けて、多くの観光客が訪れるウルルでの登山を禁止した。

ウルル：サウスオーストラリア植民地総督であったヘンリー・エアーズにちなんで、「エアーズ・ロック」とも呼ばれる。



ガラパゴス諸島

Galápagos Islands

自然遺産

登録年 1978年/2001年範囲拡大 登録基準 (vii)(viii)(ix)(x)

独自の進化を遂げた動物たちの宝庫

大小19の島と周辺の岩礁からなる火山群島。洋上の孤島で育まれた特異な生態系を持つ動物が生息する。この地を訪れたイギリスの博物学者チャールズ・ダーウィンは、**フィンチ***やゾウガメなどの生物が島ごとに異なる特徴を持つことを発見し、進化論の着想を得て「種の起源」を著した。人間の到来以降、密猟(漁)や外来種が生態系を破壊。観光圧力も加わって一時危機遺産リストに記載された。



ヨセミテ国立公園

Yosemite National Park

自然遺産

登録年 1984年 登録基準 (vii)(viii)

アメリカ西部にある、氷河期に形作られたダイナミックな地形が特色の自然公園。硬く風化しにくい花こう岩の性質のおかげで、ハーフドームなど氷河期の風景がそのまま残されている。手つかずの自然を意味する「**ウィルダネス**」が総面積の95%を占めるヨセミテは、アメリカの自然保護運動の聖地でもある。しかし、観光客の増加によりごみ問題や大気汚染の被害が深刻化したため、さまざまな対策が講じられている。



ゲベル・バルカルとナパタ地域の遺跡群

Gebel Barkal and the Sites of the Napatan Region

文化遺産

登録年 2003年 登録基準 (i)(ii)(iii)(iv)(vi)

スーダンの首都ハルトームの北約400kmに位置する、**クシュ王国***時代に築かれた古代都市の遺跡群。古代、エジプト南部からスーダン北部にかけては、大国エジプトの影響を受けていたが、紀元前730年頃には、クシュ王国のピアンキ王が逆にエジプト全域を統治し、ナパタは古代エジプト第25王朝の拠点となった。遺跡群の多くは砂岩でもろく、砂嵐や風化、観光客や車の往来などによる遺産の劣化が進んでいる。

フィンチ：主に北半球とアフリカ大陸に分布するアトリ科の鳥。ダーウィン・フィンチはガラパゴス諸島にのみ生息する。
クシュ王国：p.193参照。