

我是概统

茆诗松《概率论与数理统计教程》复习提要。

制作者: GYF

GitHub: <https://github.com/23300240002>

第一章 随机事件与概率

1.1 随机事件及其运算

主要内容: 随机现象, 样本空间, 随机事件, 事件间的关系与运算, 事件域。

- 知识点:
 - 样本空间与事件: 样本空间 Ω 是一次试验所有可能结果的集合; 事件是 Ω 的子集, 用集合来描述“哪些结果属于该事件”。
 - 相容/互不相容: 两个事件能同时发生则相容; 若交集为空 (不能同时发生) 则互不相容。
 - 对立事件: A 的对立事件是 $\bar{A}$, 必有且仅有一个发生, 且 $A \cup \bar{A} = \Omega$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$ 。
 - 事件运算与直观: 并、交、差、补在韦恩图上有直接图形含义, 帮助区分“至少一个”“同时发生”“只发生其一”。
 - 事件域: 对并、交、补都闭合的事件集合族; 保证我们在这个“封闭的宇宙”里讨论事件, 不会因为运算跳出定义范围。
 - 概率公理 (Kolmogorov): (1) 非负性 $P(A) \geq 0$; (2) 规范性 $P(\Omega) = 1$; (3) 可列可加性: 互不相容事件列 A_i 满足 $P(\bigcup A_i) = \sum_i P(A_i)$ 。
- 典型例题:
 - ★☆☆☆☆ 写出连续抛一枚硬币, 直至出现正面为止的样本空间。
 - * 解答: 样本空间为 $\{H, TH, TTH, TTTH, \dots\}$, 第 k 个样本对应前 $k-1$ 次为反面 T , 第 k 次为正面 H 。
 - ★☆☆☆☆ 证明 $A = AB \cup A\bar{B}$ 。
 - * 解答: 全集 Ω 可以拆成 $B \cup \bar{B}$ 。把 A 看作 $A \cap \Omega$, 代入 $\Omega = B \cup \bar{B}$ 得 $A = A \cap (B \cup \bar{B}) = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$ 。

1.2 概率的定义及其确定方法

主要内容: 概率的公理化定义, 频率法、古典法、几何法、主观法。

- 知识点:
 - 古典概型: 有限且等可能的结果, 概率等于“有利结果数/全部结果数”。“等可能”就是每个基本结果的权重相同。
 - 几何概型: 在长度/面积/体积可度量的连续空间, 概率用“测度比”表示: $P(A) = \frac{\text{测度}(A)}{\text{测度}(\Omega)}$ 。等密度假设 = 在可行区域内落点均匀分布。
 - 频率法: 大量重复试验的相对频率趋向稳定数, 此稳定数被视为概率; 强调“实验可验证”的直觉。
 - 主观概率: 基于个人或专家的信念/信息并可随新信息更新, 可用贝叶斯方法调整。
- 典型例题:
 - ★★☆☆☆ 六根草随机成对相接, 求恰成一个环的概率 (答案 $8/15$)。
 - * 思路: 共有 $(6-1)!! = 5 \cdot 3 \cdot 1 = 15$ 种无标号成对连接方式 (“握手配对”模型)。要形成一个环, 需要避免产生小环; 对 6 段有 8 种连成单环的方式, 可直接枚举: 任取一端, 有 5 种连接对象; 若接成邻端, 剩 4 端必须封成一环 (2 种); 若接到非邻端, 剩 4 端先连成两条链再封口 (6 种), 合计 8, 故 $P = 8/15$ 。
 - ★★★☆☆ 将 n 个相同球随机放入 N 个盒子。
 - 1) 某指定盒中恰有 k 个球的概率: 等价于给其余 $N-1$ 盒分 $n-k$ 球; 方式数 $C_{n-k+N-2}^{N-2}$, 总方式 C_{n+N-1}^{N-1} , 故 $P = \frac{C_{n-k+N-2}^{N-2}}{C_{n+N-1}^{N-1}}$ 。
 - 2) 恰有 m 个空盒: 先选空盒 C_N^m ; 余 $N-m$ 盒全非空, 等价于求正整数解个数 $x_1 + \dots + x_{N-m} = n$, 用隔板法先每盒放 1 个, 剩 $n - (N-m)$ 球自由分配, 方式 C_{n-1}^{N-m-1} , 故 $P = \frac{C_N^m C_{n-1}^{N-m-1}}{C_{n+N-1}^{N-1}}$ 。

3) 某指定的 m 盒中恰好有 j 个球: 把 j 球分给这 m 盒 (可空), 方式 C_{j+m-1}^{m-1} ; 其余 $n-j$ 球分到 $N-m$ 盒, 方式 $C_{n-j+N-m-1}^{N-m-1}$; 总方式 C_{n+N-1}^{N-1} , 故 $P = \frac{C_{j+m-1}^{m-1} C_{n-j+N-m-1}^{N-m-1}}{C_{n+N-1}^{N-1}}$ 。

1.3 概率的性质

主要内容: 概率的可加性、单调性、加法公式、连续性。

• 知识点:

- 单调性: 若 $A \subseteq B$, 则 $P(A) \leq P(B)$ 。
- 加法公式: 任意事件 A, B , $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; 推广到有限多个事件的容斥原理。
- 连续性: 若 $A_n \uparrow A$, 则 $P(A_n) \uparrow P(A)$; 若 $A_n \downarrow A$, 则 $P(A_n) \downarrow P(A)$ 。($A_n \uparrow A$ 表示事件序列单调递增且并集极限为 A ; $A_n \downarrow A$ 表示单调递减且交集极限为 A 。)

• 典型例题:

- ★★★★★ 夜间取枪问题: n 人随机取 n 枝枪, 求至少一人取到自己的枪的概率。
 - * 递推法: 全错排数 D_n 满足 $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$, 且 $D_1 = 0, D_2 = 1$, 解得 $D_n \approx n!/e$, 故 $P(\text{至少一人对}) = 1 - D_n/n!$ 。
 - * 直接用加法公式/容斥 (不借助递推): 设 A_i 表示第 i 个人取对。则 $P(\text{至少一人对}) = \sum P(A_i) - \sum P(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{k+1} \sum P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) + \dots$ 。任取 k 人取对, 余 $(n-k)$ 枝枪与 $(n-k)$ 人错排, 其概率是 $\frac{(n-k)!}{n!}$ 。因此

$$P(\text{至少一人对}) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} C_n^k \frac{(n-k)!}{n!} = 1 - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!},$$

极限趋近 $1 - 1/e \approx 0.632$, 与递推法一致。

- ★★★★★ 证明 $|P(A \cap B) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$ 。
 - * 设 $p = P(A)$, $q = P(B)$, 不妨令 $p \geq q$ 。上界: $P(A \cap B) - pq \leq P(B) - pq = q(1-p)$, 在 $p \geq q$, $q \in [0, 1]$ 时最大值出现在 $p = q = \frac{1}{2}$, 为 $\frac{1}{4}$ 。
 - * 下界看 $P(A)P(B) - P(A \cap B)$ 。分解

$$pq - P(A \cap B) = pP(\bar{A} \cap B) + P(A \cap B)(p-1).$$

第二项非正, 第一项 $\leq pP(\bar{A} \cap B) \leq pP(\bar{A}) = p(1-p)$, 其最大值在 $p = \frac{1}{2}$ 为 $\frac{1}{4}$ 。综合两端, 绝对值界均不超过 $1/4$, 对称性成立。

1.4 条件概率

主要内容: 条件概率定义, 乘法公式, 全概率公式, 贝叶斯公式。

• 知识点:

- 条件概率: $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, 表示“在 B 已发生”这一信息下 A 的可能性; 因分母 $P(B)$ 必须非零。
- 乘法公式: $P(A \cap B) = P(B)P(A | B) = P(A)P(B | A)$, 把“同时发生”拆成“先发生一件, 再在此条件下发生另一件”。
- 完备事件组与全概率: 若 $\{B_i\}$ 两两互不相容且并集为 Ω (完备事件组), 则 $P(A) = \sum_i P(B_i)P(A | B_i)$, 即先分类讨论 B_i , 再加总。
- 贝叶斯公式: $P(B_j | A) = \frac{P(B_j)P(A | B_j)}{\sum_i P(B_i)P(A | B_i)}$, 含义是“先验 $P(B_j)$ 结合证据 A 的似然 $P(A | B_j)$, 得到更新后的后验概率”。是信息更新的数学刻画。

• 典型例题:

- ★★★★★ 色盲与性别: 男女比例 $22:21$, 男色盲率 5% , 女色盲率 0.25% , 抽到色盲者求为男性的概率。
 - * 设事件 M 为男性, C 为色盲。 $P(M) = \frac{22}{43}$, $P(\bar{M}) = \frac{21}{43}$; $P(C | M) = 0.05$, $P(C | \bar{M}) = 0.0025$ 。

- * 全概率得 $P(C) = P(M)P(C|M) + P(\overline{M})P(C|\overline{M}) = \frac{22}{43} \cdot 0.05 + \frac{21}{43} \cdot 0.0025 \approx 0.0258$ 。
- * 贝叶斯: $P(M|C) = \frac{0.05 \cdot 22/43}{0.0258} \approx 0.9545$ 。

1.5 独立性

主要内容: 两个事件独立, 多事件相互独立, 试验独立。

- 知识点:
 - 两事件独立: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 。
 - 三事件相互独立需同时满足两两独立与三者联合独立: $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$ 。
 - 独立与互斥不同: 互斥非零概率事件不独立。
 - 独立性在乘法公式和分解计算中的常用性: 独立则 $P(A|B) = P(A)$ 。
- 典型例题:
 - ★★★☆☆ 设 A, B, C 两两独立且 $A \cap B \cap C = \emptyset$ 。
 - 1) 若 $P(A) = P(B) = P(C) = x$, 求使 $P(A \cup B \cup C)$ 最大的 x 。
 - 2) 若 $P(A) = P(B) = P(C) < 1/2$ 且 $P(A \cup B \cup C) = 9/16$, 求 $P(A)$ 。
 - * 解答: 两两独立给出 $P(A \cap B) = x^2$ 等。因 $A \cap B \cap C = \emptyset$, 由加法公式

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) = 3x - 3x^2.$$

- 1) 求最大值: 看作一元二次函数 $f(x) = 3x - 3x^2$, 顶点在 $x = \frac{1}{2}$, 值 $f(1/2) = \frac{3}{4}$, 故最大时 $x = 0.5$ 。
- 2) 已知 $3x - 3x^2 = \frac{9}{16}$, 化为 $3x^2 - 3x + \frac{9}{16} = 0$, 即 $48x^2 - 48x + 9 = 0$, 解得 $x = \frac{1}{4}$ (另一根大于 $1/2$ 不合题设), 故 $P(A) = \frac{1}{4}$ 。

第二章 随机变量及其分布

2.1 随机变量及其分布

主要内容: 随机变量定义, 分布函数, 离散型分布列, 连续型密度函数。

- 知识点:
 - 随机变量: 把样本空间的结果用实数描述的函数 (数值刻画结果)。
 - 分布函数 $F_X(x)$: $P(X \leq x)$, 单调右连续, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F = 1$ 。
 - 离散型: $P(X = x_k) = p_k$, 分布列 $\{(x_k, p_k)\}$, $\sum p_k = 1$, F 为阶梯状。
 - 连续型: 存在密度 $f(x)$, $f \geq 0$, $\int f = 1$, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, 单点概率为 0。

2.2 随机变量的数学期望

主要内容: 数学期望定义、线性性质、常用性质。

- 知识点:
 - 定义: 离散型 $E(X) = \sum x_k p_k$; 连续型 $E(X) = \int x f(x) dx$ (绝对可积保证收敛)。
 - 线性: $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$; 常数项直接取值。
 - 单调/正性: 若 $X \geq 0$ 则 $E(X) \geq 0$; 若 $X \leq Y$ 则 $E(X) \leq E(Y)$ (在期望存在时)。
 - 受控收敛: 若 $|X| \leq M$, 则 $|E(X)| \leq M$ 。
- 典型例题:
 - ★★★☆☆ 检查抽检次数的期望。一次检测产品, 若前 a 件都合格则判定合格; 若在前 a 件内发现不合格即停并判定不合格。每件独立, 出现不合格的概率为 p 。
 - * 设第 k 件是首个不合格 ($1 \leq k \leq a$), 概率 $(1-p)^{k-1}p$, 此时检测件数为 k 。若前 a 件全合格, 概率 $(1-p)^a$, 检测件数为 a 。因此期望

$$E(N) = \sum_{k=1}^a k(1-p)^{k-1}p + a(1-p)^a.$$

- * 拆和: $\sum_{k=1}^a k(1-p)^{k-1}p$ 是截断的几何期望。用等比求和: 先记 $S = \sum_{k=1}^a kr^{k-1}$, $r = 1-p$ 。
推法: 先有 $\sum_{k=0}^a r^k = \frac{1-r^{a+1}}{1-r}$, 对 r 求导得 $\sum_{k=1}^a kr^{k-1} = \frac{1-ar^{a-1}+(a-1)r^a}{(1-r)^2}$ (把导数两边展开并整理即可)。代入得

$$E(N) = p \frac{1-ar^{a-1}+(a-1)r^a}{(1-r)^2} + ar^a, \quad r = 1-p.$$

- * 化简: $(1-r) = p$, 整理得到 $E(N) = \frac{1-(1-p)^a}{p}$ 。
- ★★★★★ 证明 $E(X) = \int_0^\infty [1-F(x)]dx - \int_{-\infty}^0 F(x)dx$ (假设期望存在)。
- * 把期望拆成正负部分: $E(X) = \int_0^\infty xf(x)dx + \int_{-\infty}^0 xf(x)dx$ 。
- * 对正半轴, 写成二重积分: $x = \int_0^x 1dy$, 故

$$\int_0^\infty xf(x)dx = \int_0^\infty \int_0^x 1 \cdot f(x)dydx.$$

交换次序 (Fubini, 非负可行): y 先行, x 从 y 到 ∞ , 得

$$\int_0^\infty \left[\int_y^\infty f(x)dx \right] dy = \int_0^\infty [1-F(y)]dy.$$

- * 对负半轴, 写 $x = -\int_x^0 1dy$, 得

$$\int_{-\infty}^0 xf(x)dx = -\int_{-\infty}^0 \int_x^0 1 \cdot f(x)dydx.$$

换序: y 从 $-\infty$ 到 0 , x 从 $-\infty$ 到 y , 得到

$$-\int_{-\infty}^0 \left[\int_{-\infty}^y f(x)dx \right] dy = -\int_{-\infty}^0 F(y)dy.$$

- * 两部分相加即得所求公式。

2.3 随机变量的方差与标准差

主要内容: 方差与标准差定义, 性质, 切比雪夫不等式。

- 知识点:
 - 方差: $\text{Var}(X) = E[(X-E(X))^2] = E(X^2) - (E(X))^2$; 标准差为方差的平方根。
 - 性质: 对常数 c , $\text{Var}(c) = 0$; 对 a, b , $\text{Var}(aX+b) = a^2 \text{Var}(X)$; 独立时 $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ 。
 - 切比雪夫不等式: 对任意 $\varepsilon > 0$, $P(|X-E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$, 刻画“离均值偏离的概率”上界。
- 典型例题:
 - ★★★★★☆ 设 $X \geq 0$, $a > 0$, 若 $E(e^{aX})$ 存在, 证明对任意 $x > 0$ 有 $P(X \geq x) \leq \frac{E(e^{aX})}{e^{ax}}$ 。
 - * 思路: 对任意单调非减且非负的 g , 都有 $P(X \geq x) \leq \frac{E[g(X)]}{g(x)}$ 。选 $g(t) = e^{at}$ 即得结论。
 - * 推导 (两次“放大”):
 - 1) $P(X \geq x) = \int_x^\infty p_X(t)dt \leq \int_x^\infty \frac{g(t)}{g(x)} p_X(t)dt$, 因为 $g(t) \geq g(x)$ 当 $t \geq x$ 。
 - 2) 再把积分区间从 $[x, \infty)$ 放大到全轴: $\int_x^\infty \frac{g(t)}{g(x)} p_X(t)dt \leq \int_{-\infty}^\infty \frac{g(t)}{g(x)} p_X(t)dt = \frac{E[g(X)]}{g(x)}$ 。
 - 3) 代入 $g(t) = e^{at}$, 得到 $P(X \geq x) \leq \frac{E(e^{aX})}{e^{ax}}$ 。

2.4 常用离散分布

主要内容：二项、泊松、超几何、几何与负二项分布的表达、期望方差、常用性质。

• 知识点（熟练背诵）：

- 二项 $X \sim b(n, p)$: $P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$; $E(X) = np$, $\text{Var}(X) = np(1-p)$ 。含义： n 次独立伯努利试验中的成功次数，如“做 n 道是非题答对几道”。
- 泊松 $X \sim P(\lambda)$: $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, $k = 0, 1, \dots$; $E(X) = \lambda$, $\text{Var}(X) = \lambda$ 。含义：固定时间/区域内的稀有事件计数，如“每小时来店顾客数”“芯片缺陷点数”。
- 超几何 $X \sim h(n, N, M)$: $P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$, $E(X) = n \frac{M}{N}$, $\text{Var}(X) = n \frac{M}{N} (1 - \frac{M}{N}) \frac{N-n}{N-1}$ 。含义：不放回抽样的成功个数，如“从 N 件货中含 M 件次品，抽 n 件抽到多少次品”。
- 几何 $X \sim \text{Ge}(p)$: $P(X = k) = (1-p)^{k-1} p$, $E(X) = \frac{1}{p}$, $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$ 。含义：首次成功出现的试验次序，如“第几次投篮命中”。
- 负二项 $X \sim \text{Nb}(r, p)$: $P(X = k) = C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$, $k = r, r+1, \dots$; $E(X) = \frac{r}{p}$, $\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$ 。含义：达到第 r 次成功所需的总试验次数，如“集齐 r 次命中要投多少次”。

• 典型例题：

- ★☆☆☆☆ $X \sim \text{Pois}(\lambda)$ 且 $P(X = 1) = P(X = 2)$ ，求 $P(X = 4)$ 。
* $e^{-\lambda} \lambda^1 / 1! = e^{-\lambda} \lambda^2 / 2!$ 得 $\lambda = 2$ 。故 $P(X = 4) = e^{-2} \frac{2^4}{4!} = \frac{2}{3} e^{-2}$ 。
- ★★☆☆☆ 药物有效性的贝叶斯计算：一年感冒次数若药有效则 $\lambda = 3$ ，无效则 $\lambda = 5$ 。药物对人群有效概率 0.75。某人服药后一年感冒 2 次，求药对其有效的后验概率。
* 设 E 表示“药有效”， C 表示“感冒 2 次”。先验： $P(E) = 0.75$, $P(\bar{E}) = 0.25$ 。
* 似然： $P(C | E) = e^{-3} \frac{3^2}{2!}$, $P(C | \bar{E}) = e^{-5} \frac{5^2}{2!}$ 。
* 贝叶斯：

$$P(E | C) = \frac{P(E)P(C | E)}{P(E)P(C | E) + P(\bar{E})P(C | \bar{E})} = \frac{0.75 e^{-3} 9/2}{0.75 e^{-3} 9/2 + 0.25 e^{-5} 25/2} = \frac{27e^2}{27e^2 + 25} \approx 0.915.$$

- ★★★★★☆ 几何分布期望倒数：设 $X \sim \text{Ge}(p)$ ，证明 $E(\frac{1}{X}) = -\frac{p \ln p}{1-p}$ 。
* 代入密度： $E(1/X) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (1-p)^{k-1} p = \frac{p}{1-p} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1-p)^k}{k}$ 。
* 级数公式： $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = -\ln(1-x)$ （可由对几何级数 $\sum x^k = \frac{1}{1-x}$ 积分得到），取 $x = 1-p$ 得 $\sum \frac{(1-p)^k}{k} = -\ln p$ 。
* 代回即得 $E(1/X) = -\frac{p \ln p}{1-p}$ 。
- ★★★★★★ 二项分布的倒数期望： $X \sim b(n, p)$ ，证明 $E(\frac{1}{X+1}) = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}$ 。
* 代入： $E(\frac{1}{X+1}) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ 。
* 用恒等式 $\frac{1}{k+1} C_n^k = \frac{1}{n+1} C_{n+1}^{k+1}$ ，得

$$E = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n C_{n+1}^{k+1} p^{k+1} (1-p)^{n-k} = \frac{1}{(n+1)p} \sum_{j=1}^{n+1} C_{n+1}^j p^j (1-p)^{n+1-j}.$$

- * 拆出全概率 1 再减去 $j = 0$ 项： $\sum_{j=0}^{n+1} C_{n+1}^j p^j (1-p)^{n+1-j} = 1$ ，故上式为 $\frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}$ 。

2.5 常用连续分布

主要内容：正态、均匀、指数、伽马、贝塔分布的表达、期望方差、标准化。

• 知识点（熟练背诵）：

- 正态 $N(\mu, \sigma^2)$: 密度 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$; $E(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$; 标准化 $(X-\mu)/\sigma \sim N(0, 1)$ 。

含义：独立小扰动累加的极限分布，测量误差、身高、考试分常用此模型。

- 均匀 $U(a, b)$: $f = \frac{1}{b-a}$ ($a < x < b$), $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$ 。含义：区间内任一点等可能，如“随机抽取一天中的时间点”。

- 指数 $\text{Exp}(\lambda)$: $f = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x > 0$), $E(X) = 1/\lambda$, $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$, 无记忆性 $P(X > s+t | X > s) = P(X > t)$ 。含义：泊松过程的等待时间，常用于描述等待时间或寿命，如“下一次电话进来的间隔”。

- 伽马 $\text{Ga}(\alpha, \beta)$ (形状-尺度): $f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$ ($x > 0$), $E(X) = \alpha\beta$, $\text{Var}(X) = \alpha\beta^2$ 。

含义：到第 α 次事件的累积等待时间，或多个独立指数和。

* 伽马函数: $\Gamma(r) = \int_0^\infty x^{r-1} e^{-x} dx$ ($r > 0$), 满足递推 $\Gamma(r+1) = r\Gamma(r)$, 整数时 $\Gamma(n) = (n-1)!$ 。

* 与指数的关系：当 $\alpha = 1, \beta = 1/\lambda$ 时, $\text{Ga}(1, 1/\lambda)$ 即 $\text{Exp}(\lambda)$ 。

* 应用直觉：可视为“累积 α 个独立指数等待时间”的和，或“频率已知但次数不确定的总耗时”，在排队/可靠性中频繁出现。

- 贝塔 $\text{Be}(\alpha, \beta)$: $f(x) = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}$ ($0 < x < 1$), $E(X) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$, $\text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$ 。含义：定义在 0-1 之间的比例型分布，常作“成功率”的先验或比例数据的模型；非常灵活，可呈现多种形状。

• 典型例题：

- ★★☆☆☆ 成绩正态分布反推分位数：考试成绩正态，10000 人，90 分以上有 359 人，60 分以下有 1151 人。录取 2500 人，求最低录取分。

* 标准化: $P(Z > z_1) = 359/10000 \Rightarrow z_1 \approx 1.8$; $P(Z < z_2) = 1151/10000 \Rightarrow z_2 \approx -1.2$ 。两点联立可解均值方差（把 90 映到 $1.8\sigma + \mu$, 60 映到 $-1.2\sigma + \mu$, 得 $\sigma \approx 10$, $\mu \approx 72$ ）。

* 录取 2500 人占比 0.25, 对应右尾 0.25, 查表 $z \approx 0.674$, 分数 $\mu + 0.674\sigma \approx 72 + 0.674 \times 10 \approx 78.8$ 。

- ★★★★★☆ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(|X - \mu|)$ 。

* 设 $Y = X - \mu \sim N(0, \sigma^2)$ 。 $E|Y| = 2 \int_0^\infty y \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-y^2/(2\sigma^2)} dy$ (偶对称, 乘 2 取正半轴)。

* 令 $t = y^2/(2\sigma^2)$, 则 $y = \sigma\sqrt{2t}$, $dy = \sigma \frac{1}{\sqrt{2t}} dt$ 。代入得

$$E|Y| = \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_0^\infty \sigma\sqrt{2t} e^{-t} \sigma \frac{1}{\sqrt{2t}} dt = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_0^\infty e^{-t} dt = \sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

* 这对应“半正态分布”的期望：把正态折半取绝对值后，均值为 $\sigma\sqrt{2/\pi}$ ，直观上“保留右半边的平均幅度”。

2.6 随机变量函数的分布

主要内容：随机变量变换公式，单调与非单调情形，CDF 法，对数正态分布。

• 知识点：

- 单调可逆变换: $Y = g(X)$ 且 g 单调, 密度 $f_Y(y) = f_X(x) \left| \frac{dx}{dy} \right|$, 本质是把 $P(y < Y < y + dy)$ 换回 x 轴长度。

- 非单调: 用分布函数法 $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$, 按区间拆分 X 的解集, 再对每段求概率 (或对密度积分), 最后求得密度。

- 对数正态: 若 $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 X 为对数正态; 其密度由链式变换得到, 用于“正值且相对乘性波动”的场景。

• 典型例题：

- ★★★☆☆ $X \sim U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 求 $Y = \cos X$ 的密度。
 - * Y 取值 $(0, 1]$, 因 $\cos$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上非单调。因此, 先求分布函数: $P(Y \leq y) = P(\cos X \leq y) = P(X \geq \arccos y)$ 。
 - * 对 $0 < y < 1$, 有 $F_Y(y) = \frac{\frac{\pi}{2} - \arccos y}{\pi}$ 。求导:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \cdot 1 = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}} = \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, \quad 0 < y < 1,$$

其他位置为 0。

2.7 分布的其他特征数

主要内容: k 阶原点矩/中心矩, 变异系数, 分位数/中位数, 偏度, 峰度。

- 知识点:
 - 原点矩 $\mu'_k = E(X^k)$, 中心矩 $\mu_k = E[(X - E(X))^k]$ 。含义: 原点矩是“直接的 k 次方平均”, 中心矩是“以均值为中心的 k 次方平均”, 用来量化幅度与分布形状。
 - 变异系数: $CV = \frac{\sigma}{|E(X)|}$, 量纲无关的离散度, 可比较不同单位或量级的波动, 如比较“身高相对波动”与“体重相对波动”。
 - 分位数/中位数: 分布函数到概率轴的反函数; 中位数 m 使 $P(X \leq m) = 0.5$, 直观是“把概率一刀切成两半”的位置。
 - 偏度系数: $\gamma_1 = \frac{E[(X - E(X))^3]}{\sigma^3}$, 度量左右偏斜: 正偏意味着右尾更长 (如收入分布), 负偏意味着左尾更长。
 - 峰度系数: $\gamma_2 = \frac{E[(X - E(X))^4]}{\sigma^4} - 3$ (超额峰度), 描述峰尖和尾厚: 正值 = 尖峰厚尾 (极端值更可能, 如金融收益), 负值 = 平顶短尾 (更集中, 极端更少)。
- 典型例题:
 - ★★★☆☆ $X \sim U(a, b)$ 。求 $\mu'_k = E(X^k)$, $\mu_k = E[(X - EX)^k]$ ($k = 1, 2, 3, 4$), 并求偏度、峰度。
 - * $E(X^k) = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^k dx = \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{(k+1)(b-a)}$ 。
 - * $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$ 。
 - * 中心矩: $\mu_1 = 0$; $\mu_2 = \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$; $\mu_3 = 0$ (对称); $\mu_4 = \frac{(b-a)^4}{80}$ 。
 - * 偏度: $\gamma_1 = 0$ (对称分布)。峰度: $\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3 = \frac{(b-a)^4/80}{[(b-a)^2/12]^2} - 3 = -1.2$ 。

第三章 多维随机变量及其分布

3.1 多维随机变量及其联合分布

主要内容: 联合分布函数、联合分布列、联合密度、常见多维分布 (重点: 二元正态的基本形状与独立性条件)。

- 知识点:
 - 联合分布函数: $F_{X,Y}(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y)$, 随 x, y 非减; $\lim_{x \rightarrow -\infty \text{ 或 } y \rightarrow -\infty} F = 0$, $\lim_{x, y \rightarrow +\infty} F = 1$ 。
 - 离散联合分布列: $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$, $p_{ij} \geq 0$, $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$ 。
 - 联合密度: $f_{X,Y}(x,y) \geq 0$, $\iint f = 1$, 矩形概率 $P(a < X \leq b, c < Y \leq d) = \int_c^d \int_a^b f(x,y) dx dy$ 。
 - 二元正态 (常考点): (X, Y) 若联合正态, 则任一线性组合仍正态; 协方差为 0 时推出独立 (这是联合正态的特殊性质)。密度形状呈“椭圆等高线”。
- 典型例题:
 - ★★★☆☆ 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度为 $p(x,y) = \begin{cases} k, & 0 < x^2 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。
 - 1) 求常数 k 。2) 求 $P(X > 0.5)$ 与 $P(Y < 0.5)$ 。

- * 归一化: $1 = \int_0^1 \int_{x^2}^x k dy dx = k \int_0^1 (x - x^2) dx = k [\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3]_0^1 = k \cdot \frac{1}{6} \Rightarrow k = 6$ 。
- * $P(X > 0.5) = \int_{0.5}^1 \int_{x^2}^x 6 dy dx = \int_{0.5}^1 6(x - x^2) dx = [3x^2 - 2x^3]_{0.5}^1 = 1 - 0.5 = \frac{1}{2}$ 。
- * $P(Y < 0.5)$: 先固定 y , 约束给出 $y < x$ 且 $x^2 < y \Rightarrow y < x < \sqrt{y}$ 。因此

$$P(Y < 0.5) = \int_0^{0.5} \int_{x=y}^{\sqrt{y}} 6 dx dy = 6 \int_0^{0.5} (\sqrt{y} - y) dy = 6 \left[\frac{2}{3} y^{3/2} - \frac{1}{2} y^2 \right]_0^{0.5} = \sqrt{2} - \frac{3}{4} = \frac{4\sqrt{2}-3}{4}.$$

- ★★☆☆☆ 设 $Y \sim \text{Exp}(1)$ 。定义 $X_k = \begin{cases} 0, & Y \leq k \\ 1, & Y > k \end{cases}, k = 1, 2$ 。求 (X_1, X_2) 的联合分布列 (做成表格)。

- * 分段概率: $P(Y > 1) = e^{-1}, P(Y > 2) = e^{-2}$, 且 $Y \leq 1 \Rightarrow (X_1, X_2) = (0, 0); 1 < Y \leq 2 \Rightarrow (1, 0); Y > 2 \Rightarrow (1, 1)$, 状态 $(0, 1)$ 不可能。

- * 表格:

X_1	X_2	概率
0	0	$1 - e^{-1}$
1	0	$e^{-1} - e^{-2}$
1	1	e^{-2}
0	1	0

3.2 边际分布与随机变量的独立性

主要内容: 边际分布 (分布列/密度/分布函数) 求法, 独立性判别 (离散/连续)。

- 知识点:

- 边际分布: 离散 $p_X(x_i) = \sum_j p_{ij}$, 连续 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy$, 分布函数 $F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F_{X,Y}(x,y)$; Y 同理。
- 独立性判别: 离散看 $p_{ij} \stackrel{?}{=} p_X(x_i)p_Y(y_j)$; 连续看 $f_{X,Y}(x,y) \stackrel{?}{=} f_X(x)f_Y(y)$ (在定义域内)。联合正态时协方差为 0 等价于独立; 一般情形零协方差不代表独立, 但独立一定协方差为 0。

- 典型例题:

- ★★☆☆☆ 设平面区域 D 由曲线 $y = 1/x$ 与直线 $y = 0, x = 1, x = e^2$ 围成, (X, Y) 在 D 上均匀分布。求 X 的边际密度。

- * 区域面积: $S = \int_{x=1}^{e^2} \int_{y=0}^{1/x} dy dx = \int_1^{e^2} \frac{1}{x} dx = 2$, 故联合密度为 $1/2$ (区域内常数)。

- * 边际: $f_X(x) = \int_0^{1/x} \frac{1}{2} dy = \frac{1}{2x}$, 定义域 $1 < x < e^2$, 其余为 0。

- ★★☆☆☆ 判断独立性:

$$1) p(x, y) = \frac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)}, -\infty < x, y < \infty.$$

- * 可拆成 $[\frac{1}{\pi(1+x^2)}] \cdot [\frac{1}{\pi(1+y^2)}]$, 即 $f_X f_Y$, 故独立。

$$2) p(x, y) = \begin{cases} 24xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < x+y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

- * 先算边际: $f_X(x) = \int_0^{1-x} 24xy dy = 12x(1-x)^2, f_Y(y) = \int_0^{1-y} 24xy dx = 12y(1-y)^2$ 。

- * 若独立, 应有 $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$, 显然原密度不等于 $12x(1-x)^2 \cdot 12y(1-y)^2$, 故不独立 (也可用任一点代入对比)。

3.3 多维随机变量函数的分布

主要内容: 多维离散函数分布、最大最小的分布、卷积 (连续/离散)、变量变换与雅可比。

- 知识点:

- 离散卷积: $P(X+Y = k) = \sum_i P(X = i)P(Y = k-i)$; 连续卷积: $f_{X+Y}(z) = \int f_X(x)f_Y(z-x)dx$ 。
- 变量变换: $(U, V) = g(X, Y)$ 可逆时, $f_{U,V}(u,v) = f_{X,Y}(x,y) \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right|$, 先找映射域, 再乘雅可比。

- 几何法：对简单区域，直接在新变量区域画图积分，有时比公式更直观。
- 典型例题：
 - ★★☆☆☆ 独立同分布 (X, Y) ，求 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布列。
 - 1) X 为 0-1 分布 ($P(X=1)=0.5$)。
 - * $P(Z=0) = P(X=0, Y=0) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$; $P(Z=1) = 1 - 0.25 = 0.75$ 。
 - 2) $X \sim \text{Ge}(p)$, $P(X=k) = (1-p)^{k-1}p$, $k \geq 1$ 。
 - * $F_X(k) = 1 - (1-p)^k$, 故 $F_Z(k) = F_X(k)^2$, $P(Z=k) = F_Z(k) - F_Z(k-1)$ 。
 - * 展开: $P(Z=k) = [1 - (1-p)^k]^2 - [1 - (1-p)^{k-1}]^2 = (1-p)^{k-1}[1 - (1-p)][2 - (1-p)^{k-1} - (1-p)^k]$, 整理即可求任意 k 。
 - ★★★★★☆ (X, Y) 的联合密度 $p(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。求 (1) $Z = \frac{X+Y}{2}$ 的密度; (2) $Z = Y - X$ 的密度。
 - * 变换法 (核心步骤): 设 $U = X+Y, V = Y-X$, 反变换 $X = \frac{U-V}{2}, Y = \frac{U+V}{2}$, Jacobi 行列式 $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{2}$ 。
 - 定义域映射: $x > 0, y > 0 \Rightarrow U > 0$ 且 $-U < V < U$ (因为 $X > 0 \Rightarrow U > V$, $Y > 0 \Rightarrow U > -V$)。
 - 联合密度: $f_{U,V}(u, v) = e^{-u} \cdot \frac{1}{2}$, 域内 $u > 0, -u < v < u$, 域外 0。
 - (1) 先求 f_U : $f_U(u) = \int_{-u}^u \frac{1}{2} e^{-u} dv = u e^{-u}, u > 0$ 。再令 $z = u/2$, 换元时 $u = 2z, du = 2dz$, 所以 $f_Z(z) = f_U(2z) \cdot 2 = (2z) e^{-2z} \cdot 2 = 4z e^{-2z}$ (注意要连同 $du = 2dz$ 一起乘进去, 否则会少一倍。这里本质也是一个 1×1 的雅可比行列式)。
 - (2) $f_V(v) = \int_{|v|}^{\infty} \frac{1}{2} e^{-u} du = \frac{1}{2} e^{-|v|}, -\infty < v < \infty$ 。
 - * 也可使用几何积分法:
 - (1) 令 $z > 0$, 条件 $\frac{X+Y}{2} \leq z$ 等价于 $x+y \leq 2z, x > 0, y > 0$ 。面积积分:

$$F_Z(z) = \int_0^{2z} \int_0^{2z-x} e^{-(x+y)} dy dx = \int_0^{2z} e^{-x} [1 - e^{-(2z-x)}] dx,$$
 展开积分可得 $F_Z(z) = 1 - (2z+1)e^{-2z}$, 再求导得到 $f_Z(z) = 4ze^{-2z}$ 。
 - (2) 若 $v \geq 0$, 条件 $Y-X \leq v$ 等价于 $y \leq x+v$, 且 $x, y > 0$ 。积分:

$$F_V(v) = \int_0^{\infty} \int_0^{x+v} e^{-(x+y)} dy dx = 1 - e^{-v} (1 + \frac{v}{2}),$$
 对 $v < 0$ 类似可求得分布函数。最后对 F 求导即可得 $f_V(v) = \frac{1}{2} e^{-|v|}$, 与变换法一致。
 - ★★★★★☆☆ 某商品每周的需求量是独立的, 单周密度 $p_1(t) = \begin{cases} te^{-t}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$ 。求两周需求量密度 $p_2(x)$ 、三周需求量密度 $p_3(x)$ 。
 - * 方法 1 (伽马分布): p_1 形如 $t^{\alpha-1} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}} e^{-t/\beta}$, 这里 $\alpha = 2, \beta = 1$, 即 $\text{Ga}(2, 1)$ 。独立同分布伽马的和仍是伽马, 形状参数相加、尺度不变: 两周 $\Rightarrow \text{Ga}(4, 1)$, 密度 $p_2(x) = \frac{1}{\Gamma(4)} x^{4-1} e^{-x} = \frac{x^3}{6} e^{-x}$; 三周 $\Rightarrow \text{Ga}(6, 1)$, $p_3(x) = \frac{1}{\Gamma(6)} x^{6-1} e^{-x} = \frac{x^5}{120} e^{-x}$ 。
 - * 方法 2 (卷积方法计算):
 - 两周: $p_2(x) = \int_0^x p_1(t) p_1(x-t) dt = \int_0^x t e^{-t} (x-t) e^{-(x-t)} dt = e^{-x} \int_0^x t(x-t) dt = e^{-x} \frac{x^3}{6}$ 。
 - 三周: $p_3(x) = \int_0^x p_2(t) p_1(x-t) dt = \int_0^x \frac{t^3}{6} e^{-t} \cdot (x-t) e^{-(x-t)} dt = e^{-x} \frac{1}{6} \int_0^x t^3 (x-t) dt = e^{-x} \frac{x^5}{120}$ 。
 - * 这里可以看出, 卷积公式 $f_{X+Y}(z) = \int f_X(x) f_Y(z-x) dx$ 可逐次滚动, 验证了“伽马形状参数可加”的结论。
 - ★★★★★☆☆ 设 X 与 Y 相互独立。求 $Z = X/Y$ 的密度。
 - 1) $X \sim U(0, 1), Y \sim \text{Exp}(1)$ 。

- * 取变换 $(U, V) = (X/Y, Y)$, 反变换 $X = UV, Y = V$, 雅可比 $|J| = \left| \det \begin{pmatrix} v & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = v$.
- * 联合密度: $f_{U,V}(u, v) = 1 \cdot e^{-v} \cdot v$, 域: $0 < u < 1/v$ (因 $0 < X < 1$) 且 $v > 0$.
- * 边际 $f_Z(u) = \int_0^{1/u} v e^{-v} dv = 1 - (1 + 1/u)e^{-1/u}$, $u > 0$.
- 2) $X \sim \text{Exp}(\lambda_1), Y \sim \text{Exp}(\lambda_2)$.
 - * 同样设 $U = X/Y, V = Y$, 反变换如上, 雅可比 v .
 - * 联合密度: $f_{U,V}(u, v) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 uv} \cdot \lambda_2 e^{-\lambda_2 v} \cdot v$, $u > 0, v > 0$.
 - * 边际: $f_Z(u) = \int_0^\infty \lambda_1 \lambda_2 v e^{-(\lambda_1 u + \lambda_2)v} dv = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_1 u + \lambda_2)^2}$, $u > 0$.
- ★★★★★ X_1, X_2 独立同分布, 密度 $p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. 求 $Z = \max\{X_1, X_2\} - \min\{X_1, X_2\}$ 的分布.
 - * 思路: $Z = |X_1 - X_2|$, 先求差 $W = X_1 - X_2$ 的密度, 进一步即可得到 Z .
 - * 求 f_W :
 - 对给定 $w > 0$, 有 $W = w \Rightarrow X_1 = X_2 + w$, 必须满足 $0 < x_2 < 1$ 且 $0 < x_2 + w < 1$, 即 $w < x_1 < 1, 0 < x_2 < 1 - w$. 用卷积公式 $f_W(w) = \int f_{X_1}(x) f_{X_2}(x - w) dx$, 积分范围 $x \in [w, 1]$.
 - 列式: $f_W(w) = \int_w^1 2x \cdot 2(x - w) dx$, 前一因子来自 X_1 的密度, 后一因子来自 X_2 的密度. 积分得 $f_W(w) = \frac{4}{3} - 2w + \frac{2}{3}w^3$, $0 < w < 1$; 负半轴对称 $f_W(-w) = f_W(w)$, 其余为 0.
 - * 求 f_Z : $Z = |W|$, 因此 $f_Z(z) = f_W(z) + f_W(-z) = 2f_W(z)$, $z > 0$, 得到 $f_Z(z) = \frac{4}{3}z^3 - 4z + \frac{8}{3}$, $0 < z < 1$, 域外 0.
 - * 积分得分布函数 $F_Z(z) = \int_0^z f_Z(t) dt = \frac{8}{3}z - 2z^2 + \frac{1}{3}z^4$, $0 < z < 1$, 验证: 有 $F_Z(0) = 0, F_Z(1) = 1$.

3.4 多维随机变量的特征数

主要内容: 期望向量, 协方差/相关系数, 协方差矩阵, 线性变换下的运算规则.

- 知识点:
 - 协方差: $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$, 刻画“线性同涨同跌”; 对称, $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$.
 - 相关系数: $\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1]$, 量纲无关.
 - 方差分解: $\text{Var}(X \pm Y) = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 \pm 2\text{Cov}(X, Y)$.
- 典型例题:
 - ★★★★★☆☆ (X, Y) 在以 $(0, 1), (1, 0), (1, 1)$ 为顶点的三角形区域内均匀分布. 求 $E(X + Y)$, $\text{Var}(X + Y)$.
 - * 先把区域说清楚: 直角三角形, 底边在 x 轴从 0 到 1, 高在 y 轴从 0 到 1, 斜边是 $x + y = 1$. 面积 $S = \frac{1}{2}$, 故联合密度常数为 2.
 - * 边际: $f_X(x) = \int_{1-x}^1 2 dy = 2x$ ($0 < x < 1$), $f_Y(y) = \int_{1-y}^1 2 dx = 2y$ (对称).
 - * 期望: $E(X) = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}$, $E(Y) = \frac{2}{3}$, 故 $E(X + Y) = \frac{4}{3}$.
 - * $E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx = \frac{1}{2}$, $E(Y^2) = \frac{1}{2}$. $E(XY) = \int_0^1 \int_{1-x}^1 2xy dy dx = \int_0^1 2x \left[\frac{1}{2}(1^2 - (1-x)^2) \right] dx = \int_0^1 x[1 - (1 - 2x + x^2)] dx = \int_0^1 (2x^2 - x^3) dx = \frac{5}{12}$.
 - * 协方差: $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{5}{12} - \frac{4}{9} = -\frac{1}{36}$.
 - * 方差: $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}$, 同理 $\text{Var}(Y) = \frac{1}{18}$. 方差分解: $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{18} + \frac{1}{18} + 2(-\frac{1}{36}) = \frac{1}{18}$.
 - ★★★★★★ 系统寿命: n 个独立部件, $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$.
 - 1) 串联系统 (任一损坏即停): $T = \min\{X_i\}$.
 - * 分析: 因为独立指数的“最小值”服从参数为各自参数和的指数, 直观是“所有部件都在同时倒计时, 最快的那个先触发”, 故 $T \sim \text{Exp}(n\lambda)$, $E(T) = \frac{1}{n\lambda}$ (也可由 $P(T > t) = P(\text{全部} > t) = e^{-\lambda t \cdot n}$ 推出).
 - 2) 并联系统 (至少有一个在工作): $T = \max\{X_i\}$.
 - * 分布函数: $F_T(t) = P(\text{全部} \leq t) = [1 - e^{-\lambda t}]^n$ (每个部件在 t 前坏掉的概率是 $1 - e^{-\lambda t}$).

- * 密度: $f_T(t) = \frac{d}{dt}F_T(t) = n\lambda e^{-\lambda t}[1 - e^{-\lambda t}]^{n-1}$ 。
- * 计算期望: (注意期望可表达为生存函数的积分)

$$E(T) = \int_0^\infty P(T > t)dt = \int_0^\infty (1 - [1 - e^{-\lambda t}]^n)dt.$$

用二项式定理展开 $[1 - e^{-\lambda t}]^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k e^{-k\lambda t}$, 因此

$$1 - [1 - e^{-\lambda t}]^n = \sum_{k=1}^n C_n^k (-1)^{k+1} e^{-k\lambda t}.$$

逐项积分: $\int_0^\infty e^{-k\lambda t} dt = \frac{1}{k\lambda}$, 得到

$$E(T) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{C_n^k}{k\lambda}.$$

- ★★★★★☆ $X_i \sim U(0, \theta)$ 独立同分布, $Y = \max\{X_i\}$, $Z = \min\{X_i\}$ 。求 $E(Y)$, $E(Z)$ 。
- * Y : $F_Y(y) = P(\text{全部} \leq y) = (\frac{y}{\theta})^n$ ($0 < y < \theta$), 密度 $f_Y(y) = \frac{d}{dy}F_Y(y) = \frac{n}{\theta}(\frac{y}{\theta})^{n-1}$ 。积分得 $E(Y) = \int_0^\theta y f_Y(y) dy = \frac{n\theta}{n+1}$ 。
- * Z : $P(Z > z) = P(\text{全部} > z) = [1 - \frac{z}{\theta}]^n$, 对 $z \in (0, \theta)$; 密度 $f_Z(z) = \frac{d}{dz}(1 - [1 - \frac{z}{\theta}]^n) = \frac{n}{\theta}[1 - \frac{z}{\theta}]^{n-1}$ 。积分得 $E(Z) = \int_0^\theta z f_Z(z) dz = \frac{\theta}{n+1}$ 。
- ★★☆☆☆ 已知 $E(X) = -2$, $E(Y) = 2$, $\sigma_X = 1$, $\sigma_Y = 2$, $\rho = -0.5$ 。估计 $P(|X+Y| \geq 6)$ 的上界。
- * $\text{Cov} = \rho\sigma_X\sigma_Y = -1$, $\text{Var}(X+Y) = 1^2 + 2^2 + 2(-1) = 3$ 。切比雪夫: $P(|X+Y - E(X+Y)| \geq 6 - 0) = P(|X+Y| \geq 6) \leq \frac{3}{6^2} = \frac{1}{12}$ 。
- ★★★★★☆☆ 任意两两相关系数都为 ρ 的 $X_1, \dots, X_n$ 。证明 $\rho \geq -\frac{1}{n-1}$ 。
- * 取 $S = \sum_{i=1}^n X_i$, 展开方差:

$$\text{Var}(S) = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 + 2\rho \sum_{i < j} \sigma_i \sigma_j.$$

把交叉项写成“根号方差的乘积”是为了后面放缩: $\sigma_i \sigma_j = \sqrt{\sigma_i^2} \sqrt{\sigma_j^2}$ 。

- * 放缩思路: 对每一对 (i, j) , 有 $2\sigma_i \sigma_j \leq \sigma_i^2 + \sigma_j^2$ 。因此

$$2\rho \sigma_i \sigma_j \geq 2\rho \frac{\sigma_i^2 + \sigma_j^2}{2} = \rho(\sigma_i^2 + \sigma_j^2) \quad (\rho \leq 1).$$

把所有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 对求和, 会使每个 σ_i^2 被加了 $(n-1)$ 次:

$$2\rho \sum_{i < j} \sigma_i \sigma_j \geq \rho(n-1) \sum_{i=1}^n \sigma_i^2.$$

- * 代回原式:

$$\text{Var}(S) \geq \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 + \rho(n-1) \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 = [1 + (n-1)\rho] \sum_{i=1}^n \sigma_i^2.$$

方差非负, 且 $\sum \sigma_i^2 > 0$, 故 $1 + (n-1)\rho \geq 0 \Rightarrow \rho \geq -\frac{1}{n-1}$ 。

3.5 条件分布与条件期望

主要内容：条件分布/条件密度，条件期望，重期望公式，连续版全概率，方差分解。

- 知识点：

- 条件分布：离散 $P(X = x | Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)}$ ；连续 $f_{X|Y}(x | y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}$ 。
- 重期望（迭代期望）： $E(X) = E[E(X | Y)]$ ，对应全概率在期望层面的展开。
- 方差分解公式： $\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X | Y)] + \text{Var}(E[X | Y])$ 。

- 典型例题：

- ★★★☆☆ 设 X 是一天内出生总数， Y 是其中男婴数。联合分布：

$$P(X = n, Y = m) = e^{-14} \frac{7.14^m 6.86^{n-m}}{m!(n-m)!}, \quad m = 0, 1, \dots, n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

求条件分布列 $P(Y = m | X = n)$ 。

* 先求 X 的边际：对给定 n ,

$$P(X = n) = \sum_{m=0}^n e^{-14} \frac{7.14^m 6.86^{n-m}}{m!(n-m)!} = e^{-14} \frac{1}{n!} \sum_{m=0}^n C_n^m 7.14^m 6.86^{n-m} = e^{-14} \frac{(7.14 + 6.86)^n}{n!}.$$

实际上，这正是均值 14 的泊松分布的标准形式，故 $X \sim \text{Pois}(14)$ 。

* 再求条件分布：

$$P(Y = m | X = n) = \frac{P(X = n, Y = m)}{P(X = n)} = \frac{e^{-14} \frac{7.14^m 6.86^{n-m}}{m!(n-m)!}}{e^{-14} \frac{14^n}{n!}} = \frac{n!}{m!(n-m)!} \left(\frac{7.14}{14}\right)^m \left(\frac{6.86}{14}\right)^{n-m}.$$

识别为二项分布 $b(n, 0.51)$ ，所以 $P(Y = m | X = n) = C_n^m (0.51)^m (0.49)^{n-m}$, $m = 0, 1, \dots, n$ 。

- ★★★☆☆ X, Y 独立同分布，在下列两种情况下求 $P(X = k | X + Y = m)$ 。

1) $X, Y \sim \text{Ge}(p)$ 。

* 联合： $P(X = k, X + Y = m) = P(X = k)P(Y = m - k) = (1 - p)^{k-1}p \cdot (1 - p)^{m-k-1}p$, $k = 1, \dots, m - 1$ 。

* 边际： $P(X + Y = m) = \sum_{k=1}^{m-1} (1 - p)^{m-2}p^2 = (m - 1)(1 - p)^{m-2}p^2$ （实际上，这就是 $\text{Nb}(r = 2, p)$ 的分布列）。

* 条件： $P(X = k | X + Y = m) = \frac{(1 - p)^{m-2}p^2}{(m - 1)(1 - p)^{m-2}p^2} = \frac{1}{m - 1}$ ，在 $k = 1, \dots, m - 1$ 上均匀。

2) $X, Y \sim b(n, p)$ 。

* 联合： $P(X = k, X + Y = m) = P(X = k)P(Y = m - k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \cdot C_n^{m-k} p^{m-k} (1 - p)^{n-m+k}$ 。

* 边际： $P(X + Y = m) = C_{2n}^m p^m (1 - p)^{2n-m}$ （因为两独立二项之和是参数 $2n, p$ 的二项）。

* 条件： $P(X = k | X + Y = m) = \frac{C_n^k C_n^{m-k}}{C_{2n}^m}$, $k = 0, \dots, m$ ，恰是超几何分布（从 $2n$ 次试验中已知有 m 次成功，问前 n 次里有多少成功）。

第四章 大数定律与中心极限定理

4.1 随机变量序列的两种收敛性

- 知识点：
- 典型例题：

4.2 特征函数

- 知识点：
- 典型例题：

4.3 大数定律

- 知识点:
- 典型例题:

4.4 中心极限定理

- 知识点:
- 典型例题:

第五章 统计量及其分布

5.1 总体与样本

- 知识点:
- 典型例题:

5.3 统计量及其分布

- 知识点:
- 典型例题:

5.4 三大抽样分布

- 知识点:
- 典型例题:

第六章 参数估计

6.1 点估计的概念与无偏性

- 知识点:
- 典型例题:

6.2 矩估计及相合性

- 知识点:
- 典型例题:

6.3 最大似然估计与 EM 算法

- 知识点:
- 典型例题:

6.6 区间估计

- 知识点:
- 典型例题:

第七章 假设检验

7.2 正态总体参数假设检验

- 知识点:
- 典型例题:

7.4 似然比检验与分布拟合检验

- 知识点:
- 典型例题: