

华东理工大学

复变函数与积分变换作业 (第5册)

班级_____学号_____姓名_____任课教师_____

第九次作业

教学内容: 5.1 孤立奇点 5.2.1 留数的定义 5.2.2 极点处留数的计算

1. 填空题:

(1) 函数 $f(z) = \frac{1}{e^z - (1+i)}$ 的全部孤立奇点是 $\frac{1}{2} \ln 2 + i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi), k = 0, \pm 1, \dots$

(2) $z=0$ 是 $\frac{1}{\sin z - z}$ 的 三 级极点.

(3) $z=-2$ 是 $\frac{z^3-8}{(z^2-4)^3}$ 的 三 级极点.

(4) 若 $f(z)$ 在 z_0 点解析, z_0 是 $g(z)$ 的本性极点, z_0 是 $f(z) \cdot g(z)$ 的 本性 奇点,

是 $\frac{f(z)}{g(z)}$ 的 本性 奇点.

(5) $\text{Res}[z \cos \frac{1}{z}, 0] = \frac{1}{2}$

2. 指出下列函数的奇点及其类型 (不考虑 ∞ 点), 若是极点, 指出它的级.

(1) $\frac{z^{2n}}{1+z^n};$

解: 由 $z^n + 1 = 0, z^n = -1$, 得 $z_k = e^{\frac{(2k+1)\pi}{n}i} (k = 0, 1, \dots, n-1)$ 为原式一级极点.

(2) $\frac{\ln(1+z)}{z}$

解 1: $\ln(1+z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1}, 0 < |z| < 1, \frac{\ln(1+z)}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{n+1}$ 无负幂项, 故 $z=0$

为其可去奇点。

解 2: $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\ln(1+z)}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{1+z} = 1$, 故 $z=0$ 为可去奇点。

(3) $e^{\frac{z}{1-z}}$

解: 由于 $e^{\frac{z}{1-z}} = e^{\frac{z-1+1}{1-z}} = e^{-1} e^{\frac{1}{1-z}} = \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(z-1)^n}$, 所以 $z=1$ 为本性奇点。

(4) $\frac{\sin z}{z^3}$;

解: $z=0$ 为 $\sin z$ 的一级零点, 而 $z=0$ 为 z^3 的三级零点, 故 $z=0$ 为 $\frac{\sin z}{z^3}$ 的二级极点。

$\lim_{z \rightarrow 0} z^2 \frac{\sin z}{z^3} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1 \neq 0$, 故 $z=0$ 为 $\frac{\sin z}{z^3}$ 的二级极点。

(5) $\frac{1}{z^2(e^z-1)}$;

解: 因 $e^z - 1 = z \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(n+1)!} = z(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{3!} + \dots)$, 故 $z=0$ 为 $\frac{1}{z^2(e^z-1)}$ 的三级极点, 而

$z = 2k\pi i, k = \pm 1, \pm 2, \dots$ 均为一级极点。

(6) $\frac{e^z \sin z}{z^2}$

解: 由于 $\frac{e^z \sin z}{z^2} = \frac{e^z(z - \frac{z^3}{3!} + \dots)}{z^2} = \frac{e^z(1 - \frac{z^2}{3!} + \dots)}{z}$

所以 $\lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{e^z \sin z}{z^2} = 1$, 因此 $z=0$ 是一级极点

3 证明: 如果 z_0 是 $f(z)$ 的 $m(m > 1)$ 级零点, 那么 z_0 是 $f'(z)$ 的 $m-1$ 级零点。

证明: z_0 是 $f(z)$ 的 $m(m > 1)$ 级零点, 可设 $f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$,

其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 点解析, 且 $\varphi'(z_0) \neq 0$,

$$f'(z) = m(z - z_0)^{m-1} \phi(z) + (z - z_0)^m \phi'(z)$$

$$\text{令 } \phi(z) = m\varphi(z) + (z - z_0)\varphi'(z),$$

$$\text{则 } f'(z) = (z - z_0)^{m-1} \phi(z),$$

因为 $\varphi(z)$ 在 z_0 点解析, 所以 $\phi(z)$ 也在 z_0 点解析, 且 $\varphi(z_0) \neq 0$, 所以

$$\phi(z_0) = m\varphi(z_0) \neq 0, \text{ 即 } z_0 \text{ 是 } f'(z) \text{ 的 } m-1 \text{ 级零点.}$$

4 求下列函数在各有限奇点的留数.

$$(1) \frac{1 - e^{2z}}{z^4};$$

$$\text{解: } \frac{1 - e^{2z}}{z^4} = \frac{1}{z^4} \left(-2z - \frac{4z^2}{2!} - \frac{8z^3}{3!} - \dots \right)$$

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = c_{-1} = -\frac{4}{3};$$

$$(2) \frac{\cos z}{z - i};$$

解: $z = i$ 为一级极点

$$\operatorname{Res}\left[\frac{\cos z}{z - i}, i\right] = \lim_{z \rightarrow i} (z - i) \frac{\cos z}{z - i} = \cos i = \cosh 1$$

$$(3) \frac{1}{(1 + z^2)^3};$$

解: $z = \pm i$ 为三级极点

$$\operatorname{Res}\left[\frac{1}{(1 + z^2)^3}, i\right] = \lim_{z \rightarrow i} \frac{d^2}{dz^2} [(z - i)^3 \frac{1}{(1 + z^2)^3}] = \frac{-3i}{16}$$

$$\operatorname{Res}\left[\frac{1}{(1 + z^2)^3}, -i\right] = \lim_{z \rightarrow -i} \frac{d^2}{dz^2} [(z + i)^3 \frac{1}{(1 + z^2)^3}] = \frac{3i}{16}$$

$$(4) z^2 \sin \frac{1}{z};$$

$$\text{解: } z^2 \sin \frac{1}{z} = z^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1},$$

$$\operatorname{Res}\left[z^2 \sin \frac{1}{z}, 0\right] = c_{-1} = -\frac{1}{6}$$

5. 判断 $e^{z+\frac{1}{z}}$ 的孤立奇点的类型，并求其留数.

解：函数 $e^{z+\frac{1}{z}}$ 有孤立奇点 $0, \infty$ ，而且在 $0 < |z| < +\infty$ 内有如下展开式：

$$\begin{aligned} e^{z+\frac{1}{z}} &= e^z e^{\frac{1}{z}} = \left(1 + z + \frac{1}{2!} z^2 + \frac{1}{3!} z^3 + \cdots\right) \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} \frac{1}{z^2} + \frac{1}{3!} \frac{1}{z^3} + \cdots\right) \\ &= \cdots + \left\{1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!3!} + \frac{1}{3!4!} + \cdots\right\} \frac{1}{z} + \cdots \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \operatorname{Res}[e^{z+\frac{1}{z}}, 0] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+1)!}$$

$$\operatorname{Res}[e^{z+\frac{1}{z}}, \infty] = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+1)!}$$

6. 设 $\varphi(z)$ 在 z_0 解析， z_0 为 $f(z)$ 的一级极点，且 $\operatorname{Res}[f(z), z_0] = A$ ，证明：

$$\operatorname{Res}[f(z)\varphi(z), z_0] = A\varphi(z_0)$$

证明：因为 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点，设 $f(z) = \frac{g(z)}{z-z_0}$ ， $g(z)$ 在 z_0 解析， $g(z_0) \neq 0$

$$\text{所以 } \operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{g(z)}{z - z_0} = g(z_0) = A$$

又由于 $\varphi(z)$ 在 z_0 解析所以 z_0 为 $f(z)\varphi(z)$ 的一级极点。

$$\operatorname{Res}[f(z)\varphi(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{g(z)\varphi(z)}{z - z_0} = A\varphi(z_0)$$

7. 已知 $z=0$ 是函数 $f(z)$ 的 n 级极点，证明 $\operatorname{Res}\left[\frac{f'(z)}{f(z)}, 0\right] = -n$.

证明：设 $f(z) = z^{-n}g(z)$ ， $g(z)$ 在 $z=0$ 解析，且 $g(0) \neq 0$ ，于是

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{-nz^{-n-1}g(z) + z^{-n}g'(z)}{z^{-n}g(z)} = \frac{-n}{z} + \frac{g'(z)}{g(z)}$$

$$\frac{g'(z)}{g(z)} \text{ 在 } z=0 \text{ 解析, 故 } \operatorname{Res}\left[\frac{f'(z)}{f(z)}, 0\right] = -n.$$

第十次作业

教学内容 5.2.3 留数定理; 5.2.4 函数在无穷远点的留数

1. 填空题

(1) $\cos z - \sin z$ 在 $z = \infty$ 的留数为 0.

(2) $\frac{2z}{3+z^2}$ 在 $z = \infty$ 的留数为 -2.

(3) $e^{\frac{1}{z^2}}$ 在 $z = \infty$ 的留数为 0.

(4) $\frac{e^z}{z^2-1}$ 在 $z = \infty$ 的留数为 $i \sin i$.

2 利用留数定理计算下列积分.

(1) $\oint_C \frac{1}{1+z^4} dz, \quad C: x^2 + y^2 = 2x;$

解: 被积函数有四个一级极点, $z_k = e^{\frac{2k\pi + \pi i}{4}} (k=0,1,2,3)$ 其中只有 $z_0 = e^{\frac{\pi i}{4}}, z_3 = e^{\frac{7\pi i}{4}}$

在 C 内

$$\oint_C \frac{1}{1+z^4} dz = 2\pi i [\operatorname{Res}\left(\frac{1}{1+z^4}, e^{\frac{\pi i}{4}}\right) + \operatorname{Res}\left(\frac{1}{1+z^4}, e^{\frac{7\pi i}{4}}\right)];$$

$$\begin{aligned} &= 2\pi i \left[\frac{1}{4z^3} \Big|_{z=e^{\frac{\pi i}{4}}} + \frac{1}{4z^3} \Big|_{z=e^{\frac{7\pi i}{4}}} \right] \\ &= 2\pi i \left[-\frac{\sqrt{2}}{8}(1+i) + \frac{\sqrt{2}}{8}(i-1) \right] \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \pi i. \end{aligned}$$

(2) $\oint_C \frac{3z^3+2}{(z-1)(z^2+9)} dz, \quad C: |z|=4;$

解：被积函数有三个一级极点， $z=1, z=\pm 3i$ ，且都在 C 内

$$\oint_C \frac{3z^3+2}{(z-1)(z^2+9)} dz, = 2\pi i [\operatorname{Res}(\frac{3z^3+2}{(z-1)(z^2+9)}, 1) + \operatorname{Res}(\frac{3z^3+2}{(z-1)(z^2+9)}, 3i) + \operatorname{Res}(\frac{3z^3+2}{(z-1)(z^2+9)}, -3i)]$$

$$= 2\pi i [\lim_{z \rightarrow 1} \frac{3z^3+2}{z^2+9} + \lim_{z \rightarrow 3i} \frac{3z^3+2}{(z-1)(z+3i)} + \lim_{z \rightarrow -3i} \frac{3z^3+2}{(z-1)(z-3i)}]$$

$$= 2\pi i [\frac{1}{2} + \frac{2-81i}{-18-6i} + \frac{2+18i}{-18+6i}] = 6\pi i$$

(3) $\oint_C \frac{\sin z}{z} dz, \quad C: |z| = \frac{3}{2};$

解： $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ ， $\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 1$ ，所以 $z=0$ 是 $\frac{\sin z}{z}$ 的可去奇点，则

$$\operatorname{Res}\left[\frac{\sin z}{z}, 0\right] = 0, \quad \oint_C \frac{\sin z}{z} dz = 0$$

(4) $\oint_C \frac{2\cos z}{(e+e^{-1})(z-i)^3} dz, \quad C: |z-i|=1;$

解：被积函数在 C 内有一个三级极点 $z=i$ 。由留数定理

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{2\cos z}{(e+e^{-1})(z-i)^3} dz &= 2\pi i [\frac{2\cos z}{(e+e^{-1})(z-i)^3}, i] \\ &= 2\pi i \cdot \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow i} \frac{d^2}{dz^2} [\frac{2}{(e+e^{-1})} \cdot (z-i)^3 \cdot \frac{\cos z}{(z-i)^3}] \\ &= \frac{2\pi i}{e+e^{-1}} [-\cos i] = -\pi i. \end{aligned}$$

3 计算下列积分， C 为正向圆周：

(1) $\oint_C \frac{z^{13}}{(z^2+5)^3(z^4+1)^2} dz, \quad C: |z|=3;$

解：函数 $\frac{z^{13}}{(z^2+5)^3(z^4+1)^2}$ 在 $|z|=3$ 的外部，除 ∞ 点外没有其他奇点，故

$$\oint_C \frac{z^{13}}{(z^2+5)^3(z^4+1)^2} dz = -2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \infty] = 2\pi i \operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2}, 0\right]$$

$$= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(1+5z^2)^3(1+z^4)^2}, 0\right] = 2\pi i$$

$$(2) \oint_{|z|=2} \frac{z^3}{1+z} e^{\frac{1}{z}} dz.$$

$$f(z) = \frac{z^3}{z+1} e^{\frac{1}{z}} = z^2 \frac{1}{1+\frac{1}{z}} e^{\frac{1}{z}}$$

$$= z^2 \left(1 - \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z^3} + \dots\right) \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \dots\right)$$

$$= z^2 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3z} + \frac{5}{24z^2} + \dots \quad (1 < |z| < \infty)$$

$$\text{所以 } \operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\frac{1}{3},$$

$$\oint_{|z|=2} \frac{z^3}{z+1} e^{\frac{1}{z}} dz = -\frac{2}{3} \pi i$$

$$(3) \oint_C \frac{2i}{z^2+2az-1} dz, a > 1, C: |z|=1$$

解: $|z|=1$ 内只有一个一级极点: $-a + \sqrt{a^2+1}$,

$$\oint_C \frac{2i}{z^2+2az-1} dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{2i}{z^2+2az-1}, -a + \sqrt{a^2+1}\right]$$

$$= 2\pi i \lim_{z \rightarrow -a + \sqrt{a^2+1}} \frac{2i}{2z+2a}$$

$$= -\frac{2\pi}{\sqrt{a^2+1}}$$