



离散数学

Discrete Mathematics

虞慧群

yhq@ecust.edu.cn

主讲老师：杨海

yanghai@ecust.edu.cn



合式公式(Well-Formed Formulas): 递归定义如下:

- (1) 命题常元和变元符号是合式公式;
- (2) 若A是合式公式, 则 $(\neg A)$ 是合式公式, 称为A的否定式;
- (3) 若A, B是合式公式, 则 $(A \vee B)$, $(A \wedge B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ 是合式公式;
- (4) 所有合式公式都是有限次使用(1), (2), (3)、(4)得到的符号串。

子公式 (subformulas): 如果X是合式公式A的一部分, 且X本身也是一个合式公式, 则称X为公式A的子公式。

公式举例：

$$(1) \ ((\neg p) \vee q) \rightarrow p;$$

$$(2) \ ((p \vee q) \wedge ((\neg p) \vee q));$$

$$(3) \ ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p));$$

$$(4) \ (((\neg p) \rightarrow p) \leftrightarrow p);$$

$$(5) \ (p \rightarrow (\perp \rightarrow r)).$$

例、如下符号串不是公式：

$$(1) \ ((p \vee \top;$$

$$(2) \ \neg r;$$

$$(3) \ ((r \vee X) \rightarrow q);$$

约定： (1) 最外层的括号可以省略；
(2) 联结词运算的优先次序（由高到底）为：

\neg

\wedge

\vee

$\rightarrow, \leftrightarrow$

目的为减少括号的数量。

例、 $\neg p \wedge \neg q$ 表示 $((\neg p) \wedge (\neg q))$;
 $\neg p \vee q$ 表示 $((\neg p) \vee q)$;

➤ $(A \rightarrow B)$ 不是合式公式，是一个公式模式，代表一类具体的公式

$$(p \rightarrow q)$$

$$((p \rightarrow q) \rightarrow (s \rightarrow r))$$

$$((p \vee r) \rightarrow (\neg q))$$

2、 公式的真值

概念

赋值，公式求值函数，真值表，等值式，重言式，
矛盾式，蕴含式

赋值 (指派, 解释) : 设 Σ 是命题变元集合, 则称函数 $v: \Sigma \rightarrow \{1, 0\}$ 是一个真值赋值。

A是一个公式, v是一个赋值, 则A在赋值v下的值, 记为 $v(A)$,有:

1、若A为命题变元符号p, 则 $v(A) = v(p)$;

2、若A为命题常元, 则

$$v(A) = \begin{cases} 1 & \text{若 } A = \top \\ 0 & \text{若 } A = \perp \end{cases}$$

3、若A为否定式($\neg B$)，则

$$v(A) = \begin{cases} 1 & \text{若 } v(B) = 0 \\ 0 & \text{若 } v(B) = 1 \end{cases}$$

4、若A为析取式($B \vee C$)，则

$$v(A) = \begin{cases} 1 & \text{若 } v(B) = 1 \text{ 或 } v(C) = 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

5、若A为析取式($B \wedge C$)，则

$$v(A) = \begin{cases} 1 & \text{若 } v(B) = 1 \text{ 且 } v(C) = 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

6、若A为蕴含式($B \rightarrow C$)，则

$$v(A) = \begin{cases} 0 & \text{若 } v(B) = 1 \text{ 且 } v(C) = 0 \\ 1 & \text{else} \end{cases}$$

7、若A为等价式($B \leftrightarrow C$)，则

$$v(A) = \begin{cases} 1 & \text{若 } v(B) = v(C) \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

成真赋值：当 $v(A)=1$ 时，称 v 满足 A ，记为 $v \models A$

成假赋值：当 $v(A)=0$ 时，称 v 不满足 A ，记为 $v \not\models A$

例、 $A=p \vee q$

$$v(p)=1, v(q)=0, \quad v(A)=1$$

$$v(p)=0, v(q)=0, \quad v(A)=0$$

真值表：公式 A 在其所有可能的赋值下所取真值的表，称为 A 的真值表。

➤ 若公式 A 中有 n 个不同变元 p_1, p_2, \dots, p_n ，那么 A 共有 2^n 种不同的赋值。

例、

公式 $(p \wedge q) \rightarrow r$

p	q	r	$(p \wedge q) \rightarrow r$
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	1
1	0	0	1
0	1	1	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	0	0	1

可满足的： 公式 A ，若 \exists 赋值 v ，使得 $v \models A$ ，则称 A 是可满足的。

不可满足的： 若 \forall 赋值 v ，使得 $v \not\models A$ ，则称 A 是不可满足的。

例、 $(p \wedge q) \rightarrow r$ 可满足的
 $(p \wedge \neg p)$ 不可满足的

扩充到公式集U

**v 满足U: 公式集U, 若 \exists 赋值 v , 使得对 \forall 公式 $A \in U$, 有 $v \models A$, 则称 v 为U的成真赋值。
否则, U是不可满足的。**

例、 $\{q \wedge \neg r, q \vee r\}$:

$\{p \rightarrow q, \neg q, p\}$:

重言式、矛盾式

重言式（永真式） 任意赋值 v ，有 $v \models A$

矛盾式（永假式） 任意赋值 v ，有 $v \not\models A$

例、 $(p \wedge \neg p)$
 $(p \vee \neg p)$

➤ **A是永真的当且仅当 $\neg A$ 是永假的。**

➤ **若A是永真的，则A是可满足的；反之不对。**

➤ **设A是公式，则A是矛盾式当且仅当A是不可满足的。**

证明： **A是矛盾式 $\Leftrightarrow \forall$ 赋值 v ，有 $v \not\models A$**

$\Leftrightarrow \forall$ 赋值 v ，有 $v(A)=0$

\Leftrightarrow 不存在赋值 v ，使得 $v(A)=1$

$\Leftrightarrow A$ 是不可满足的

等值式：若等价式 $A \leftrightarrow B$ 是重言式，则称 A 与 B 等值，记作 $A \Leftrightarrow B$ 。

注意：

- \Leftrightarrow 与 \leftrightarrow 是两个完全不同的 符号
- 用真值表可检查两个公式是否等值
- 基本等值式（见课本pp.17-18）

置换规则（置换定理）

设 X 是公式 A 的子公式， $X \Leftrightarrow Y$ 。将 A 中的 X （可以是全部或部分 X ）用 Y 来置换，所得到的公式 B ，则 $A \Leftrightarrow B$ 。

判断下列各组公式是否等值：

(1) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$

p	q	r	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

结论： $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$

等值式例题

(2) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$

p	q	r	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \rightarrow r$
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

结论： $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 不等值

基本等值式

双重否定律 $\neg\neg A \Leftrightarrow A$

幂等律 $A \vee A \Leftrightarrow A, A \wedge A \Leftrightarrow A$

交换律 $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A, A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$

结合律 $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C), (A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$

分配律 $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C),$
 $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

德摩根律 $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

吸收律 $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A, A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$

基本等值式

零律	$A \vee \top \Leftrightarrow \top, A \wedge \perp \Leftrightarrow \perp$
同一律	$A \vee \perp \Leftrightarrow A, A \wedge \top \Leftrightarrow A$
排中律	$A \vee \neg A \Leftrightarrow \top$
矛盾律	$A \wedge \neg A \Leftrightarrow \perp$
蕴涵等值式	$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$
等价等值式	$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
假言易位	$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$
等价否定等值式	$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$
归谬论	$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

特别提示：必须牢记这16组等值式，这是继续学习的基础

等值演算——由已知的等值式推演出新的等值式的过程。

证明两个公式等值

例2 证明 $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$

证 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee r) \quad (\text{蕴涵等值式, 置换规则})$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee r \quad (\text{结合律, 置换规则})$$

$$\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee r \quad (\text{德摩根律, 置换规则})$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r \quad (\text{蕴涵等值式, 置换规则})$$

3、范式

概念：

文字，析取范式，极小项，主析取范式，合取范式，极大项，主合取范式

文字 设 $A \in \Sigma$ （命题变元集），则 A 和 $\neg A$ 都称为命题符号 A 的文字，其中前者称为**正文字**，后者称为**负文字**。

析取范式

形如

$$A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n \quad (n \geq 1)$$

的公式称为析取范式，其中 $A_i (i=1, \dots, n)$ 是由文字组成的合取范式。

例：求 $\neg (P \vee Q) \leftrightarrow (P \wedge Q)$ 的析取范式。

极小项 文字的合取式称为极小项，其中公式中每个命题符号的文字都在该合取式中出现一次。

注：(1) n 个命题符号共有 2^n 个极小项。

(2)极小项的编码与性质（p.25）。

主析取范式

给定的命题公式的主析取范式是一个与之等价的公式，后者由极小项的析取组成。

例：求公式 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的主析取范式

定理：公式的真值表中真值为1的指派所对应的极小项的析取，即为此公式的主析取范式。

例：求 $P \rightarrow Q$ 的主析取范式

合取范式

形为

$$\mathbf{A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \ (n \geq 1)}$$

的公式称为合取范式，其中 $\mathbf{A_1, \dots, A_n}$ 都是由文字组成的析取式。

例：求 $\mathbf{(P \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow S}$ 的合取范式

极大项 文字的析取式称为极大项，其中公式中每个命题符号的文字都在该合取式中出现一次。

注：（1） n 个命题符号共有 2^n 个极大项。

（2）极大项的编码等性质（p.25）。

主合取范式 给定的命题公式的主合取范式是一个与之等价的公式，后者由极大项的合取组成。

定理：公式的真值表中真值为**0**的指派所对应的极大项的合取，即为此公式的主合取范式。

例：求 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$ 的主析取范式与主合取范式。

4、联结词的完备集

概念：

真值函数，异或，条件否定，与非，或非，联结词完备集

真值函数： 称 $F:\{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ 为 **n 元真值函数**.

$\{0,1\}^n = \{00\dots 0, 00\dots 1, \dots, 11\dots 1\}$, 包含 2^n 个长为 n 的0,1符号串.
共有 2^{2^n} 个 n 元真值函数.

1元真值函数

p	$F_0^{(1)}$	$F_1^{(1)}$	$F_2^{(1)}$	$F_3^{(1)}$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

2元真值函数

p q	$F_0^{(2)}$	$F_1^{(2)}$	$F_2^{(2)}$	$F_3^{(2)}$	$F_4^{(2)}$	$F_5^{(2)}$	$F_6^{(2)}$	$F_7^{(2)}$
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1
p q	$F_8^{(2)}$	$F_9^{(2)}$	$F_{10}^{(2)}$	$F_{11}^{(2)}$	$F_{12}^{(2)}$	$F_{13}^{(2)}$	$F_{14}^{(2)}$	$F_{15}^{(2)}$
0 0	1	1	1	1	1	1	1	1
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1

异或	$P \oplus Q \Leftrightarrow \neg (P \leftrightarrow Q)$
条件否定	$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg (P \rightarrow Q)$
与非	$P \uparrow Q \Leftrightarrow \neg (P \wedge Q)$
或非	$P \downarrow Q \Leftrightarrow \neg (P \vee Q)$

注：能构造多少联结词呢？

11个（二元以内）

联结词的完备集(Adequate Set of Connectives)

设 \mathbf{C} 是联结词的集合，若对于任意一个合式公式均存在一个与之等价的公式，而后者只含有 \mathbf{C} 中的联结词，则称 \mathbf{C} 是联结词的完备集。

例如：

- (1) $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 是联结词的完备集。
- (2) $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$, $\{\perp, \rightarrow\}$ 是联结词的完备集。
- (3) $\{\uparrow\}$ 是联结词的完备集。
- (4) $\{\neg\}$, $\{\vee\}$, $\{\wedge\}$, $\{\vee, \wedge\}$ 不是联结词的完备集。

5、推理理论

概念：

重言蕴含式，有效结论，P规则，T规则，CP规则，推理

重言蕴含式 当且仅当 $P \rightarrow Q$ 是一个重言式时，称 P 重言蕴含 Q ，记为 $P \Rightarrow Q$ 。

注意: (1) \Rightarrow 和 \rightarrow 含义的本质区别。

(2) 重言蕴含式也称为逻辑蕴含式。

证明 $P \Rightarrow Q$ 的方法：任给赋值 v

(1) 假设 $v(P)=1$, 推出 $v(Q)=1$, 或者

(2) 假设 $v(Q)=0$, 推出 $v(P)=0$ 。

例：求证： $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

常见的重言蕴含式(P.46)

推理定律——重言蕴涵式

- | | |
|--|-------------|
| 1. $A \Rightarrow (A \vee B)$ | 附加律 |
| 2. $(A \wedge B) \Rightarrow A$ | 化简律 |
| 3. $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$ | 假言推理 |
| 4. $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$ | 拒取式 |
| 5. $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$ | 析取三段论 |
| 6. $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$ | 假言三段论 |
| 7. $(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$ | 等价三段论 |
| 8. $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$ | 构造性二难 |
| $(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \Rightarrow B$ | 构造性二难(特殊形式) |
| 9. $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$ | 破坏性二难 |

每个等值式可产生两个推理定律

如, 由 $A \leftrightarrow \neg\neg A$ 可产生 $A \Rightarrow \neg\neg A$ 和 $\neg\neg A \Rightarrow A$