

华东理工大学

复变函数与积分变换作业本 (第3册)

班级_____学号_____姓名_____任课教师_____

第五次作业

教学内容: 3.1 复变函数积分概念 3.2 柯西积分定理

1. 计算积分 $\int_C (x - y + ix^2) dz$, 其中 C 为从原点到 $1+i$ 的直线段。

解: 积分曲线的方程为 $x=t, y=t$, 即 $z = x + iy = t + ti, t: 0 \rightarrow 1$, 代入原积分表达式, 得

$$\begin{aligned}\int_C (x - y + ix^2) dz &= \int_0^1 (t - t + it^2)(t + it)' dt \\ &= \int_0^1 it^2(1+i) dt = \frac{-1+i}{3} t^3 \Big|_0^1 = \frac{-1+i}{3}\end{aligned}$$

2. 计算积分 $\int_C e^z dz$, 其中 C 为从 0 到 1 再到 $1+i$ 的折线

解: (1) 从 0 到 1 的线段 C_1 方程为: $z = x + iy = x, x: 0 \rightarrow 1$,

从 1 到 $1+i$ 的线段 C_2 方程为: $z = x + iy = 1 + iy, y: 0 \rightarrow 1$,

代入积分表达式中, 得

$$\begin{aligned}\int_C e^z dz &= \int_{C_1} e^z dz + \int_{C_2} e^z dz = \int_0^1 e^x dx + \int_0^1 e^{1+iy} (1+iy)' dy \\ &= e^x \Big|_0^1 + ei \int_0^1 (\cos y + i \sin y) dy = e - 1 + ei(\sin y - i \cos y) \Big|_0^1 \\ &= e^{1+i} - 1\end{aligned}$$

3. 计算积分 $\oint_C |z| \bar{z} dz$, 其中 C 是由直线段 $-1 \leq x \leq 1, y=0$ 及上半单位圆周组成的正向闭曲线。

解: $C = C_1 + C_2$, C_1 表示为 $z = x + iy, (-1 \leq x \leq 1, y=0)$;

C_2 表示为 $z = x + iy = \cos \theta + i \sin \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$, $dz = (-\sin \theta + i \cos \theta) d\theta$,

$$\begin{aligned}\oint_C |z| \bar{z} dz &= \int_{C_1} |z| \bar{z} dz + \int_{C_2} |z| \bar{z} dz \\ &= \int_{-1}^1 |x| x dx + \int_0^\pi (\cos \theta - i \sin \theta)(-\sin \theta + i \cos \theta) d\theta \\ &= \pi i\end{aligned}$$

4. 设 $f(z)$ 在单连域 D 内解析, C 为 D 内任何一条正向简单闭曲线, 问

$$\oint_C \operatorname{Re}[f(z)] dz = \oint_C \operatorname{Im}[f(z)] dz = 0$$

是否成立, 如果成立, 给出证明; 如果不成立, 举例说明。

证: 未必成立。令 $f(z) = z, C: |z| = 1$, 则 $f(z)$ 在全平面上解析, 但是

$$\oint_C \operatorname{Re}[f(z)] dz = \int_0^{2\pi} \operatorname{Re}[e^{i\theta}] de^{i\theta} = \int_0^{2\pi} \cos \theta (-\sin \theta + i \cos \theta) d\theta = \pi i \neq 0$$

$$\oint_C \operatorname{Im}[f(z)] dz = \int_0^{2\pi} \operatorname{Im}[e^{i\theta}] de^{i\theta} = \int_0^{2\pi} \sin \theta (-\sin \theta + i \cos \theta) d\theta = -\pi \neq 0$$

5. 观察得出下列积分的值, 并说明理由。

$$(1) \oint_{|z|=1.5} e^z (z^2 + 1) dz \quad ;$$

解: 0 由于被积函数在复平面上处处解析, 由柯西积分定理知积分为零。

$$(2) \oint_{|z|=1.5} \frac{3z+5}{z^2+2z+3} dz \quad ;$$

解: 0。由于被积函数在 $|z| \leq 1.5$ 内处处解析, 由柯西积分定理知积分为零。

6. 沿下列指定曲线的正向计算积分 $\oint_C \frac{dz}{z(z^2+1)}$ 值:

$$(1) C: |z| = \frac{1}{2};$$

解: 原式

$$\begin{aligned} &= \oint_C \left[\frac{1}{z} - \frac{1}{2(z+i)} - \frac{1}{2(z-i)} \right] dz \\ &= 2\pi i - 0 - 0 = 2\pi i \end{aligned}$$

$$(2) C: |z+i| = \frac{1}{2};$$

$$\text{解: } \oint_C \frac{dz}{z(z^2+1)} = \oint_C \frac{1}{z} dz - \frac{1}{2} \oint_C \frac{1}{z-i} dz - \frac{1}{2} \oint_C \frac{1}{z+i} dz = 0 - 0 - \pi i = -\pi i$$

7. 设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 且不为零, C 为 D 内任何一条简单光滑闭曲线, 判断积

$$\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz \quad \text{是否为零? 说明理由。}$$

解: 等于零。因 $f(z)$ 在 D 内解析, 故 $f(z)$ 具有各阶导数且仍为解析函数, 从而 $f'(z)$ 在

D 内也解析, 又因在 D 内 $f(z) \neq 0$, 故 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 D 内解析, 从而在 C 上及 C 的内

部也解析, 于是由 Cauchy-Goursat 定理, $\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0$ 。

8. 设区域 D 为右半平面, z 为 D 内的圆周 $|z|=1$ 上的任意一点, 用在 D 内的任意一条曲线 C 连接原点与 z , 证明:

$$\operatorname{Re} \left[\int_0^z \frac{d\xi}{1+\xi^2} \right] = \frac{\pi}{4}$$

证明: 函数 $\frac{1}{1+\varepsilon^2}$ 在右半平面解析, 故从 0 到 z 沿任意曲线 C 的积分与路径无关, 积分路径换为先沿实轴从 0 到 1, 再沿圆周到 z 点。

$$\begin{aligned} \int_0^z \frac{d\varepsilon}{1+\varepsilon^2} &= \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^\theta \frac{ie^{i\eta}}{1+e^{2i\eta}} d\eta \\ &= \frac{\pi}{4} + \int_0^\theta \frac{i}{2\cos\eta} d\eta \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \operatorname{Re} \left[\int_0^z \frac{d\varepsilon}{1+\varepsilon^2} \right] = \frac{\pi}{4}$$

9. 计算下列积分:

$$(1) \int_{-\pi i}^{\pi i} \sin^2 z dz;$$

$$\text{解: } \int_{-\pi i}^{\pi i} \sin^2 z dz = \int_{-\pi i}^{\pi i} \frac{1-\cos 2z}{2} dz = \left(\frac{z}{2} - \frac{\sin 2z}{4} \right) \Big|_{-\pi i}^{\pi i} = (\pi - \frac{1}{2} \operatorname{sh} 2\pi) i$$

$$(2) \int_1^i \frac{\ln(z+1)}{(z+1)} dz.$$

解: 由于被积函数在复平面上除去 $z < -1$ 上的点外处处解析, 因此积分与路径无关。
所以

$$\text{原式} = \int_1^i \ln(z+1) d \ln(z+1) = \frac{1}{2} \ln^2(z+1) \Big|_1^i = \frac{-1}{8} \left(\frac{\pi^2}{4} + 3 \ln^2 2 \right) + \frac{i\pi}{8} \ln 2$$

第六次作业

教学内容: 3.3 复合闭路定理 3.4 柯西积分公式

1. 设 C 为正向椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, 定义 $f(z) = \oint_C \frac{\varepsilon^2 - \varepsilon + 2}{\varepsilon - z} d\varepsilon$, z 不在 C 上, 求 $f(1), f'(i), f''(-i)$ 。

解: z 在 C 内部时, $\frac{\varepsilon^2 - \varepsilon + 2}{\varepsilon - z}$ 在 $\varepsilon = z$ 处不解析,

$$f(z) = \oint_C \frac{\varepsilon^2 - \varepsilon + 2}{\varepsilon - z} d\varepsilon = 2\pi i (z^2 - z + 2),$$

$$f(1) = 2\pi i (z^2 - z + 2) \Big|_{z=1} = 4\pi i;$$

$$f'(i) = 2\pi i (2z - 1) \Big|_{z=i} = -2\pi(2+i);$$

$$f''(-i) = 4\pi i$$

2. 沿指定曲线的正向计算下列各积分。

$$(1) \oint_C \frac{e^z}{z-2} dz, \quad C: |z-2| = 1;$$

解: 由 Cauchy 积分公式, $\oint_C \frac{e^z}{z-2} dz = 2\pi i e^z \Big|_{z=2} = 2\pi i e^2$

$$(2) \oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz, C: |z| = r > 1;$$

解: (1) $\cos \pi z$ 在由 $C: |z| = r > 1$ 围成的区域内解析,

$$\oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz = \frac{2\pi i}{4!} (\cos \pi z)^{(4)} \Big|_{z=1} = -\frac{\pi^5 i}{12}$$

$$(3) \oint_C \frac{\sin z}{(z - \frac{\pi}{2})^2} dz, \quad C: |z| = 2.$$

解: 由高阶求导公式, $\oint_C \frac{\sin z}{(z - \frac{\pi}{2})^2} dz = 2\pi i (\sin z)' \Big|_{z=\frac{\pi}{2}} = 0$

3. 计算积分

$$(1) \oint_C \frac{1}{z^2 - 1} \sin \frac{\pi}{4} z dz, \quad C: |z| = 2$$

在积分曲线内被积函数有两个奇点 ± 1 ，围绕 $1, -1$ 分别做两条相互外离的小闭合曲线

C_1, C_2 ，则由复合闭路定理

$$\oint_C \frac{1}{z^2-1} \sin \frac{\pi z}{4} dz = \oint_{C_1} \frac{\frac{1}{z+1} \sin \frac{\pi z}{4}}{z-1} dz + \oint_{C_2} \frac{\frac{1}{z-1} \sin \frac{\pi z}{4}}{z+1} dz$$

$$= 2\pi i \left[\frac{1}{z+1} \sin \frac{\pi z}{4} \Big|_{z=1} + \frac{1}{z-1} \sin \frac{\pi z}{4} \Big|_{z=-1} \right] = \sqrt{2}\pi i$$

$$(2) \oint_C \frac{e^{iz}}{z^2+1} dz, \quad C: |z-2i| = \frac{3}{2};$$

解：由 Cauchy 积分公式， $\oint_C \frac{e^{iz}}{z^2+1} dz = \oint_C \frac{e^{iz} dz / (z+i)}{z^2-i} = 2\pi i \frac{e^{iz}}{z+i} \Big|_{z=i} = \pi/e$

$$(3) \oint_C \frac{dz}{z^2-a^2}, \quad C: |z-a| = a;$$

$$\text{解 1: } \oint_C \frac{dz}{z^2-a^2} = \oint_C \frac{\frac{1}{z+a}}{z-a} dz = 2\pi i \frac{1}{z+a} \Big|_{z=a} = \frac{\pi}{a} i$$

$$\text{解 2: } \oint_C \frac{dz}{z^2-a^2} = \frac{1}{2a} \left(\oint_C \frac{1}{z-a} dz - \oint_C \frac{1}{z+a} dz \right) = \frac{\pi}{a} i$$

$$(4) \oint_C \frac{dz}{(z^2+4)(z^2+1)}, \quad C: |z| = \frac{3}{2};$$

解：因被积函数的奇点 $z = \pm i$ 在 C 的内部， $z = \pm 2i$ 在 C 的外部，故由复合闭路定理及 Cauchy 积分公式有：

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{dz}{(z^2+4)(z^2+1)} &= \oint_{|z-i|=\frac{1}{3}} \frac{dz}{(z^2+4)(z^2+1)} + \oint_{|z+i|=\frac{1}{3}} \frac{dz}{(z^2+4)(z^2+1)} \\ &= \oint_{|z-i|=\frac{1}{3}} \frac{\frac{1}{(z^2+4)(z+i)}}{z-i} dz + \oint_{|z+i|=\frac{1}{3}} \frac{\frac{1}{(z^2+4)(z+i)}}{z+i} dz \\ &= 2\pi i \frac{1}{(z^2+4)(z+i)} \Big|_{z=i} + 2\pi i \frac{1}{(z^2+4)(z-i)} \Big|_{z=-i} = 0 \end{aligned}$$

4. 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析， C 为 D 内的任意一条正向简单闭曲线，证明：对在 D 内但不在

C 上的任意一点 z_0 ，等式： $\oint_C \frac{f'(z)}{z-z_0} dz = \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz$ 成立。

证明：利用Cauchy积分公式，有 $\oint_C \frac{f'(z)}{z-z_0} dz = 2\pi i f'(z) \Big|_{z=z_0} = 2\pi i f'(z_0)$ ；

又由高阶导数公式 $\oint_C \frac{f'(z)}{z-z_0} dz = \frac{2\pi i}{1!} f'(z) \Big|_{z=z_0} = 2\pi i f'(z_0)$

故所证等式成立。

5. 设 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析且 $f(0)=1$ ，试求： $\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \left[2 \pm \left(z + \frac{1}{z} \right) \right] \frac{f(z)}{z} dz$ 。

$$\begin{aligned} \text{解：} \quad \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \left[2 \pm \left(z + \frac{1}{z} \right) \right] \frac{f(z)}{z} dz &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \left[\frac{2f(z)}{z} \pm \frac{(z^2+1)f(z)}{z^2} \right] dz \\ &= 2f(0) \pm \left[(z^2+1)f(z) \right]' \Big|_{z=0} \\ &= 2 \pm \left[2z \cdot f(z) + (z^2+1)f'(z) \right] \Big|_{z=0} \\ &= 2 \pm f'(0) \end{aligned}$$