

第四章 随机变量的数字特征

北京化工大学数学系

苏贵福

在上一章介绍了随机变量的分布函数, 概率密度和分布律, 它们都能完整地描述随机变量, 但在某些实际或理论问题中, 人们感兴趣于某些能描述随机变量某一种特征的常数.

- 一篮球队上场比赛的运动员的身高 是一个随机变量, 人们往往关心上场运动员的平均身高.
- 一个城市一户家庭拥有汽车 的辆数是一个随机变量, 在考察城市的交通情况时, 人们关心户均拥有汽车的辆数.


这种由随机变量的分布所确定的, 能够刻画随机变量某一方面的特征的常数统称为**数字特征**, 它在理论和实际中有着重要的应用.

概率论与数理统计

4.1数学期望

一. 数学期望

例1 一射手进行打靶练习, 规定射入区域 e_2 得分2分, 射入区域 e_1 得分1分, 脱靶即射入区域 e_0 得分0分, 如下图所示.



射手一次射击得分数 X 是一个随机变量. 设 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = p_k, \quad k = 0, 1, 2.$$

现在射击 N 次, 其中有 a_0 次得0分, a_1 次得1分, a_2 次得2分, 则

$$a_0 + a_1 + a_2 = N.$$

他射击 N 次得分的总和为 $a_0 \times 0 + a_1 \times 1 + a_2 \times 2$. 于是平均每一次射击的得分为

$$\frac{a_0 \times 0 + a_1 \times 1 + a_2 \times 2}{N} = \sum_{k=0}^2 k \frac{a_k}{N}.$$

其中 $\frac{a_k}{N}$ 是事件 $\{X = k\}$ 的频率. 第五章将会讲到

$$\text{当 } N \text{ 很大时 } \frac{a_k}{N} \rightarrow P\{X = k\} = p_k.$$

也就是说, 在试验次数很大时

$$\sum_{k=0}^2 k \frac{a_k}{N} \rightarrow \sum_{k=0}^2 k p_k.$$

我们称 $\sum_{k=0}^2 k p_k$ 为随机变量 X 的数学期望或均值.

定义1 设离散型随机变量 X 的分布律

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots.$$

若级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

绝对收敛, 则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 的和为随机变量 X 的数学期望, 记作

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k.$$

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 若积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

绝对收敛, 则称积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ 的值为随机变量 X 的数学期望, 记作

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx.$$

♣ 数学期望 $E(X)$ 完全由随机变量 X 的概率分布所确定. 若 X 服从某一分布, 也称 $E(X)$ 也是这一分布的数学期望.

例2 某医院当新生儿诞生时, 医生要根据 婴儿的皮肤颜色, 肌肉弹性, 反应的敏感性以及心脏的搏动等方面的情况对婴儿进行评价, 新生儿的得分 X 是一个随机变量. 根据以往的资料表明 X 的分布律为

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8
p_k	0.002	0.001	0.002	0.005	0.06	0.18	0.37	0.25	0.13

试求 X 的数学期望 $E(X)$.

解 根据期望的定义

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times 0.002 + 1 \times 0.001 + 2 \times 0.002 + 3 \times 0.005 + 4 \times 0.06 \\ &\quad + 5 \times 0.18 + 6 \times 0.37 + 7 \times 0.25 + 8 \times 0.13 \\ &= 6.17. \end{aligned}$$

表明若考察医院出生的很多新生儿, 例如1000个, 那么一个新生儿的平均得分约6.17分, 1000个新生儿共得分约6170分. ■

例3 有两个相互独立工作的电子装置, 它们的寿命 $X_k(k = 1, 2)$ 服从同一指数分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \theta > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若将这两个电子装置串联组成整机. 试求整机寿命 N 的数学期望 $E(X)$.

解 $X_k (k = 1, 2)$ 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

根据题意整个系统的寿命为 $N = \min\{X_1, X_2\}$, 相应的分布函数为

$$F_{\min}(x) = 1 - [1 - F(x)]^2 = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{2x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

因而 N 的概率密度为

$$f_{\min}(x) = \begin{cases} \frac{2}{\theta} e^{-\frac{2x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

于是 N 的数学期望为

$$E(N) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\min}(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{2x}{\theta}} dx = \frac{\theta}{2}.$$

二. 几类重要的数学期望

例4 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 则 $E(X) = p$.

证明 因为 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = p^k(1 - p)^{1-k}, \quad (k = 0, 1, 0 < p < 1).$$

因此 X 的期望为

$$E(X) = \sum_{k=0}^1 kP\{X = k\} = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p.$$

例5 设随机变量 $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, 则 $E(X) = \lambda$.

证明 因为 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

因此 X 的期望为

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k P\{X = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{(k-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda. \end{aligned}$$

• 指数函数 e^x 的泰勒展开公式为

$$e^x = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

例6 设随机变量 $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, 则 $E(X) = np$.

证明 因为 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n).$$

因此 X 的期望为

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^n k P\{X = k\} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{kn!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \quad (\text{令 } k' = k - 1). \end{aligned}$$

注意到 $\sum_{k'=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k'![(n-1)-k']!} p^{k'} (1-p)^{[(n-1)-k']} = [p + (1-p)]^{n-1}$. 于是

$$E(X) = np \sum_{k'=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k'![(n-1)-k']!} p^{k'} (1-p)^{[(n-1)-k']} = [p + (1-p)]^{n-1} = np.$$

例7 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $E(X) = \mu$.

证明 已知 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

因此 X 的期望为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx.$$

令 $\frac{x-\mu}{\sigma} = t$, 则有

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma t + \mu) e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{\mu}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \frac{\mu}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2\pi} = \mu. \end{aligned}$$

三. 随机变量函数的数学期望

定理1 设 Y 是随机变量 X 的函数 $Y = g(X)$, 其中 g 是连续函数.

(1) 若 X 是离散型随机变量, 它的分布律为 $P\{X = x_k\} = p_k$,
($k = 1, 2, \cdots$), 且 $\sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$ 绝对收敛, 则有

$$E(Y) = E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k.$$

(2) 若 X 是连续型随机变量, 它的密度函数为 $f(x)$,
且 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$ 绝对收敛, 则有

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx.$$

定理2 设 Z 是随机变量 X, Y 的函数 $Z = g(X, Y)$, 其中 g 是连续函数.

(1) 若二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad (i, j = 1, 2, \cdots).$$

如果 $\sum_{i,j} g(x_i, y_j)p_{ij}$ 绝对收敛, 则有

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i, y_j)p_{ij}.$$

(2) 若二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$. 如果 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)f(x, y)dxdy$ 绝对收敛, 则有

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)f(x, y)dxdy.$$

例8 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	3
p_k	0.2	0.7	0.1

求 X^2 和 $3X - 1$ 的数学期望.

解 列出下表

X	-1	0	3
p_k	0.2	0.7	0.1
X^2	1	0	9
$3X - 1$	-4	-1	8

根据期望的定义 $E(X^2) = 1 \times 0.2 + 0 \times 0.7 + 9 \times 0.1 = 1.1$.


$$E(3X - 1) = -4 \times 0.2 + (-1) \times 0.7 + 8 \times 0.1 = -0.7.$$

例9 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Z = X^2 + Y^2$ 的数学期望.

解 易知 $f(x, y)$ 不等于0的区域如图虚线三角区域所示. 则有



$$\begin{aligned} E(X^2 + Y^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x (x^2 + y^2) 12y^2 dy = \frac{16}{15}. \end{aligned}$$

四. 数学期望的性质

定理3 设 X, Y 是随机变量, C 是常数, 则

$$(1) E(C) = C.$$

$$(2) E(CX) = CE(X).$$

$$(3) E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

$$(4) \text{当 } X, Y \text{ 相互独立时, 有 } E(XY) = E(X)E(Y).$$

证明 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$, 其边缘密度函数为 $f_X(x), f_Y(y)$. 则根据定理2有

$$E(X + Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x + y)f(x, y)dxdy.$$

进而有

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy \\ &\quad + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy \\ &= E(X) + E(Y). \end{aligned}$$

又若 X 和 Y 相互独立时, 有 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$. 进一步有

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf_X(x)f_Y(y) dx dy \\ &= \left[\int_{-\infty}^{+\infty} xf_X dx \right] \left[\int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y) dy \right] \\ &= E(X)E(Y). \end{aligned}$$

其余结论可以类似地证明!

例10 两台同样自动记录仪, 每台无故障工作的时间服从参数为5的指数分布. 首先开动其中一台, 当其发生故障时停用而另一台自行开动. 试求两台记录仪无故障工作的总时间 T 的数学期望.

解 设第一, 二台无故障工作的时间分别为 T_1, T_2 , 总的无故障工作时间为 T . 则 $T = T_1 + T_2$, 且 $E(T) = E(T_1) + E(T_2)$. 我们知道

$$f_{T_1}(t) = f_{T_2}(t) = \begin{cases} 5e^{-5t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

于是所求的期望为

$$E(T) = 2 \int_0^{+\infty} t \cdot 5e^{-5t} dt = \frac{2}{5}.$$

例11 一民航送客车载有20名旅客自机场开出, 旅客有10个车站可以下车. 如到达一个车站没有旅客下车就不停车. 以 X 表示停车的次数. 求 X 的数学期望. (设每位旅客在各个车站下车是等可能的, 并设各旅客是否下车相互独立)

解 引入随机变量 X_i ($i = 1, 2, \dots, 10$):

$$X_i = \begin{cases} 0, & \text{在第 } i \text{ 站没有人下车} \\ 1, & \text{在第 } i \text{ 站有人下车} \end{cases}$$

则有 $X = X_1 + X_2 + \dots + X_{10}$. 按题意任一旅客在第 i 站不下车的概率为 $\frac{9}{10}$, 因此20位旅客都不在 第 i 站下车的概率为 $\left(\frac{9}{10}\right)^{20}$, 而在第 i 站有人下车的概率为 $1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}$.

也就是说

$$P\{X_i = 0\} = \left(\frac{9}{10}\right)^{20}$$
$$P\{X_i = 1\} = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}.$$

于是有

$$E(X_i) = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}, \quad (i = 1, 2, \dots, 10).$$

由此可得

$$\begin{aligned} E(X) &= E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_{10}) \\ &= 10 \left[1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20} \right] = 8.784. \end{aligned}$$