

PROBLEMA 3.7

Un vendedor ha hecho una serie de ventas y desea conocer aquellas de \$200 o menos, las mayores a \$200 pero inferiores a \$400, y el número de ventas de \$400 o superiores a tal cantidad. Haga un diagrama de flujo que le proporcione al vendedor esta información después de haber leído los datos de entrada.

Los datos son: $N, V_1, V_2, \dots, V_N$.

Donde:

N es una variable de tipo entero que representa el número de ventas del vendedor.

V_i : es una variable de tipo real que indica la venta i del vendedor i ($1 \leq i \leq N$)

Explicación de las variables

I: Variable de tipo entero. Representa la variable de control del ciclo.

CHI, MED y Variables de tipo entero. Acumulan el número de ventas menores

GRA: a \$200, a \$400 y mayores a \$400, respectivamente.

N: Variable de tipo entero.

V: Variable de tipo real.

A continuación en la tabla 3.9, podemos observar el seguimiento del algoritmo.

Tabla 3.9					
I	M	MED	CHI	GRA	V
1	12	0	0	0	
2			1		180.25
3				1	470.30
4			2		150.25
5			3		88.60
6		1			230.15
7			4		170.20
8			5		40.30
9		2			201.90
10			6		60.32
11		3			280.30
12			7		15.70
13			8		140.20