Билет 33

Автор $1,, AвторN$
21 июня 2020 г.

Содержани	\mathbf{e}
-----------	--------------

0.1	Билет 33: Норма	оператора.	Простейшие	свойства						1
-----	-----------------	------------	------------	----------	--	--	--	--	--	---

Билет 33 СОДЕРЖАНИЕ

0.1. Билет 33: Норма оператора. Простейшие свойства.

Определение 0.1.

Пусть $\langle X,\|\cdot\|_X \rangle,$ $\left\langle Y,\|\cdot\|_y \right\rangle$ - нормированные пространства, $A:X\mapsto Y$ - линейные оператор.

Зададим норму на пространстве операторов:

$$||A|| := \sup_{||x||_X \leqslant 1} ||Ax||_Y.$$

Определение 0.2.

Если $||A|| \neq \infty$ опертор называется ограниченным.

Замечание.

Ограниченный оператор \neq ограниченное отображение.

Ограниченное линейное отображение - только тождественный ноль.

Лемма.

||A|| - действительно норма.

Доказательство.

1.
$$||A|| = 0 \implies A = 0$$

Доказательство.

$$\begin{split} \|A\| &= 0 \implies \forall x \in X \quad \|x\|_X \leqslant 1 \implies \|Ax\|_Y = 0 \implies Ax = 0. \\ \text{Если } x \neq 0, \text{ то } A(x) &= A\left(\|x\|_X \cdot \frac{x}{\|x\|_X}\right) = \|x\|_X \cdot A\left(\frac{x}{\|x\|_X}\right) = \|x\|_X \cdot 0 = 0. \\ \text{A } A(0) &= 0 \text{ всегда, значит } \forall x \in X \quad A(x) = 0 \implies A = 0. \end{split}$$

2.
$$\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|$$

Доказательство.

$$\|\lambda A\| = \sup_{\|x\|_Y \leqslant 1} \|(\lambda A)x\|_Y = \sup_{\|x\|_Y \leqslant 1} |\lambda| \|Ax\|_Y = |\lambda| \sup_{\|x\|_Y \leqslant 1} \|Ax\|_Y = |\lambda| \|A\|. \qquad \Box$$

3.
$$||A + B|| \le ||A|| + ||B||$$

Доказательство.

$$||A + B|| = \sup_{\|x\|_X \le 1} ||(A + B)x||_Y$$

$$= \sup_{\|x\|_X \le 1} ||Ax + Bx||_Y$$

$$\le \sup_{\|x\|_X \le 1} ||Ax||_Y + ||Bx||_Y$$

$$\le \sup_{\|x\|_X \le 1} ||Ax||_Y + \sup_{\|x\|_X \le 1} ||Ax||_Y$$

$$= ||A|| + ||B||$$

Таким образом, определние нормы выполняется.