

# Билет 07

Автор1, ..., АвторN

20 июня 2020 г.

## Содержание

0.1	Билет 7: ! Определение несобственного интеграла. Критерий Коши. Примеры.	1
-----	--	---

## 0.1. Билет 7: ! Определение несобственного интеграла. Критерий Коши. Примеры.

### Определение 0.1.

Если  $-\infty < a < b \leq +\infty$  и  $f \in C[a, b)$ ,

Пусть  $L := \lim_{c \rightarrow b-} \int_a^c f(x) dx$ .

Аналогично если  $-\infty \leq a < b < +\infty$  и  $f \in C(a, b]$ ,

Пусть  $L := \lim_{c \rightarrow a+} \int_c^b f(x) dx$

Тогда если  $L$  существует в  $\overline{\mathbb{R}}$ , то  $\int_a^b f(x) dx := L$

Если он конечен, скажем, что интеграл сходится, иначе – если предел не существует или бесконечен – интеграл расходится.

Определённый интеграл называется несобственным, если выполняется, по крайней мере, одно из следующих условий:

- 1) Область интегрирования является бесконечной.
- 2) Функция является неограниченной в окрестности некоторых точек области интегрирования.

### Замечание.

Если  $f \in C[a, b]$ , то определение не даёт ничего нового, потому что:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b-} \int_a^c f(x) dx$$

Доказательство:  $\left| \int_a^b f - \int_a^c f \right| = \left| \int_c^b f \right| \leq \int_c^b |f| \leq \int_c^b M = M(b-c) \rightarrow 0$  при  $c \rightarrow b-$

### Теорема 0.1 (Критерий Коши сходимости интегралов).

$-\infty < a < b \leq +\infty$   $f \in C[a, b)$

$$\int_a^b f \text{ сходится} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{b} \in (a, b) : \forall c, d \in (\tilde{b}, b) \left| \int_c^d f \right| < \varepsilon$$

### Доказательство.

“ $\implies$ ”

По определению интеграл сходится  $\iff \lim_{c \rightarrow b-} \int_a^c f = \int_a^b f$  – существует и конечен.

$$\text{Тогда } \lim_{d \rightarrow b-} \int_a^d f = \int_a^b f - \lim_{d \rightarrow b-} \int_a^d f = \int_a^b f - \int_a^b f = 0$$

$$\text{Значит } \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall d \in (b - \delta, b) \left| \int_d^b f \right| = \left| \int_a^b f - \int_a^d f \right| < \varepsilon$$

$$\text{Тогда наш } \left| \int_c^d f \right| = \left| \int_a^d f - \int_a^c f \right| \leq \left| \int_a^d f - \int_a^b f \right| + \left| \int_a^b f - \int_a^c f \right| < 2\varepsilon$$

“ $\impliedby$ ”

$$\text{Обозначим } F(x) := \int_a^x f(t) dt$$

Переписанное условие:  $\forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{b} \in (a, b) \forall c, d \in (\tilde{b}, b) \implies |F(c) - F(d)| < \varepsilon$

Пусть наша  $\tilde{b} = b - \delta$

$$. - \lim_{x \rightarrow b-} F(x)$$

Тогда перепишем условие как  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall c, d \in (b - \delta, b) \implies |F(c) - F(d)| < \varepsilon$

Это и есть критерий Коши для  $\lim_{c \rightarrow b-} F(c)$ . □

### Следствие.

$-\infty < a < b \leq +\infty \quad f \in C[a, b)$

Если  $\exists c_n, d_n \in [a, b)$ , т.ч.  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} d_n = b$

и  $\int_{c_n}^{d_n} f \not\rightarrow 0$ , то  $\int_a^b f$  расходится.

### Доказательство.

От противного. Пусть  $\int_a^b f$  сходится. Докажем, что  $\int_{c_n}^{d_n} f \rightarrow 0$  при  $n \rightarrow \infty$ .

Возьмем  $\varepsilon > 0$  и по нему найдем  $\tilde{b} \in (a, b)$  из критерия Коши.

Т.к.  $c_n, d_n \rightarrow b \implies \exists N \forall n > N \quad c_n, d_n > \tilde{b}$

$\implies$  по критерию Коши  $\left| \int_{c_n}^{d_n} f \right| < \varepsilon$ .

Значит,  $\int_{c_n}^{d_n} f \rightarrow 0$ , что противоречит условию. □

### Замечание.

$f \in C[a, b) \quad -\infty < a < b \leq +\infty$ .

Тогда на  $[a, b)$  существует первообразная  $F$ .

Значит существование  $\int_a^b f$  — это существование  $\lim_{c \rightarrow b-} (F(c) - F(a)) = \lim_{c \rightarrow b-} F(c) - F(a)$ .

Т.е. существование интеграла равносильно тому, что первообразная  $F(x)$  имеет предел в точке  $b$  (слева).

Соглашение: если  $F$  не определена в точке  $b$ , считать, что  $F \Big|_a^b := \lim_{c \rightarrow b-} F(c) - F(a)$

Тогда если  $\int_a^b f$  существует, то  $\int_a^b f = F \Big|_a^b$

### Пример.

$$1. \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_1^c \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{p-1}} \cdot \frac{-1}{p-1} \Big|_1^c & p \neq 1 \\ \lim_{c \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_1^c & p = 1 \end{cases}$$

1) При  $p = 1$

$$\int_1^c \frac{dx}{x} = \ln c \rightarrow +\infty$$

Тогда интеграл расходится.

2) При  $p \neq 1$

$$\int_1^c \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1} - \frac{1}{(p-1)c^{p-1}} \rightarrow \frac{1}{p-1}, \text{ если } p > 1$$

Если же  $p < 1$ , то  $\rightarrow +\infty$ .

Получили, что  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$  сходится  $\iff p > 1$ .

$$2. \int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \lim_{c \rightarrow 0+} \int_c^1 \frac{dx}{x^p}$$

1) Если  $p = 1$

$$\int_c^1 \frac{dx}{x^p} = \ln x \Big|_c^1 = -\ln c = +\infty$$

Значит, интеграл расходится.

2) Если же  $p \neq 1$

$$\int_c^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{x^{p-1}} \frac{1}{1-p} \Big|_c^1 = \frac{1}{1-p} - \frac{1}{(1-p)c^{p-1}}$$

Если  $p > 1 \implies \rightarrow +\infty$

Если  $p < 1 \implies \frac{1}{1-p}$

Получили, что  $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$  сходится  $\iff p < 1$