## Билет 45

Автор1, ..., Aвтор<math>N

22 июня 2020 г.

Сод	ержа	ние
-----	------	-----

# 0.1. Билет 45: Связь между суммами и интегралами. Интегральный признак.

#### Теорема 0.1.

Если  $f:[m,n]\mapsto \mathbb{R}$  монотонна, то  $|\sum\limits_{k=m}^n f(k)-\int\limits_m^n f(x)dx|\leqslant \max\{|f(m)|,|f(n)|\}$ 

#### Доказательство.

Не умаляя общности  $f \geqslant 0$  и монотонно убывает.

Здесь удобно нарисовать убывающий график и изобразить суммы двумя видами столбиков: когда начинаем от m и столбики вылезают над графиком, и когда от m+1 столбики под графиком.

Теорема 0.2 (Интегральный признак сходимости).

 $f:[1,+\infty)\mapsto \mathbb{R},\ f\geqslant 0$  монотонно убывает.

Тогда  $\sum\limits_{k=1}^{\infty}f(k)$  и  $\int\limits_{1}^{\infty}f(x)dx$  ведут себя одинаково.

#### Доказательство.

$$\sum\limits_{k=1}^{\infty}f(k)$$
 – сходится  $\iff S_n:=\sum\limits_{k=1}^nf(k)$  ограничены.

$$\int\limits_{1}^{\infty}f(x)dx-\text{сходится}\iff F(n):=\int\limits_{1}^{n}f(x)dx\text{ ограничены}.$$

По предыдущей теореме  $|S_n - F(n)| \leqslant f(1)$  ... f(inf) -> 0

### Пример.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

Если  $p \leqslant 0$ , то  $\frac{1}{n^p} \nrightarrow 0 \implies$  ряд расходится.

Если p>0, то  $f(x)=\frac{1}{x^p}\geqslant 0$  и монотонно убывает  $\implies$  по интегральному признаку

$$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p}}$$
 и  $\int\limits_{1}^{\infty}\frac{dx}{x^{p}}$  (сходится  $\iff p>1)$  ведут себя одинаково.

Значит, ряд 
$$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$
 сходится  $\iff p>1.$ 

П

Билет 45 COДЕРЖАНИЕ

#### Следствие.

Если 
$$0 \leqslant a_n \leqslant \frac{c}{n^p}$$
 при  $p > 1$ , то ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится.

(Следует из примера выше и признака сравнения.)

#### Пример.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

$$f(x) = \frac{1}{x \ln x} \geqslant 0$$
 и монотонно убывает  $\implies$  по интегральному признаку

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$
 и  $\int_{2}^{\infty} \frac{dx}{x \ln x}$  ведут себя одинаково.

$$\int_{2}^{b} \frac{dx}{x \ln x} = \int_{\ln 2}^{\ln b} \frac{dy}{y} = \ln y \Big|_{\ln 2}^{\ln b} = \ln \ln b - \ln \ln 2 \xrightarrow[b \to +\infty]{} + \infty$$

Значит, ряд 
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$
 расходится.