

第一章 行列式

习题课



主要内容

$x+y=$


典型例题



测验题

帮助

返回



1 全排列

把 n 个不同的元素排成一列，叫做这 n 个元素的全排列（或排列）。

n 个不同的元素的所有排列的种数用 P_n 表示，且 $P_n = n!$ 。

上页

下页

返回

2 逆序数

在一个排列 $(i_1 i_2 \cdots i_t \cdots i_s \cdots i_n)$ 中, 若数 $i_t > i_s$, 则称这两个数组成一个**逆序**.

一个排列中所有逆序的总数称为此排列的**逆序数**.

逆序数为奇数的排列称为**奇排列**, 逆序数为偶数的排列称为**偶排列**.

3 计算排列逆序数的方法

方法1

分别计算出排在 $1, 2, \dots, n-1, n$ 前面比它大的数码之和，即分别算出 $1, 2, \dots, n-1, n$ 这 n 个元素的逆序数，这 n 个元素的逆序数之总和即为所求排列的逆序数。

方法2

分别计算出排列中每个元素前面比它大的数码个数之和，即算出排列中每个元素的逆序数，每个元素的逆序数之总和即为所求排列的逆序数。

4 对 换

定义 在排列中，将任意两个元素对调，其余元素不动，称为一次对换。将相邻两个元素对调，叫做相邻对换。

定理 一个排列中的任意两个元素对换，排列改变奇偶性。

推论 奇排列调成标准排列的对换次数为奇数，偶排列调成标准排列的对换次数为偶数。

5 n阶行列式的定义

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^t a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n}$$

其中 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 为自然数 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列, t 为这个排列的逆序数; $\sum_{p_1 p_2 \cdots p_n}$ 表示对 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列取和.

上页

下页

返回

n 阶行列式 D 亦可定义为

$$D = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^t a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n},$$

其中 t 为行标排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 的逆序数.

上页

下页

返回

6 n 阶行列式的性质

- 1)行列式与它的转置行列式相等,即 $D = D^T$.
- 2)互换行列式的两行(列),行列式变号.
- 3)如果行列式有两行(列)完全相同,则此行列式等于零.
- 4)行列式的某一行(列)中所有的元素都乘以同一数 k ,等于用数 k 乘此行列式.

5)行列式中某一行(列)的所有元素的公因子可以提到行列式符号的外面.

6)行列式中如果有两行(列)元素成比例,则此行列式为零.

7)若行列式的某一行(列)的元素都是两数之和,则此行列式等于两个行列式之和.

8)把行列式的某一行(列)的各元素乘以同一数,然后加到另一行(列)对应的元素上去,行列式的值不变.

7 行列式按行（列）展开

1) 余子式与代数余子式

在 n 阶行列式中，把元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去后，留下来的 $n-1$ 阶行列式叫做元素 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij} ；记

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij},$$

A_{ij} 叫做元素 a_{ij} 的代数余子式。

2) 关于代数余子式的重要性质

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} A_{kj} = D \delta_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = j; \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

或

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = D \delta_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = j; \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

其中

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j; \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

8 克拉默法则

[illegible]

的系数行列式 $D \neq 0$, 那么它有唯一解

$$x_j = \frac{D_j}{D}, j = 1, 2, \dots, n.$$

其中 $D_j (j = 1, 2, \cdots, n)$ 是把系数行列式 D 中第 j 列换成常数项 b_1, b_2, \cdots, b_n 所得到的行列式.

克拉默法则的理论价值

定理 如果线性方程组

[illegible]

的系数行列式 $D \neq 0$,那么它一定有解, 且解唯一.

定理 如果上述线性方程组无解或有两个不同的解，则它的系数行列式必为零.

定理 如果齐次线性方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0. \end{array} \right.$$

的系数行列式 $D \neq 0$,那么它没有非零解.

定理 如果上述齐次线性方程组有非零解, 则它的系数行列式必为零.

上页

下页

[返回](#)

典型例题

- ▶ 一、计算排列的逆序数
- ▶ 二、计算（证明）行列式
- ▶ 三、克拉默法则

一、计算排列的逆序数

例 1 求排列 $(2k)1(2k-1)2(2k-2)3(2k-3)\dots$
 $(k+1)k$ 的逆序数,并讨论奇偶性.

解 分别算出排列中每个元素前面比它大的数码之和,即算出排列中每个元素的逆序数.

$2k$ 排在首位,故逆序数为0;

1的前面比1大的数有一个($2k$),故逆序数为1;

$(2k-1)$ 的前面比($2k-1$)大的数有一个($2k$),故逆序数为1;

2的前面比2大的数有两个($2k, 2k - 1$),故逆序数为2;

$2k - 2$ 的前面比 $2k - 2$ 大的数有两个($2k, 2k - 1$),故逆序数为2;

.....

$k - 1$ 的前面比 $k - 1$ 大的数有 $k - 1$ 个($2k, 2k - 1, \dots, k + 2$),故逆序数为 $k - 1$;

$k + 1$ 的前面比 $k + 1$ 大的数有 $k - 1$ 个($2k, 2k - 1, \dots, k + 2$),故逆序数为 $k - 1$;

k 的前面比 k 大的数有 k 个($2k, 2k - 1, \dots, k + 1$),故逆序数为 k ;

于是排列的逆序数为

$$\begin{aligned}t &= 0 + 1 + 1 + 2 + 2 + \cdots + (k-1) + (k-1) + k \\&= \frac{[2(1+k-1)(k-1)]}{2} + k \\&= k^2\end{aligned}$$

当 k 为偶数时，排列为偶排列，

当 k 为奇数时，排列为奇排列。

上页

下页

返回

二、计算（证明）行列式

1 用定义计算（证明）

例2 用行列式定义计算

$$D_5 = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ 0 & a_{42} & a_{43} & 0 & 0 \\ 0 & a_{52} & a_{53} & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

解 设 D_5 中第1,2,3,4,5行的元素分别为 $a_{1p_1}, a_{2p_2}, a_{3p_3}, a_{4p_4}, a_{5p_5}$, 那么, 由 D_5 中第1,2,3,4,5行可能的非零元素分别得到

$$p_1 = 2, 3;$$

$$p_2 = 1, 2, 3, 4, 5;$$

$$p_3 = 1, 2, 3, 4, 5; \quad p_4 = 2, 3; \quad p_5 = 2, 3.$$

因为 p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 在上述可能取的代码中, 一个5元排列也不能组成,
故 $D_5 = 0$.

上页

下页

返回

评注 本例是从一般项入手，将行标按标准顺序排列，讨论列标的所有可能取到的值，并注意每一项的符号，这是用定义计算行列式的一般方法.

注意 如果一个 n 阶行列式中等于零的元素比 $n^2 - n$ 还多，则此行列式必等于零.

上页

下页

返回

例3 设

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}b^{-1} & \cdots & a_{1n}b^{1-n} \\ a_{21}b & a_{22} & \cdots & a_{2n}b^{2-n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1}b^{n-1} & a_{n2}b^{n-2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

证明: $D_1 = D_2$.

上页

下页

返回

证明 由行列式的定义有

$$D_1 = \sum (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n},$$

其中 t 是排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 的逆序数.

$$\begin{aligned} D_2 &= \sum (-1)^t (a_{1p_1} b^{1-p_1}) (a_{2p_2} b^{2-p_2}) \cdots (a_{np_n} b^{n-p_n}) \\ &= \sum (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} b^{(1+2+\cdots+n)-(p_1+p_2+\cdots+p_n)}, \end{aligned}$$

其中 t 是排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 的逆序数.

而 $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1 + 2 + \cdots + n,$

所以 $D_2 = \sum (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} = D_1.$

评注 本题证明两个行列式相等，即证明两点，一是两个行列式有完全相同的项，二是每一项所带的符号相同．这也是用定义证明两个行列式相等的常用方法．

2 利用范德蒙行列式计算

利用范德蒙行列式计算行列式，应根据范德蒙行列式的特点，将所给行列式化为范德蒙行列式，然后根据范德蒙行列式计算出结果。

例 4 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^n \\ 3 & 3^2 & \cdots & 3^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n^2 & \cdots & n^n \end{vmatrix}.$$

上页

下页

返回

解 D_n 中各行元素分别是一个数的不同方幂,方幂次数自左至右按递升次序排列,但不是从0变到 $n-1$,而是由1递升至 n .若提取各行的公因子,则方幂次数便从0增至 $n-1$,于是得到

$$D_n = n! \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 2^2 & \cdots & 2^{n-1} \\ 1 & 3 & 3^2 & \cdots & 3^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & n & n^2 & \cdots & n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

上面等式右端行列式为n阶范德蒙行列式，由范德蒙行列式知

$$\begin{aligned} D_n &= n! \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j) \\ &= n!(2-1)(3-1)\cdots(n-1) \\ &\quad \bullet (3-2)(4-2)\cdots(n-2)\cdots[n-(n-1)] \\ &= n!(n-1)!(n-2)!\cdots 2!1!. \end{aligned}$$

评注 本题所给行列式各行（列）都是某元素的不同方幂，而其方幂次数或其排列与范德蒙行列式不完全相同，需要利用行列式的性质（如提取公因子、调换各行（列）的次序等）将此行列式化成范德蒙行列式.

上页

下页

返回

3 用化三角形行列式计算

例5 计算

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x & a_3 & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

上页

下页

返回

解 将第2,3,⋯,n+1列都加到第一列, 得

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} x + \sum_{i=1}^n a_i & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ x + \sum_{i=1}^n a_i & x & a_2 & \cdots & a_n \\ x + \sum_{i=1}^n a_i & a_2 & x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x + \sum_{i=1}^n a_i & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}$$

提取第一列的公因子，得

$$D_{n+1} = \left(x + \sum_{i=1}^n a_i \right) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & x & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 & x & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

将第1列的 $(-a_1)$ 倍加到第2列，将第1列的 $(-a_2)$ 倍加到第3列， \cdots ，将第1列的 $(-a_n)$ 倍加到最后一列，得

$$D_{n+1} = (x + \sum_{i=1}^n a_i) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x - a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_2 - a_1 & x - a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2 - a_1 & a_3 - a_2 & \cdots & x - a_n \end{vmatrix}$$

$$= (x + \sum_{i=1}^n a_i) \prod_{i=1}^n (x - a_i).$$

评注 本题利用行列式的性质，采用“化零”的方法，逐步将所给行列式化为三角形行列式。化零时一般尽量选含有1的行（列）及含零较多的行（列）；若没有1，则可适当选取便于化零的数，或利用行列式性质将某行（列）中的某数化为1；若所给行列式中元素间具有某些特点，则应充分利用这些特点，应用行列式性质，以达到化为三角形行列式之目的。

上页

下页

返回

4 用降阶法计算

例6 计算

$$D_4 = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix}.$$

解 将 D_4 的第2、3、4行都加到第1行，并从第1行中提取公因子 $a + b + c + d$ ，得

$$D_4 = (a + b + c + d) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix},$$

再将第2、3、4列都减去第1列，得

$$D_4 = (a + b + c + d) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ b & a - b & d - b & c - b \\ c & d - c & a - c & b - c \\ d & c - d & b - d & a - d \end{vmatrix},$$

按第1行展开，得

$$D_4 = (a + b + c + d) \begin{vmatrix} a - b & d - b & c - b \\ d - c & a - c & b - c \\ c - d & b - d & a - d \end{vmatrix}.$$

把上面右端行列式第2行加到第1行，再从第1行中提取公因子 $a - b - c + d$ ，得

$$D_4 = (a + b + c + d)(a - b - c + d)$$

$$\bullet \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ d - c & a - c & b - c \\ c - d & b - d & a - d \end{vmatrix},$$

再将第2列减去第1列，得

$$D_4 = (a + b + c + d)(a - b - c + d)$$

$$\bullet \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ d - c & a - d & b - c \\ c - d & b - c & a - d \end{vmatrix},$$

按第1行展开，得

$$D_4 = (a + b + c + d)(a - b - c + d) \begin{vmatrix} a - d & b - c \\ b - c & a - d \end{vmatrix}$$

$$= (a + b + c + d)(a - b - c + d) \bullet [(a - d)^2 - (b - c)^2]$$

$$= (a + b + c + d)(a - b - c + d)$$

$$\bullet (a + b - c - d)(a - b + c - d)$$

上页

下页

返回

评注 本题是利用行列式的性质将所给行列式的某行（列）化成只含有一个非零元素，然后按此行（列）展开，每展开一次，行列式的阶数可降低 1 阶，如此继续进行，直到行列式能直接计算出来为止（一般展开成二阶行列式）。这种方法对阶数不高的数字行列式比较适用。

上页

下页

返回

5 用拆成行列式之和（积）计算

例7 证明

$$\begin{vmatrix} \sin 2\alpha & \sin(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \gamma) \\ \sin(\beta + \alpha) & \sin 2\beta & \sin(\beta + \gamma) \\ \sin(\gamma + \alpha) & \sin(\gamma + \beta) & \sin 2\gamma \end{vmatrix} = 0.$$

证

$$\text{左边} = \begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ \sin \beta & \cos \beta & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \end{vmatrix} \bullet \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \sin \alpha & \sin \beta & \sin \gamma \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

上页

下页

返回

6 用递推法计算

例8 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a + x_1 & a & \cdots & a \\ a & a + x_2 & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & \cdots & a + x_n \end{vmatrix}.$$

解 依第 n 列把 D_n 拆成两个行列式之和

$$D_n = \begin{vmatrix} a + x_1 & a & \cdots & a & a \\ a & a + x_2 & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a & a & \cdots & a + x_{n-1} & a \\ a & a & \cdots & a & a \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} a + x_1 & a & \cdots & a & 0 \\ a & a + x_2 & \cdots & a & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & \cdots & a + x_{n-1} & 0 \\ a & a & \cdots & a & x_n \end{vmatrix}.$$

右端的第一个行列式,将第 n 列的 (-1) 倍分别加到第 $1,2,\cdots,n-1$ 列,右端的第二个行列式按第 n 列展开,得

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & 0 & \cdots & 0 & a \\ 0 & x_2 & \cdots & 0 & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & x_{n-1} & a \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} + x_n D_{n-1},$$

从而 $D_n = x_1 x_2 \cdots x_{n-1} a + x_n D_{n-1}$.

由此递推，得

$$D_{n-1} = x_1 x_2 \cdots x_{n-2} a + x_{n-1} D_{n-2}, \text{于是}$$

$$D_n = x_1 x_2 \cdots x_{n-1} a + x_1 x_2 \cdots x_{n-2} a x_n \\ + x_n x_{n-1} D_{n-2}.$$

如此继续下去，可得

$$D_n = x_1 x_2 \cdots x_{n-1} a + x_1 x_2 \cdots x_{n-2} a x_n + \cdots \\ + x_1 x_2 a x_4 \cdots x_n + x_n x_{n-1} \cdots x_3 D_2$$

上页

下页

返回

$$\begin{aligned}
&= x_1 x_2 \cdots x_{n-1} a + x_1 x_2 \cdots x_{n-2} a x_n \\
&\quad + \cdots + x_1 x_2 a x_4 \cdots x_n \\
&\quad + x_n x_{n-1} \cdots x_3 (a x_1 + a x_2 + x_1 x_2) \\
&= x_1 x_2 \cdots x_n + a(x_1 x_2 \cdots x_{n-1} + \cdots \\
&\quad + x_1 x_3 \cdots x_n + x_2 x_3 \cdots x_n).
\end{aligned}$$

当 $x_1 x_2 \cdots x_n \neq 0$ 时，还可改写成

$$D_n = x_1 x_2 \cdots x_n \left[1 + a \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right) \right].$$

评注 本题是利用行列式的性质把所给的 n 阶行列式 D_n 用同样形式的 $n-1$ 阶行列式表示出来,建立了 D_n 与 $n-1$ 阶行列式 D_{n-1} 之间的递推关系.有时,还可以把给定的 n 阶行列式 D_n 用同样形式的比 $n-1$ 阶更低阶的行列式表示,建立比 $n-1$ 阶行列式更低阶行列式之间的递推关系.

7 用数学归纳法

例9 证明

$$D_n = \begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos \alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos \alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos \alpha \end{vmatrix}$$
$$= \cos n \alpha.$$

证 对阶数 n 用数学归纳法

因为 $D_1 = \cos \alpha$,

$$D_2 = \begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 \\ 1 & \cos 2\alpha \end{vmatrix} = 2\cos^2 \alpha - 1 = \cos 2\alpha,$$

所以,当 $n = 1, n = 2$ 时,结论成立.

假设对阶数小于 n 的行列式结论成立,下证对于阶数等于 n 的行列式也成立.现将 D_n 按最后一行展开,得

$$D_n = 2\cos \alpha D_{n-1} - D_{n-2}.$$

上页

下页

返回

由归纳假设, $D_{n-1} = \cos(n-1)\alpha,$

$$D_{n-2} = \cos(n-2)\alpha,$$

$$\begin{aligned} D_n &= 2\cos\alpha \cos(n-1)\alpha - \cos(n-2)\alpha \\ &= [\cos n\alpha + \cos(n-2)\alpha] - \cos(n-2)\alpha \\ &= \cos n\alpha; \end{aligned}$$

所以对一切自然数 n 结论成立.

上页

下页

返回

评注 为了将 D_n 展开成能用其同型的 D_{n-1} , D_{n-2} 表示,本例必须按第 n 行(或第 n 列)展开,不能按第1行(或第1列)展开,否则所得的低阶行列式不是与 D_n 同型的行列式.

一般来讲,当行列式已告诉其结果,而要我们证明是与自然数有关的结论时,可考虑用数学归纳法来证明.如果未告诉结果,也可先猜想其结果,然后用数学归纳法证明其猜想结果成立.

上页

下页

返回

小结

计算行列式的方法比较灵活，同一行列式可以有多种计算方法；有的行列式计算需要几种方法综合应用。在计算时，首先要仔细考察行列式在构造上的特点，利用行列式的性质对它进行变换后，再考察它是否能用常用的几种方法。

上页

下页

返回

三、克拉默法则

当线性方程组方程个数与未知数个数相等、且系数行列式不等于零时，可用克莱姆法则．为了避免在计算中出现分数，可对有的方程乘以适当整数，把原方程组变成系数及常数项都是整数的线性方程组后再求解．

例10 求一个二次多项式 $f(x)$, 使
 $f(1) = 0, f(2) = 3, f(-3) = 28.$

解 设所求的二次多项式为

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

由题意得

$$f(1) = a + b + c = 0,$$

$$f(2) = 4a + 2b + c = 3,$$

$$f(-3) = 9a - 3b + c = 28,$$

这是一个关于三个未知数 a, b, c 的线性方程组.

$$D = -20 \neq 0, \quad D_1 = -40,$$

$$D_2 = 60, \quad D_3 = -20.$$

由克莱姆法则，得

$$a = \frac{D_1}{D} = 2, b = \frac{D_2}{D} = -3, c = \frac{D_3}{D} = 1.$$

于是，所求的多项式为

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 1.$$

上页

下页

返回

例11 证明平面上三条不同的直线

$$ax + by + c = 0, bx + cy + a = 0, cx + ay + b = 0$$

相交于一点的充分必要条件是 $a + b + c = 0$.

证 必要性 设所给三条直线交于一点 $M(x_0, y_0)$,
则 $x = x_0, y = y_0, z = 1$ 可视为齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax + by + cz = 0, \\ bx + cy + az = 0, \\ cx + ay + bz = 0 \end{cases}$$

的非零解. 从而有系数行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = \left(-\frac{1}{2}\right)(a+b+c)$$

$$\bullet [(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] = 0.$$

因为三条直线互不相同,所以 a, b, c 也不全相同,故 $a+b+c=0$.

充分性 如果 $a+b+c=0$,将方程组

$$\begin{cases} ax+by=-c, \\ bx+cy=-a, \\ cx+ay=-b \end{cases} \quad (1)$$

的第一、二两个方程加到第三个方程，得

$$\begin{cases} ax + by = -c, \\ bx + cy = -a, \\ 0 = 0. \end{cases} \quad (2)$$

下证此方程组 (2) 有唯一解.

如果 $\begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} = ac - b^2 = 0$ ，则 $ac = b^2 \geq 0$ 。由

$b = -(a + c)$ 得 $ac = [-(a + c)]^2 = a^2 + 2ac + c^2$ ，于是 $ac = -(a^2 + c^2) \leq 0$ ，从而有 $ac = 0$ 。

上页

下页

返回

不妨设 $a = 0$,由 $b^2 = ac$ 得 $b = 0$.再由 $a + b + c = 0$ 得 $c = 0$,与题设矛盾.故

$$\begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} \neq 0.$$

由克莱姆法则知, 方程组(2)有唯一解.从而知方程组(1)有唯一解, 即三条不同直线交于一点.

例12 有甲、乙、丙三种化肥，甲种化肥每千克含氮70克，磷8克，钾2克；乙种化肥每千克含氮64克，磷10克，钾0.6克；丙种化肥每千克含氮70克，磷5克，钾1.4克．若把此三种化肥混合，要求总重量23千克且含磷149克，钾30克，问三种化肥各需多少千克？

解 设甲、乙、丙三种化肥各需 x_1 、 x_2 、 x_3 千克，依题意得方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 23, \\ 8x_1 + 10x_2 + 5x_3 = 149, \\ 2x_1 + 0.6x_2 + 1.4x_3 = 30. \end{cases}$$

上页

下页

返回

此方程组的系数行列式 $D = -\frac{27}{5}$,

又 $D_1 = -\frac{81}{5}, \quad D_2 = -27, \quad D_3 = -81$

由克莱姆法则，此方程组有唯一解

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 5, \quad x_3 = 15.$$

即甲、乙、丙三种化肥各需3千克,5千克,
15千克.

上页

下页

返回

例13 设水银密度 h 与温度 t 的关系为

$$h(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3.$$

由实验测得以下数据:

t	0°	10°	20°	30°
h	13.60	13.57	13.55	13.52

求 $t = 15^\circ, 40^\circ$ 时水银密度(准确到小数两位).

解

将测得的数据分别代入 $h(t)$,得方程组

$$\begin{cases} a_0 = 13.6, \\ a_0 + 10a_1 + 100a_2 + 1000a_3 = 13.57, \\ a_0 + 20a_1 + 400a_2 + 8000a_3 = 13.55, \\ a_0 + 30a_1 + 900a_2 + 27000a_3 = 13.52. \end{cases} \quad (1)$$

将 $a_0 = 13.60$ 分别代入其余三个方程得方程组

$$\begin{cases} a_1 + 10a_2 + 100a_3 = -0.003, \\ 2a_1 + 40a_2 + 800a_3 = -0.005, \\ 3a_1 + 90a_2 + 2700a_3 = -0.008. \end{cases} \quad (2)$$

上页

下页

返回

此方程组的系数行列式 $D = 12000$,

又 $D_1 = -50$, $D_2 = 1.8$, $D_3 = -0.04$,

由克莱姆法则,得方程组(2)的唯一解

$$a_1 = -0.0042,$$

$$a_2 = 0.00015,$$

$$a_3 = -0.0000033.$$

又 $a_0 = 13.60$,将以上四个数代入 $h(t)$,得

$$h(t) = 13.60 - 0.0042t + 0.00015t^2 - 0.0000033t^3.$$

由此得

$$h(15) = 13.56, \quad h(40) = 13.46.$$

所以,当 $t = 15^\circ, 40^\circ$ 时,水银密度分别为13.56,13.46.

上页

下页

返回

第一章 测试题

一、填空题(每小题4分, 共40分)

1. 若 $D_n = |a_{ij}| = a$, 则 $D = |-a_{ij}| = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 设 x_1, x_2, x_3 是方程 $x^3 + px + q = 0$ 的三个根, 则行

列式
$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_3 & x_1 & x_2 \\ x_2 & x_3 & x_1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. 行列式

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1997 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1998 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

4. 四阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

5. 设四阶行列式 $D_4 = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ c & b & d & a \\ d & b & c & a \\ a & b & d & c \end{vmatrix}$,

则 $A_{14} + A_{24} + A_{34} + A_{44} = \underline{\hspace{2cm}}$

6. 在五阶行列式中 $a_{12}a_{53}a_{41}a_{24}a_{35}$ 的符号为 $\underline{\hspace{2cm}}$

7. 在函数 $f(x) = \begin{vmatrix} 2x & 1 & -1 \\ -x & -x & x \\ 1 & 2 & x \end{vmatrix}$ 中 x^3 的系数是 $\underline{\hspace{2cm}}$

8. 四阶行列式 $\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

9. 若 a, b 为实数, 则当 $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 且 $b = \underline{\hspace{1cm}}$ 时,

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

10. 排列 $i_1 i_2 \cdots i_{n-1} i_n$ 可经____次对换后变为排列 $i_n i_{n-1} \cdots i_2 i_1$.

二、计算下列行列式(每小题9分, 共18分).

$$1. D_5 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$2. D_n = \begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ z & x & y & \cdots & y \\ z & z & x & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x \end{vmatrix}$$

三、解答题 (9
分) 问 λ, μ 取何值, 齐次方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \mu x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2\mu x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解?

四、证明(每小题8分, 共24分).

$$1. \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix} = 0;$$

$$2. D_n = \begin{vmatrix} 2\cos\theta & 1 & & & \\ 1 & 2\cos\theta & 1 & & \\ & 1 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 1 & 2\cos\theta & 1 \\ & & & & 1 & 2\cos\theta \end{vmatrix}$$

$$= \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta};$$

3. 用数学归纳法证明

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^n & x_2^n & x_3^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$$

$$= (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j), (n \geq 2)$$

五、(9分) 设 n 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$$

求第一行各元素的代数余子式之和

$$A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n}.$$

上页

下页

返回

测试题答案

一、1. $(-1)^n a$; 2. 0; 3. $-1998!$;
4. $(a_2 a_3 - b_2 b_3)(a_1 a_4 - b_1 b_4)$; 5. 0;
6. $-$; 7. -2 ; 8. $(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2$;
9. 0,0; 10. $\frac{n(n-1)}{2}$.

二、1. -170 ; 2. $\frac{y(x-z)^n - z(x-y)^n}{y-z}$.

三、 $\lambda = 0$ 或 $\mu = 0$. 五、 $n! \left(1 - \sum_{j=2}^n \frac{1}{j} \right)$.

上页

下页

返回