일만사 참여인력 의무교육 · 시험 참고자료

기본교육 답안

최초 1회 · 8시간 · 의사·케어코디네이터 공통

정답은 **색 표시**

정답 한눈에

1 ①	2 ②	3 ⑤	4 ⑤	5 ②	6 ④	7 ⑤	8 ④	9 ①	10 ②

Q1 일차의료기관 만성질환관리 시범사업이 본사업으로 바뀌면 달라지는 점으로 적절하지 않은 것은?

① 환자본인부담률은 그대로 10%이다. ✔

② 검진 바우처가 없어진다.

③ 서비스제공자 교육이 의무화된다.

④ 환자에게 건강생활실천지원금이 지급된다.

Q2 건강생활실천지원금 사업에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 보건복지부에서 추진 총괄한다.

② 건강보험심사평가원에서 사업 운영 및 관리를 한다. ✔

③ 예방형과 관리형이 있다.

④ 국민건강보험공단 홈페이지나 모바일앱을 통하여 참여 신청 가능하다.

Q3 다음 중 약물 부작용 위험 요인에 해당되는 것은?

① 6개 이상의 진단명 및 9개 이상의 약물 복용

② 이전 약물 부작용의 과거력

③ 마른체중

④ 신장기능 저하

⑤ 위의 전부 ✔

Q4 노인 고혈압/당뇨약 처방 시 주의해야 할 것으로 틀린 것을 고르시오.

① 심혈관질환 위험이 중저위험군에 해당하는 노인에게 아스피린은 사용하지 않는다.

② 사구체 여과율 저하가 심한 환자에게 메트포르민 사용을 주의한다.

③ 적응증에 해당할 경우 노인에게서도 항고혈압약제로 이뇨제를 쓸 수 있으나 저나트륨혈증에 주의한다.

④ 이뇨제와 베타차단제의 병합은 당뇨 발생이 증가하므로 권고하지 않는다.

⑤ 환자가 먹던 약을 계속 그대로 달라고 하면 그냥 그대로 준다. ✔

Q5 고혈압의 기준에 해당되지 않는 것은?

① 진찰실 혈압 ≥ 140/90 mmHg

② 24시간 활동혈압 낮평균 혈압 ≥ 130/80 mmHg ✔

③ 가정혈압 평균혈압 ≥ 135/85 mmHg

④ 24시간 활동혈압 24시간 평균 혈압 ≥ 130/80 mmHg

Q6 고혈압 치료의 효과에 해당되지 않는 것은?

① 뇌졸중 30–40% 감소

② 허혈성 심질환 15–20% 감소

③ 심부전의 발생위험을 28% 감소

④ 중년 이상의 고혈압에서는 치매 예방효과는 없다 ✔

Q7 고혈압 환자에서 약물치료 지속성에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 방법으로 적합하지 않은 것은?

① 공유의사결정

② 권한이양

③ 동기강화를 겸한 교육

④ 팀단위 진료

⑤ 환자의 선택권 제한 ✔

Q8 체계적 고찰과 메타분석 결과, 자가혈압측정 자체는 혈압조절 개선과 관련성이 없으나 ( )를 병행하면 효과가 있다. 빈칸에 가장 적합한 것은?

① 생활요법 상담

② 운동방법 교육

③ 자가혈압 측정방법 교육

④ 측정결과 상담에 의한 처방변경과 생활요법 상담 ✔

⑤ 혈압측정결과 상담

Q9 당뇨병 진단기준 중 맞는 것은?

① 공복 혈장포도당 ≥ 126 mg/dL ✔

② HbA1c ≥ 7.0%

③ 75g 경구포도당부하 2시간 후 혈당 포도당 ≥ 190 mg/dL

④ 전형적인 증상이 있으면서 무작위 혈장포도당 ≥ 210 mg/dL

⑤ 전형적인 증상이 있으면서 무작위 혈장포도당 ≥ 220 mg/dL

Q10 고구마 1개와 같은 탄수화물 함량은?

① 밥 1/3 공기

② 밥 2/3 공기 ✔

③ 밥 1공기

④ 자장면 1그릇

⑤ 칼국수 1그릇

일만사 참여인력 의무교육 · 시험 참고자료

심화교육 답안

매년 1회 보수교육 · 4시간

정답은 **색 표시**

정답 한눈에

1 ③	2 ⑤	3 ②	4 ③	5 ③	6 ②	7 ②	8 ③	9 ④	10 ③

Q1 다음 중 초단기작용 인슐린은?

① 글라진
② 레버미어
③ 아스파트 ✔
④ 데글루덱
⑤ 레귤러인슐린

Q2 70세 환자가 고혈당으로 입원해 하루 4회 인슐린 주사를 맞던 중 심계항진, 기력저하를 호소했다. 측정 혈당 64 mg/dL. 가장 적절한 조치는?

① 생리식염수를 정맥 투여한다.
② 인슐린 투여를 2–3일간 중단한다.
③ 50% 포도당 수액을 즉시 투여한다.
④ 초콜릿이나 아이스크림을 즉시 먹게 한다.
⑤ 오렌지주스 한 잔을 먹게 하고 15분 뒤 혈당을 재측정한다. ✔

Q3 GLP-1 수용체 작용제의 특징으로 옳은 것은?

① 체중 증가의 부작용이 있다.
② 오심, 구토의 부작용이 있다. ✔
③ 만성 콩팥병 환자에게 금기이다.

Q4 심부전이 있는 72세 당뇨병 환자에서 혈당 조절을 위해 우선적으로 추천되는 약제는?

① DPP4 억제제
② GLP1 수용체작용제
③ SGLT2 억제제 ✔
④ 메트포민
⑤ 싸이아졸리딘다이온

Q5 신기능저하 환자에 약물 처방 용량 조정이 필요 없는 약제는?

① Acarbose
② Empagliflozin
③ Gemigliptin ✔
④ Sitagliptin
⑤ Vildagliptin

Q6 대한고혈압학회에서 고혈압 환자에게 권장한 하루 소금 섭취량은?

① 5 g 이하
② 6 g 이하 ✔
③ 10 g 이하
④ 15 g 이하

Q7 고혈압 환자의 체중관리 관련 권고 사항이다. 틀린 것은?

① 운동과 절주, 소금 섭취 제한이 체중 감량에 효과적이다.
② 고위험 환자의 경우 간헐적 단식을 통한 체중 감량을 적극 권고한다. ✔

Q8 고혈압 환자에서 금연의 효과에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 우리나라의 흡연률은 남성은 세계최고, 여성은 세계최저에 속한다.
② 간접 흡연도 혈압을 상승시킨다.
③ 전자 담배는 안전하다. ✔
④ 금연 후 체중증가가 자주 동반되므로 주의해야 한다.

Q9 대한고혈압학회 권고안의 심혈관 위험도 평가에서, 다음 위험 요인 중 가중치가 다른 것은?

① 흡연
② 고콜레스테롤혈증
③ 비만
④ 65세 이상 ✔

Q10 고혈압 환자의 검사 소견 중 무증상 고혈압성 장기 손상에 부합하는 것은?

① eGFR 65 ml/min/1.73m^2
② Premature ventricular beats (PVC)
③ Carotid plaque 1.2 mm ✔
④ Retinopathy Grade II