急诊新版押题卷

急诊新版押题卷（100题）

> 来源：最终产物\batch046\ALL_questions_FIXED.json | 导出：2026-11-01 18:11
> 生成状态：DONE｜发布状态：READY
> 可发布核心：100 题｜待人工复核：0 题｜已隔离：0 题
> 注：发布前仍需用户签收；生成完成/READY 不等于医学发布授权（HC-28）。
> 题型分布：A2×45、A1×30、A3×25
> Bloom分布：应用×35、理解×25、记忆×20、分析×20

M01（14题）

1. [A1型题｜理解] batch046-Q001

> 模块：M01｜页码：教材P1

[正选] 评价急救医疗服务体系中院前与院内环节是否有效衔接，下列哪项最能体现急诊医学的核心目标?

- A. 增加择期门诊数量
- B. 延长院前观察时间
- **C. 早期救治并保护脏器** ✅
- D. 优先完成慢病随访
- E. 优先完成常规体检

答案：C

---

2. [A1型题｜应用] batch046-Q002

> 模块：M01｜页码：教材P2

[正选] 按教材急诊五级分诊，已确定为 II 类的病人应安排在哪个时限内评估和治疗?

- A. 立即抢救

- B. 30分钟内
- C. 1小时内
- **D. 10分钟内** ✅
- E. 2小时内

答案：D

---

3. [A1型题｜记忆] batch046-Q003

> 模块：M01｜页码：教材P286–287

[正选] 按教材灾难现场四色分拣，存活可能性极小、无法救治者对应的标签颜色是？

- A. 红色标签
- B. 黄色标签
- C. 绿色标签
- D. 蓝色标签
- **E. 黑色标签** ✅

答案：E

---

4. [A1型题｜记忆] batch046-Q004

> 模块：M01｜页码：教材P286

[正选] 教材成人START快速检伤口诀中的“可以-做”指评估伤员的哪种能力？

- A. 自主饮水的能力
- B. 自行止血的能力
- **C. 遵从指挥的能力** ✅
- D. 独立转运的能力
- E. 报告病史的能力

答案：C

---

5. [A1型题｜理解] batch046-Q005

> 模块：M01｜页码：教师补充；教材对应内容待核

[正选] 依教师补充的SALT分类，先按能走、能挥手或无反应区分伤员，主要服务于哪个环节？

- **A. 全局排序** ✅
- B. 个体评估
- C. 救命干预
- D. 确定性治疗
- E. 后续转运

答案：A

---

6. [A1型题｜分析] batch046-Q006

> 模块：M01｜页码：教材P3、P285

[正选] 灾难现场仍有坍塌风险，伤员数量超过救治能力。综合教材救援原则，哪一策略最合理？

- A. 先完成诊断再组织脱险
- B. 集中资源于单一重伤员
- C. 先按到达顺序逐一救治
- **D. 先脱离险境再分拣救治** ✅
- E. 先全面检查再实施转运

答案：D

---

7. [A1型题｜应用] batch046-Q007

> 模块：M01｜页码：教材P18

[正选] 按教材GCS评分，伤员疼痛刺激睁眼、言语不连贯、刺激时能定位，其总分为多少？

- A. 8分
- **B. 10分** ✅
- C. 11分
- D. 12分

- E. 13分

答案：B

---

8. [A1型题｜理解] batch046-Q062

> 模块：M01｜页码：教材印刷页P1-2，原文待核

[正选] 急诊医疗服务体系强调院前急救、医院急诊和重症监护相衔接，其主要目的是什么？

- A. 将院前救治替换为长期随访
- B. 将重症监护替换为择期门诊
- C. 将医院急诊替换为社区慢病管理
- **D. 实现危重患者救治环节连续衔接** ✅
- E. 实现危重患者只在现场接受救治

答案：D

---

9. [A2型题｜分析] batch046-Q063

> 模块：M01｜页码：教材印刷页P2，原文待核

[正选] 患者在急诊候诊区突然意识丧失，呼之不应，无正常呼吸，未触及颈动脉搏动。根据教师重点中的急诊五级分诊，应优先采取何种处理？

- A. 安排非紧急门诊评估
- B. 安排潜在危重常规候诊
- C. 安排延迟评估后再处理
- D. 安排生命体征复查后候诊
- **E. 归为生命垂危立即抢救** ✅

答案：E

---

10. [A1型题｜理解] batch046-Q064

> 模块：M01｜页码：教材印刷页P285-287，原文待核

[正选] 灾难检伤分类中的黄色标记，表示伤员应获得怎样的救治优先级？

- **A. 第二优先，延迟救治** ✅
- B. 第一优先，紧急救治
- C. 第三优先，等待救治
- D. 零优先，期待救治
- E. 第一优先，等待救治

答案：A

---

11. [A2型题｜应用] batch046-Q065

> 模块：M01｜页码：教材印刷页P286，待逐字核对

[正选] 地震后成人伤员不能自行行走，呼吸频率每分钟24次，桡动脉搏动可触及，能按指令握手，且无其他立即危及生命的伤情。按成人START检伤，宜归为何类？

- **A. 黄色，延迟救治** ✅
- B. 红色，立即救治
- C. 绿色，轻伤救治
- D. 黑色，期待救治
- E. 红色，期待救治

答案：A

---

12. [A2型题｜应用] batch046-Q066

> 模块：M01｜页码：教师补充，教材未载

[正选] 大规模事故现场实施SALT分类，救援者首先要求伤员自行走向指定区域，以便快速区分能走者与其他伤员。这一步属于哪一环节？

- A. 伤员详细诊断
- B. 治疗及转运
- **C. 全局排序** ✅
- D. 个体生命评估
- E. 救命干预

答案：C

---

13. [A2型题｜分析] batch046-Q067

> 模块：M01｜页码：教材印刷页P3、P285，原文待核

[正选] 建筑坍塌后仍有坠落危险，现场多名伤员，救援资源有限。专业人员完成自身防护并确认可安全实施转移后，哪项总体策略最符合灾难医学原则？

- A. 停留危险区逐人完成全部手术
- B. 集中全部资源救治单名重伤员
- C. 忽略其余伤员先处理轻伤人员
- D. 所有伤员按抵达顺序统一救治
- **E. 先脱离危险再分检并分配资源** ✅

答案：E

---

14. [A1型题｜应用] batch046-Q068

> 模块：M01｜页码：教材印刷页P18，原文待核

[正选] 格拉斯哥昏迷评分中，患者睁眼反应3分、言语反应4分、运动反应5分，其总分为？

- A. 11分
- **B. 12分** ✅
- C. 13分
- D. 14分
- E. 15分

答案：B

M02（16题）

15. [A3型题｜记忆] batch046-Q008

> 模块：M02｜页码：教材印刷页P65、P235

根据心电监护表现，最可能的初始心律是什么？

- A. 窦性心动过缓
- B. 心房扑动
- **C. 心室颤动** ✅
- D. 室上性心动过速
- E. 完全性房室传导阻滞

答案：C

---

16. [A3型题｜记忆] batch046-Q009

> 模块：M02｜页码：教材印刷页P235

按教材成人高质量胸外按压要求，频率单位为次/分，深度单位为cm。哪组数值合适？

- A. 80～100；2～3
- B. 80～100；5～6
- C. 100～120；2～3
- **D. 100～120；5～6** ✅
- E. 130～150；7～8

答案：D

---

17. [A3型题｜理解] batch046-Q010

> 模块：M02｜页码：教材印刷页P235

一名救护者准备将掌根置于胸部。为有效传递按压力并避免偏离推荐位置，最适宜选择哪里？

- A. 胸骨剑突正中
- **B. 胸骨中下1/3处** ✅

- C. 左侧第五肋间腋中线
- D. 胸骨柄上端正中
- E. 左侧锁骨中线第二肋间

答案：B

---

18. [A3型题｜理解] batch046-Q011

> 模块：M02｜页码：教材印刷页P236–237

两名救护者在尚未建立高级气道时配合实施复苏。哪种按压与通气安排符合教材？

- A. 连续按压不暂停，通气每分钟20次
- **B. 每30次按压后给予2次通气** ✅
- C. 每15次按压后给予2次通气
- D. 每5次按压后给予1次通气
- E. 仅通气2分钟后再开始按压

答案：B

---

19. [A3型题｜应用] batch046-Q012

> 模块：M02｜页码：教材印刷页P235、P237

除颤器为单相波机型，救护团队已确认室颤并确保所有人员不接触患者。按教材，首次电击后立即开始并持续约2分钟的处理，及电击能量，哪项组合最恰当？

- A. 120 J；检查脉搏
- B. 200 J；等待心律恢复
- C. 360 J；监测心律变化
- **D. 360 J；进行心肺复苏** ✅
- E. 360 J；继续同步电复律

答案：D

---

20. [A2型题｜记忆] batch046-Q013

> 模块：M02｜页码：教材P237

[正选] 患者心搏骤停，准备按教材常规前外侧位置放置除颤电极。右侧电极已置于右锁骨下，左侧电极应放在哪里？

- A. 左锁骨下区
- B. 左胸骨旁区
- C. 右乳头侧腋中线
- D. 左乳头侧锁骨中线
- **E. 左乳头侧腋中线** ✅

答案：E

---

21. [A1型题｜应用] batch046-Q014

> 模块：M02｜页码：教材P236

[正选] 怀疑颈椎受伤的伤员需要开放气道，固定头颈时应优先采用哪种手法？

- A. 仰头抬颏法
- B. 腹部冲击法
- C. 胸部冲击法
- **D. 双手托颌法** ✅
- E. 单人转头法

答案：D

---

22. [A2型题｜应用] batch046-Q015

> 模块：M02｜页码：教材P239

[正选] 妊娠末期女性进食时突发完全气道异物梗阻，意识清醒，救助者无法环抱其腰部。依教材应选择哪种解除梗阻方法？

- A. 上腹部冲击
- B. 下腹部冲击

- C. 侧腹部冲击
- **D. 胸骨中线冲击** ✅
- E. 剑突部位冲击

答案：D

---

23. [A1型题｜应用] batch046-Q069

> 模块：M02｜页码：教材印刷页P231-233，原文待核

[正选] 判断成人是否发生心搏骤停时，哪组表现应促使现场人员立即启动复苏？

- A. 意识清楚、呼吸急促、脉搏快
- B. 意识清楚、呼吸平稳、脉搏弱
- **C. 无反应、无正常呼吸、无大动脉搏动** ✅
- D. 能回应、呼吸缓慢、有大动脉搏动
- E. 能回应、呼吸急促、有大动脉搏动

答案：C

---

24. [A1型题｜理解] batch046-Q070

> 模块：M02｜页码：教材印刷页P235，原文待核

[正选] 成人胸外按压时，为什么应在每次按压后允许胸廓充分回弹？

- A. 减少按压频率波动
- B. 减少除颤电量损失
- C. 避免监护电极脱落
- D. 避免人工通气中断
- **E. 促进静脉回流及心脏充盈** ✅

答案：E

---

25. [A2型题｜理解] batch046-Q071

> 模块：M02｜页码：教材印刷页P235，原文待核

[正选] 一名成人突然倒地，确认心搏骤停。救护者准备实施胸外按压，为选择推荐的掌根位置，应置于何处？

- **A. 胸骨中下三分之一处** ✅
- B. 胸骨柄上端正中处
- C. 胸骨剑突正中处
- D. 左侧腋中线第五肋间
- E. 右侧锁骨下方胸壁处

答案：A

---

26. [A2型题｜应用] batch046-Q072

> 模块：M02｜页码：教材印刷页P236，原文待核

[正选] 院内两名受训人员对成人心搏骤停患者实施心肺复苏，患者尚未建立高级气道，球囊面罩通气有效。应采用哪种按压与通气配合？

- A. 每5次按压后通气1次
- B. 每10次按压后通气1次
- C. 每15次按压后通气2次
- **D. 每30次按压后通气2次** ✅
- E. 仅按压而停止所有通气

答案：D

---

27. [A2型题｜理解] batch046-Q073

> 模块：M02｜页码：教材P237

一名成人因心室颤动接受除颤，现场使用双相波除颤器。按教材，首次电击应选择的能量范围是？

- **A. 双相波120～200J** ✅
- B. 单相波120～200J

- C. 双相波360J
- D. 单相波200J
- E. 双相波50J

答案：A

---

28. [A2型题｜分析] batch046-Q074

> 模块：M02｜页码：教材P237

一名成人发生心室颤动，急救者已将一个除颤电极贴在右锁骨下区。按教材前外侧电极位置，另一个电极应贴在哪里？

- A. 左锁骨下区
- B. 左胸骨左缘
- C. 左乳头正上方
- **D. 左乳头侧腋中线** ✅
- E. 左肩胛下区

答案：D

---

29. [A2型题｜理解] batch046-Q075

> 模块：M02｜页码：教材P244/P256

一名车祸伤员发生心搏骤停，现场怀疑颈椎损伤。按教材，开放气道时应优先采用哪种手法？

- A. 仰头抬颏法
- B. 压额抬颏法
- C. 环甲膜穿刺
- D. 气管内插管
- **E. 双手托颌法** ✅

答案：E

---

30. [A2型题｜应用] batch046-Q076

> 模块：M02｜页码：教材P239-240

一名过度肥胖成人进食时突发完全气道异物梗阻，意识清醒，救助者无法环抱其腰部。按教材应选择哪种解除梗阻方法？

- A. 腹部冲击法
- **B. 胸部冲击法** ✅
- C. 背部拍击法
- D. 立即催吐
- E. 环甲膜穿刺

答案：B

M03（12题）

31. [A3型题｜应用] batch046-Q016

> 模块：M03｜页码：教材P148

[正选] 结合该患者的表现，休克导致意识和尿量变化的共同病理生理基础最可能是什么？

- A. 全身组织氧耗减少
- **B. 组织微循环灌注不足** ✅
- C. 全身血红蛋白合成增加
- D. 组织毛细血管持续扩张
- E. 全身组织氧供增加

答案：B

---

32. [A3型题｜分析] batch046-Q017

> 模块：M03｜页码：教材P148、P154

[正选] 根据损伤经过及循环表现，当前休克病因分类最可能是什么？

- A. 心源性休克

- B. 感染性休克
- C. 过敏性休克
- **D. 低血容量性休克** ✅
- E. 神经源性休克

答案：D

---

33. [A3型题｜应用] batch046-Q018

> 模块：M03｜页码：教材P154

[正选] 假设无其他休克机制，患者的中心静脉压、心输出量及外周血管阻力最可能如何变化？

- A. 升高、升高、降低
- B. 升高、降低、降低
- C. 升高、降低、升高
- D. 降低、升高、降低
- **E. 降低、降低、升高** ✅

答案：E

---

34. [A3型题｜应用] batch046-Q019

> 模块：M03｜页码：教材P152–153

[正选] 在持续控制出血并准备成分输血的同时，按教材休克一般治疗原则，初始液体复苏以何种液体为主？

- A. 低渗葡萄糖液
- B. 高渗氯化钠液
- C. 高渗葡萄糖液
- **D. 等渗晶体液** ✅
- E. 人工胶体液

答案：D

---

35. [A3型题｜理解] batch046-Q020

> 模块：M03｜页码：教材P153

[正选] 按教材一般休克治疗原则，关于血管活性药物在该患者处理中的作用，最恰当的理解是什么？

- A. 代替止血纠正病因
- B. 代替补液补充血量
- **C. 补足血量后按病情使用** ✅
- D. 仅凭心率加快就使用
- E. 血压正常后常规使用

答案：C

---

36. [A2型题｜分析] batch046-Q021

> 模块：M03｜页码：教材印刷页P待核

严重创伤后在早期即出现两个器官功能障碍，且与直接组织损伤相关。关于该综合征的判断，最合适的是？

- **A. 原发性MODS** ✅
- B. 继发性MODS
- C. 单器官功能障碍
- D. 慢性多器官衰竭
- E. 不可逆器官衰竭

答案：A

---

37. [A2型题｜分析] batch046-Q077

> 模块：M03｜页码：教材P148

一名患者大量失血后出现血压下降、尿量偏少、四肢湿冷和乳酸升高。最能解释这些表现的共同病理生理基础是？

- A. 心泵功能衰竭
- B. 外周血管阻力升高

- C. 毛细血管通透性增加
- **D. 有效循环血容量减少** ✅
- E. 血红蛋白携氧下降

答案：D

---

38. [A1型题｜记忆] batch046-Q078

> 模块：M03｜页码：教材P148

按病因分类，下列哪项属于休克的常见类型？

- A. 慢性贫血
- B. 高血压急症
- C. 甲状腺功能亢进
- D. 急性肾小球肾炎
- **E. 神经源性** ✅

答案：E

---

39. [A2型题｜分析] batch046-Q079

> 模块：M03｜页码：教材P153-154

一名患者大量失血后，中心静脉压降低、心输出量下降、外周血管阻力增加、心率加快。最符合哪种休克？

- A. 心源性休克
- **B. 低血容量性休克** ✅
- C. 感染性休克
- D. 过敏性休克
- E. 神经源性休克

答案：B

---

40. [A2型题｜记忆] batch046-Q080

> 模块：M03｜页码：教材P152

一名失血性休克患者已完成出血控制，尚无明显心衰。按教材休克一般治疗原则，初始抗休克的基本治疗是？

- A. 立即大量输血
- **B. 等渗晶体液补液** ✅
- C. 首选血管活性药
- D. 大剂量糖皮质激素
- E. 立即手术探查

答案：B

---

41. [A2型题｜分析] batch046-Q081

> 模块：M03｜页码：教材P153

一名感染性休克患者经充分液体复苏后平均动脉压仍约55mmHg。按教材，下一步血管活性药物方案最合适的是？

- A. 立即静脉大剂量多巴胺
- B. 补液前先静脉升压药
- **C. 去甲肾上腺素+多巴酚丁胺** ✅
- D. 立即静脉首选肾上腺素
- E. 等待血压自行恢复

答案：C

---

42. [A2型题｜应用] batch046-Q082

> 模块：M03｜页码：教材P209-211

一名严重创伤患者伤后早期即出现呼吸衰竭和少尿型肾衰竭，器官功能障碍与直接组织损伤相关。最符合哪种情况？

- **A. 原发性MODS** ✅

- B. 继发性MODS
- C. 慢性肾功能衰竭
- D. 单器官功能障碍
- E. 脓毒症性休克

答案：A

M04（14题）

43. [A1型题｜应用] batch046-Q022

> 模块：M04｜页码：教材印刷页P待核

一名患者误服清洁剂后就诊，生命体征暂时稳定，随后昏迷。若经评估有洗胃指征，下列处理原则最合适的是？

- A. 立即诱发呕吐
- B. 口服腐蚀剂后洗胃
- **C. 保护气道后再洗胃** ✅
- D. 仅以导泻代替处置
- E. 先洗胃再稳定生命体征

答案：C

---

44. [A1型题｜理解] batch046-Q023

> 模块：M04｜页码：教材印刷页P待核

一名患者因有机磷农药暴露出现流涎、缩瞳和支气管分泌物增多。首选的特异性解毒药物是？

- A. 纳洛酮
- **B. 阿托品** ✅
- C. 氟马西尼
- D. 亚甲蓝
- E. 依地酸钙钠

答案：B

45. [A3型题｜应用] batch046-Q024

> 模块：M04｜页码：教材印刷页P待核

结合该患者早期表现，最能解释其出汗、流涎和瞳孔改变的机制类别是？

- A. 烟碱型受体兴奋
- B. 肾上腺素能受体阻断
- C. 胆碱酯酶活性增高
- D. 多巴胺受体兴奋
- **E. 毒蕈碱型受体兴奋** ✅

答案：E

---

46. [A3型题｜记忆] batch046-Q025

> 模块：M04｜页码：教材印刷页P待核

该患者第3天出现颈屈肌和四肢近端无力，最符合哪一并发综合征的发生时间？

- **A. 急性中毒后1～4日** ✅
- B. 急性中毒后数分钟
- C. 急性中毒后2～3周
- D. 暴露前即出现
- E. 中毒恢复数月后

答案：A

---

47. [A3型题｜理解] batch046-Q026

> 模块：M04｜页码：教材印刷页P待核

该患者早期双侧瞳孔明显缩小，结合胆碱能表现，最支持哪种中毒？

- A. 阿托品中毒
- B. 氰化物中毒
- **C. 有机磷中毒** ✅

- D. 甲醇中毒
- E. 急性苯中毒

答案：C

---

48. [A3型题｜理解] batch046-Q027

> 模块：M04｜页码：教材印刷页P待核

若患者仍需胃内处理，以下哪种情形提示应避免洗胃？

- A. 清醒患者少量口服药物后1小时
- **B. 口服腐蚀性毒物后** ✅
- C. 误服普通片剂后2小时
- D. 无误吸风险且气道通畅
- E. 医生评估可保护气道时

答案：B

---

49. [A3型题｜记忆] batch046-Q028

> 模块：M04｜页码：教材印刷页P待核

患者嗜睡且分泌物增多、呼吸功能不足，最恰当的气道处理是？

- A. 等待毒物自然排出
- B. 常规倒挂患者控水
- C. 先口服大量清水
- D. 仅使用镇静药物
- **E. 及时气管插管并机械通气** ✅

答案：E

---

50. [A2型题｜分析] batch046-Q083

> 模块：M04｜页码：教材P159-160

一名患者口服强酸后就诊，意识清醒，生命体征暂稳定。按教材急性中毒处理原则，下列哪项最合适？

- A. 立即洗胃
- **B. 不宜洗胃** ✅
- C. 立即催吐
- D. 大量活性炭
- E. 立即手术

答案：B

---

51. [A2型题｜应用] batch046-Q084

> 模块：M04｜页码：教材P161

一名患者因阿片类药物过量出现呼吸抑制和针尖样瞳孔。按教材，首选的特异性解毒剂是？

- A. 阿托品
- B. 氟马西尼
- C. 亚甲蓝
- **D. 纳洛酮** ✅
- E. 碘解磷定

答案：D

---

52. [A2型题｜分析] batch046-Q085

> 模块：M04｜页码：教材P162-163

一名有机磷农药中毒患者血胆碱酯酶活力约35%。按教材分度，最符合哪一档？

- A. 轻度中毒
- B. 重度中毒
- C. 中毒前期
- **D. 中度中毒** ✅
- E. 无法分度

答案：D

53. [A1型题｜记忆] batch046-Q086

> 模块：M04｜页码：教材P163

急性有机磷中毒后，中间综合征通常发生在多长时间内？

- A. 数分钟至1小时
- B. 6小时以内
- **C. 1～4日** ✅
- D. 2周左右
- E. 1个月左右

答案：C

---

54. [A1型题｜应用] batch046-Q087

> 模块：M04｜页码：教材P158

一名患者出现双侧瞳孔缩小，最可能由下列哪类药物或毒物引起？

- A. 阿托品中毒
- **B. 有机磷农药** ✅
- C. 甲醇中毒
- D. 大麻中毒
- E. 氰化物中毒

答案：B

---

55. [A2型题｜理解] batch046-Q088

> 模块：M04｜页码：教材P160/P176

一名一氧化碳中毒患者意识恢复后，第2天再次出现意识障碍和认知改变。最可能的是？

- **A. 迟发性脑病** ✅
- B. 中间综合征
- C. 症状反跳

- D. 继发性癫痫
- E. 自发性脑出血

答案：A

---

56. [A2型题｜理解] batch046-Q089

> 模块：M04｜页码：教材P160/P176/P256

一名中毒昏迷患者需要洗胃，分泌物较多且呼吸功能不足。按教材，最重要的气道保护措施是？

- A. 仰卧位下洗胃
- B. 半坐位下洗胃
- C. 暂不进行洗胃
- D. 先行药物催吐
- **E. 头偏侧+口咽通气** ✅

答案：E

M05（20题）

57. [A3型题｜应用] batch046-Q029

> 模块：M05｜页码：教材印刷页P待核

根据患者体温40.8℃、皮肤干热和意识模糊，当前中暑分级是？

- A. 先兆中暑
- B. 轻症中暑
- C. 热痉挛
- D. 热衰竭
- **E. 热射病** ✅

答案：E

---

58. [A3型题｜理解] batch046-Q030

> 模块：M05｜页码：教材印刷页P待核

该患者最初仅口渴、乏力、多汗且体温正常或略高，属于哪一阶段？

- A. 热痉挛
- B. 轻症中暑
- **C. 先兆中暑** ✅
- D. 热衰竭
- E. 热射病

答案：C

---

59. [A3型题｜理解] batch046-Q031

> 模块：M05｜页码：教材印刷页P待核

病例中出现呕吐、皮肤湿冷、脉搏细数且体温升高，按教材分级最符合哪一阶段？

- A. 先兆中暑
- B. 热痉挛
- **C. 轻症中暑** ✅
- D. 热射病
- E. 低体温症

答案：C

---

60. [A3型题｜记忆] batch046-Q032

> 模块：M05｜页码：教材印刷页P待核

按教师重点所列热射病体温标准，核心体温达到何种水平并伴意识障碍时符合其典型描述？

- **A. 超过40.5℃** ✅
- B. 37.2℃
- C. 38.0℃
- D. 39.0℃

- E. 40.0℃

答案：A

---

61. [A3型题｜分析] batch046-Q033

> 模块：M05｜页码：教材印刷页P待核

对该患者实施降温时，符合教师重点的近期目标是？

- A. 尽快降至35℃以下
- B. 等待意识恢复再降温
- C. 24小时后才开始降温
- D. 仅擦拭四肢不降核心体温
- **E. 10～40分钟内降至39℃以下** ✅

答案：E

---

62. [A2型题｜应用] batch046-Q034

> 模块：M05｜页码：教材印刷页P待核

一名溺水者被救起后无有效呼吸，口鼻可见泥沙。现场最先采取的措施是？

- A. 倒挂患者反复控水
- B. 大量挤压腹部排水
- C. 先让患者步行排水
- **D. 清除口鼻异物并开放气道** ✅
- E. 等待自主呼吸恢复

答案：D

---

63. [A2型题｜记忆] batch046-Q035

> 模块：M05｜页码：教材印刷页P待核

触电者倒地，附近电线落在房屋地面。施救者接近前应采取哪项安全措施？

- A. 立即用手拉开电线
- B. 站在水洼中观察电线
- C. 室外保持2m以上距离
- D. 双脚大步跑离落地点
- **E. 室内保持4m以上距离** ✅

答案：E

---

64. [A2型题｜记忆] batch046-Q036

> 模块：M05｜页码：教材印刷页P待核

一名患者手背为Ⅰ～Ⅱ度小面积烫伤，已脱离热源。下列现场处理最合适的是？

- A. 立即刺破烧伤水疱
- **B. 用流动冷水冲洗创面** ✅
- C. 对烫伤处持续冰敷
- D. 在创面涂抹厚层油脂
- E. 用酒精反复擦洗创面

答案：B

---

65. [A2型题｜应用] batch046-Q037

> 模块：M05｜页码：教材印刷页P待核

被流浪犬咬伤，有出血并见唾液污染，属于III级暴露。应采取哪项措施？

- **A. 清洗创面、接种疫苗并给予被动免疫制剂** ✅
- B. 仅清洗创面并接种疫苗
- C. 仅清洗创面并给予被动免疫制剂
- D. 仅观察创面，不进行预防
- E. 待出现症状后再接种疫苗

答案：A

---

66. [A2型题｜分析] batch046-Q038

> 模块：M05｜页码：教材印刷页P待核

四肢大出血需现场使用止血带。下列做法符合规范的是？

- A. 直接缠在皮肤上
- **B. 垫衬后扎于近心端** ✅
- C. 用铁丝替代止血带
- D. 垫衬后扎于远心端
- E. 使用后不记录时间

答案：B

---

67. [A1型题｜记忆] batch046-Q090

> 模块：M05｜页码：教材P178-179

按教材中暑分级，重症中暑包括哪三型？

- A. 先兆、轻症、重症
- **B. 热痉挛、热衰竭、热射病** ✅
- C. 热痉挛、热晕厥、热休克
- D. 热射病、热衰竭、热昏迷
- E. 热痉挛、热衰竭、热昏迷

答案：B

---

68. [A2型题｜应用] batch046-Q091

> 模块：M05｜页码：教材P178

一名快递员在烈日下骑行数小时后，出现口渴、乏力、多汗、头晕，体温37.8℃，尚无意识障碍。其目前最可能的中暑阶段是？

- A. 热痉挛
- B. 热衰竭
- C. 热射病

- D. 轻症中暑
- **E. 先兆中暑** ✅

答案：E

---

69. [A2型题｜理解] batch046-Q092

> 模块：M05｜页码：教材P178-179

一名建筑工人在高温屋面连续作业后，出现恶心呕吐、大汗淋漓、皮肤湿冷、脉搏细数，体温38.5℃，神志清楚。其最符合的中暑类型是？

- A. 热痉挛
- B. 热衰竭
- C. 热射病
- D. 先兆中暑
- **E. 轻症中暑** ✅

答案：E

---

70. [A1型题｜分析] batch046-Q093

> 模块：M05｜页码：教材P179

按教材热射病处理原则，下列哪项是推荐的早期降温目标？

- **A. 10～40分钟降至39℃以下** ✅
- B. 2小时内降至39℃以下
- C. 10～40分钟降至38.5℃以下
- D. 24小时内降至38.5℃以下
- E. 2小时内降至38.5℃以下

答案：A

---

71. [A1型题｜应用] batch046-Q094

> 模块：M05｜页码：教材P177-178

重度淹溺患者体温常低于多少摄氏度？

- A. 26℃
- B. 28℃
- **C. 30℃** ✅
- D. 32℃
- E. 35℃

答案：C

---

72. [A1型题｜应用] batch046-Q095

> 模块：M05｜页码：教材P177-178

一名溺水者被救起后口鼻有泥沙、无有效呼吸。按教材现场处理，最先应做什么？

- A. 先行倒挂控水
- B. 先给氧并保暖
- **C. 清理口鼻+开放气道** ✅
- D. 等待急救车到达
- E. 立即喂温开水

答案：C

---

73. [A1型题｜记忆] batch046-Q096

> 模块：M05｜页码：教材P189

电线落地时，室内人员与落地点至少应保持多大安全距离？

- **A. 4m** ✅
- B. 6m
- C. 8m
- D. 10m

- E. 12m

答案：A

---

74. [A2型题｜记忆] batch046-Q097

> 模块：M05｜页码：教材P187/P309

一名患者手背Ⅰ～Ⅱ度小面积烫伤，已脱离热源。按教材现场处理，最合适的是？

- A. 涂牙膏降温
- B. 刺破水疱放液
- **C. 冷水冲洗或浸泡** ✅
- D. 涂油脂药膏
- E. 立即密封包扎

答案：C

---

75. [A2型题｜分析] batch046-Q098

> 模块：M05｜页码：教材P192

一名患者被流浪犬咬伤后出血，伤口见唾液污染，属于III级暴露。按教材应如何处理？

- **A. 伤口处理+疫苗+被动免疫** ✅
- B. 仅做伤口清洗消毒
- C. 仅接种狂犬病疫苗
- D. 仅注射被动免疫制剂
- E. 观察无需特殊处理

答案：A

---

76. [A2型题｜分析] batch046-Q099

> 模块：M05｜页码：教材P282

一名四肢大出血伤员需现场使用止血带。按教材，下列哪项做法正确？

- A. 直接缠在皮肤表面
- B. 用电线代替止血带
- **C. 伤口上方5cm扎止血带** ✅
- D. 超过6小时不放松
- E. 不垫衬直接勒紧皮肤

答案：C

M06（9题）

77. [A3型题｜理解] batch046-Q039

> 模块：M06｜页码：教材印刷页P待核

有关多发伤的定义，下列哪项符合教师重点？

- A. 单一部位轻微擦伤
- B. 慢性疾病急性加重
- C. 仅有一处骨折损伤
- **D. 同一致伤因素致多部位严重损伤** ✅
- E. 仅限胸部的闭合损伤

答案：D

---

78. [A3型题｜应用] batch046-Q040

> 模块：M06｜页码：教材印刷页P待核

面对该患者，初级评估的第一顺序及处理重点是什么？

- A. 先详细询问既往史再处理
- **B. 先处理气道并保护颈椎** ✅
- C. 先完成全身影像学检查
- D. 先让患者站立评估步态
- E. 先处理所有非致命擦伤

答案：B

---

79. [A3型题｜分析] batch046-Q041

> 模块：M06｜页码：教材印刷页P255–257

[正选] 初步控制外出血并保持气道通畅后，患者呼吸困难迅速加重，右侧呼吸音消失、叩诊鼓音，血压进行性下降。对于右侧胸部异常，最应优先排查的致命损伤是？

- A. 单纯肋骨骨折
- B. 单纯胸壁挫伤
- **C. 张力性气胸** ✅
- D. 稳定性胸椎骨折
- E. 局限性皮下血肿

答案：C

---

80. [A3型题｜应用] batch046-Q042

> 模块：M06｜页码：教材P257；连枷胸具体处理对应原文页码待核

[正选] 控制外出血、开放气道并处理其他即刻致命伤后，左前胸浮动胸壁仍造成明显通气不足。按教师重点，对这一损伤最合适的进一步支持是？

- A. 仅对受伤部位热敷
- B. 仅对受伤部位按摩
- **C. 稳定受损部位并辅助通气** ✅
- D. 延迟通气直至骨折愈合
- E. 鼓励患者屏气减轻疼痛

答案：C

---

81. [A3型题｜记忆] batch046-Q043

> 模块：M06｜页码：教材印刷页P257

[正选] 随后检查发现右侧胸壁另有与胸膜腔相通的开放创口。按本课程第4版教材，封闭该创口所用凡士林油纱布层数为？

- A. 1～2层
- B. 2～3层
- C. 3～4层
- **D. 5～6层** ✅
- E. 7～8层

答案：D

---

82. [A2型题｜理解] batch046-Q044

> 模块：M06｜页码：教材页码待核

[正选] 胸部创伤患者呼吸困难迅速加重，一侧呼吸音消失、叩诊呈鼓音，血压下降，临床高度怀疑张力性气胸。下列哪项最符合教师重点所列的紧急处理原则？

- **A. 立即胸腔减压并高流量吸氧** ✅
- B. 等待影像检查后再考虑任何处理
- C. 仅给予镇痛后观察
- D. 以腹部加压代替胸腔减压
- E. 嘱患者屏气减少漏气

答案：A

---

83. [A2型题｜应用] batch046-Q045

> 模块：M06｜页码：教材页码待核

[正选] 患者被车辆撞击后骨盆疼痛、活动受限，疑有骨盆骨折；现场已完成危及生命问题的初步处理，准备采用仰卧位搬运。下列哪项最符合教师重点？

- **A. 屈髋屈膝垫软物，固定骨盆后平托** ✅
- B. 让患者自行行走评估稳定性
- C. 一人抬胸、一人抬腿搬运
- D. 反复挤压骨盆直至疼痛减轻

- E. 强制坐起并旋转患者躯干

答案：A

---

84. [A1型题｜理解] batch046-Q046

> 模块：M06｜页码：教材页码待核

[正选] 关于创伤现场处理，下列哪项符合避免加重损伤的原则？

- A. 将外露骨折端立即推回伤口
- B. 将脱出的腹腔脏器直接塞回腹腔
- C. 用铁丝直接捆扎肢体止血
- D. 对疑似脊柱骨折者采用拉车式搬运
- **E. 覆盖保护脱出脏器，暂不还纳** ✅

答案：E

---

85. [A1型题｜应用] batch046-Q100

> 模块：M06｜页码：教材P255

按教材，多发伤的定义是？

- A. 两个以上器官慢性疾病
- B. 同一解剖部位多处损伤
- C. 多处软组织严重损伤
- **D. 同一致伤因素≥2部位严重伤** ✅
- E. 两次不同事故所致损伤

答案：D

M07（8题）

86. [A2型题｜应用] batch046-Q047

> 模块：M07｜页码：教材页码待核

[正选] 患者持续胸痛2小时，心电图提示ST段抬高型心肌梗死；具备介入条件，预计120分钟内可完成经皮冠状动脉介入治疗。按教师重点应优先选择哪项再灌注策略？

- A. 仅观察，不实施再灌注
- B. 仅给予药物止痛治疗
- C. 等待12小时后再决定
- **D. 直接行PCI再灌注治疗** ✅
- E. 常规先溶栓，排除直接介入

答案：D

---

87. [A2型题｜分析] batch046-Q048

> 模块：M07｜页码：教材页码待核

[正选] 患者血压220/130mmHg，突然发生撕裂样胸背痛，增强CT证实主动脉夹层。按教师重点，结合灌注状态监测，下列血压处理目标最合适的是？

- **A. 收缩压控制在100～110mmHg** ✅
- B. 收缩压立即降至60mmHg以下
- C. 收缩压持续维持200mmHg以上
- D. 只处理疼痛，血压不需干预
- E. 收缩压目标定为180～200mmHg

答案：A

---

88. [A2型题｜应用] batch046-Q049

> 模块：M07｜页码：教材页码待核

[正选] 患者既往心功能不全，突发端坐呼吸、咳粉红色泡沫痰，双肺湿啰音明显，血压稳定，考虑急性左心衰伴肺水肿。按教师重点，可选择的静脉利尿药及剂量是？

- A. 呋塞米0.2～0.4mg
- B. 呋塞米200～400mg作为常规起始量
- C. 阿托品20～40mg
- D. 肾上腺素20～40mg
- **E. 呋塞米20～40mg** ✅

答案：E

---

89. [A2型题｜应用] batch046-Q050

> 模块：M07｜页码：教材页码待核

[正选] 患者反复短暂意识丧失，发作时面色苍白，监护显示心室率约30次/分，发作后意识恢复。该意识丧失最可能的直接机制是？

- A. 持续性高血糖引起的脱水
- **B. 心排血量下降致脑灌注不足** ✅
- C. 局部皮肤血流量增加
- D. 胃酸分泌明显增加
- E. 慢性肾功能损害直接导致瞬时脑缺血

答案：B

---

90. [A2型题｜理解] batch046-Q051

> 模块：M07｜页码：教材页码待核

[正选] 哮喘患者在休息时明显气短，只能讲单个字，大汗，呼吸32次/分，脉率126次/分，室内空气血氧饱和度89%。对其病情的判断最恰当的是？

- A. 症状轻微，可仅凭能说话排除危重
- B. 单纯焦虑，不需要监测氧合
- C. 肺功能处于正常水平
- D. 呼吸增快可排除哮喘加重

- **E. 符合重症发作，应治疗监测** ✅

答案：E

---

91. [A2型题｜应用] batch046-Q052

> 模块：M07｜页码：教材页码待核

[正选] 脓毒症患者急性呼吸衰竭，影像示双肺浸润，PaO2/FiO2为150mmHg，评估认为呼吸衰竭不能完全用心力衰竭或容量负荷过多解释，已诊断ARDS并需机械通气。按教师重点，合适的初始潮气量范围是？

- **A. 6～8ml/kg** ✅
- B. 15～20ml/kg
- C. 20～25ml/kg
- D. 固定为每次2000ml
- E. 固定为每次50ml，不论体型

答案：A

---

92. [A2型题｜记忆] batch046-Q053

> 模块：M07｜页码：教材页码待核

[正选] 患者院外发生社区获得性肺炎，入院后出现严重呼吸衰竭。根据教师重点，下列哪项本身属于重症社区获得性肺炎的主要标准？

- A. 仅有轻度咳嗽
- B. 单次体温37.5℃
- **C. 需要插管机械通气** ✅
- D. 仅偶有少量清痰
- E. 仅有轻度食欲下降

答案：C

---

93. [A1型题｜记忆] batch046-Q054

> 模块：M07｜页码：教材页码待核

[正选] 肺血栓栓塞症的栓子最主要来源于下列哪个部位？

- A. 颈部浅静脉
- **B. 下肢深静脉** ✅
- C. 肺部静脉
- D. 肝脏动脉
- E. 冠状动脉血管

答案：B

M08（7题）

94. [A2型题｜应用] batch046-Q055

> 模块：M08｜页码：教材页码待核

[正选] 患者呕血并黑便，经评估估计出血量约900ml，生命体征暂稳定。若按教师给出的出血量口径判断，下列哪项正确？

- **A. 超过教师所列800ml界值** ✅
- B. 超过2000ml才符合教师口径
- C. 血压正常即可排除重要出血
- D. 黑便提示出血来自下消化道
- E. 不足1000ml可排除出血危险

答案：A

---

95. [A2型题｜记忆] batch046-Q056

> 模块：M08｜页码：教材页码待核

[正选] 一名急性胰腺炎患者出现腰部皮肤青紫。该体征的名称是？

- **A. Grey-Turner征** ✅

- B. 脐周Cullen征
- C. 胆囊Murphy征
- D. 脑膜Kernig征
- E. 足底Babinski征

答案：A

---

96. [A1型题｜理解] batch046-Q057

> 模块：M08｜页码：教材印刷页P36

[正选] 糖尿病酮症酸中毒时，哪种激素变化最能解释酮体生成增加及代谢紊乱？

- A. 胰岛素增多、升糖激素减少
- **B. 胰岛素缺乏、升糖激素增多** ✅
- C. 胰岛素增多、升糖激素增多
- D. 胰岛素正常、升糖激素减少
- E. 胰岛素减少、升糖激素减少

答案：B

---

97. [A1型题｜应用] batch046-Q058

> 模块：M08｜页码：教材印刷页P39-40

[正选] 依据教材，高渗高血糖状态且有明显脱水时，初始治疗的主要环节是？

- A. 单独给予降糖药
- **B. 及时补充液体** ✅
- C. 常规限制液体
- D. 单独纠正酸中毒
- E. 常规给予利尿药

答案：B

---

98. [A1型题｜分析] batch046-Q059

> 模块：M08｜页码：教材印刷页P34-35

[正选] 判断一组反复发作的心悸、出汗是否符合Whipple三联征，哪组证据最有鉴别价值？

- A. 发作时高血糖，补糖后缓解
- B. 发作时低血糖，补糖后持续不变
- C. 发作间血糖偏低，症状与血糖无关
- D. 发作时血糖正常，休息后缓解
- **E. 发作时低血糖，血糖升高后缓解** ✅

答案：E

---

99. [A2型题｜分析] batch046-Q060

> 模块：M08｜页码：教材印刷页P30

[正选] 依据《急诊与灾难医学》第4版的静脉溶栓禁忌证，一名患者突发右侧肢体无力2小时，头颅CT未见出血，拟评估静脉溶栓。反复测得血压190/115 mmHg，尚未降压。此时最恰当的判断是？

- A. 血压升高不影响直接溶栓
- B. 血压升高时仍可直接溶栓
- **C. 血压超出教材所列溶栓界限** ✅
- D. 肢体无力排除缺血性卒中
- E. 头颅CT正常排除急性卒中

答案：C

---

100. [A1型题｜理解] batch046-Q061

> 模块：M08｜页码：教材印刷页P27

[正选] 自发性蛛网膜下腔出血可首先出现明显脑膜刺激征，其最直接的解释是？

- A. 血液首先侵入脑实质
- B. 血液首先侵入硬膜外
- C. 血液首先侵入硬膜下

- **D. 血液进入脑脊液腔隙** ✅
- E. 血液首先侵入脊髓内

答案：D
