

## 第三节 条件分布

一、离散型随机变量的条件分布

二、连续型随机变量的条件分布

三、小结



# 一、离散型随机变量的条件分布

## 问题

考虑一大群人,从其中随机挑选一个人,分别用  $X$  和  $Y$  记此人的体重和身高,则  $X$  和  $Y$  都是随机变量,他们都有自己的分布.

现在如果限制  $Y$  取值从 1.5m 到 1.6m, 在这个限制下求  $X$  的分布.



**定义** 设  $(X, Y)$  是二维离散型随机变量, 对于固定的  $j$ , 若  $P\{Y = y_j\} > 0$ , 则称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}},$$

为在  $Y = y_j$  条件下随机变量  $X$  的条件分布律.

对于固定的  $i$ , 若  $P\{X = x_i\} > 0$ , 则称

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}},$$

为在  $X = x_i$  条件下随机变量  $Y$  的条件分布律.

其中  $i, j = 1, 2, \dots$ .






**例1** 在一汽车工厂中,一辆汽车有两道工序是由机器人完成的.其一是紧固 3 只螺栓,其二是焊接 2 处焊点.以  $X$  表示螺栓紧固得不良的数目,以  $Y$  表示焊点焊接得不良的数目.据积累的资料知  $(X,Y)$  具有分布律:

$Y \backslash X$	0	1	2	3	$P\{Y = j\}$
0	0.840	0.030	0.020	0.010	0.900
1	0.060	0.010	0.008	0.002	0.080
2	0.010	0.005	0.004	0.001	0.020
$P\{X = i\}$	0.910	0.045	0.032	0.013	1.000



- (1) 求在  $X = 1$  的条件下,  $Y$  的条件分布律;  
 (2) 求在  $Y = 0$  的条件下,  $X$  的条件分布律.



解 由上述分布律的表格可得

$$P\{Y = 0|X = 1\} = \frac{P\{X = 1, Y = 0\}}{P\{X = 1\}} = \frac{0.030}{0.045},$$

$$P\{Y = 1|X = 1\} = \frac{P\{X = 1, Y = 1\}}{P\{X = 1\}} = \frac{0.010}{0.045},$$

$$P\{Y = 2|X = 1\} = \frac{P\{X = 1, Y = 2\}}{P\{X = 1\}} = \frac{0.005}{0.045},$$



即在  $X = 1$  的条件下,  $Y$  的条件分布律为

$Y = k$	0	1	2
$P\{Y = k X = 1\}$	$\frac{6}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

同理可得在  $Y = 0$  的条件下,  $X$  的条件分布律为

$X = k$	0	1	2	3
$P\{X = k Y = 0\}$	$\frac{84}{90}$	$\frac{3}{90}$	$\frac{2}{90}$	$\frac{1}{90}$





**例2** 一射手进行射击,击中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$ ,射击到击中目标两次为止.设以 $X$ 表示首次击中目标所进行的射击次数,以 $Y$ 表示总共进行的的射击次数.试求  $X$  和  $Y$  的联合分布律及条件分布律.


**解** 由题意知  $X$  取  $m$  且  $Y$  取  $n$  时,有

$$P\{X = m, Y = n\} = p \cdot p \cdot \underbrace{(1-p) \cdot (1-p) \cdots (1-p)}_{(n-2)\uparrow}$$

即得  $X$  和  $Y$  的联合分布律为

$$P\{X = m, Y = n\} = p^2 q^{n-2},$$

其中  $q = 1 - p$ ,  $n = 2, 3, \cdots$ ;  $m = 1, 2, \cdots, n - 1$ .



现在求条件分布律.


$$P\{X = m|Y = n\}, \quad P\{Y = n|X = m\},$$

$$\text{由于 } P\{X = m\} = \sum_{n=m+1}^{\infty} P\{X = m, Y = n\} = \sum_{n=m+1}^{\infty} p^2 q^{n-2}$$

$$= p^2 \sum_{n=m+1}^{\infty} q^{n-2} = \frac{p^2 q^{m-1}}{1-q} = pq^{m-1},$$

$$P\{Y = n\} = \sum_{m=1}^{n-1} P\{X = m, Y = n\} \quad m = 1, 2, \dots,$$

$$= \sum_{m=1}^{n-1} p^2 q^{n-2} = (n-1)p^2 q^{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots.$$





所以当  $n = 2, 3, \dots$  时,

$$\begin{aligned} P\{X = m | Y = n\} &= \frac{P\{X = m, Y = n\}}{P\{Y = n\}} \\ &= \frac{p^2 q^{n-2}}{(n-1)p^2 q^{n-2}} = \frac{1}{n-1}, \end{aligned}$$

当  $m = 1, 2, \dots, n-1$  时,

$$\begin{aligned} P\{Y = n | X = m\} &= \frac{P\{X = m, Y = n\}}{P\{X = m\}} \\ &= \frac{p^2 q^{n-2}}{p q^{m-1}} = p q^{n-m-1}, \\ &\quad n = m + 1, m + 2, \dots. \end{aligned}$$



## 二、连续型随机变量的条件分布

**定义** 设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为  $f(x, y)$ ,  $(X, Y)$  关于  $Y$  的边缘概率密度为  $f_Y(y)$ . 若对于固定的  $y$ ,  $f_Y(y) > 0$ , 则称  $\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$  为在  $Y = y$  的条件下  $X$  的条件概率密度, 记为

$$f_{x|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$



称  $\int_{-\infty}^x f_{X|Y}(x|y) \mathrm{d}x = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \mathrm{d}x$  为在  $Y = y$  的

条件下,  $X$  的条件分布函数, 记为

$$P\{X \leq x|Y = y\} \text{ 或 } F_{X|Y}(x|y),$$

即  $F_{X|Y}(x|y) = P\{X \leq x|Y = y\} = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \mathrm{d}x.$

同理定义在  $X = x$  的条件下  $Y$  的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = P\{Y \leq y|X = x\} = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \mathrm{d}y.$$





## 请同学们思考

为什么不能用条件概率的定义来直接定义条件分布函数  $F_{X|Y}(x|y)$ ?

**答** 条件分布是指在一个随机变量取某个确定值的条件下,另一个随机变量的分布,即

$$F_{X|Y}(x|y) = P\{X \leq x | Y = y\}.$$

由于  $P\{Y = y\}$  可能为零(连续型时一定为零).故直接用条件概率来定义时,会出现分母为零.

因此,在条件分布中,作为条件的随机变量的取值是确定的数.





## 条件分布函数与条件密度函数的关系

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(x|y) dx = \int_{-\infty}^x [f(x, y) / f_Y(y)] dx.$$

$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(y|x) dy = \int_{-\infty}^y [f(x, y) / f_X(x)] dy.$$

### 说明

联合分布、边缘分布、条件分布的关系如下



例3 设  $G$  是平面上的有界区域,其面积为  $A$ . 若二维随机变量  $(X, Y)$  具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

设  $(X, Y)$  在圆域  $x^2 + y^2 \leq 1$  上服从均匀分布,求条件概率密度  $f_{X|Y}(x|y)$ .

解 由题意知随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/\pi, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$





又知边缘概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\pi} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} dx = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2}, & -1 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

于是当  $-1 < y < 1$  时, 有

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1/\pi}{(2/\pi)\sqrt{1-y^2}} = \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}}, & -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$



**例4** 设数  $X$  在区间  $(0,1)$  上随机地取值,当观察到  $X = x$  ( $0 < x < 1$ ) 时,数  $Y$  在区间  $(x, 1)$  上随机地取值.求  $Y$  的概率密度  $f_Y(y)$ .

**解** 由题意知  $X$  具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

对于任意给定的值  $x(0 < x < 1)$ , 在  $X = x$  的条件下,  $Y$  的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$



因此  $X$  和  $Y$  的联合概率密度为

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_{Y|X}(y|x)f_X(x) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \end{aligned}$$

故得  $Y$  的边缘概率密度

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \\ &= \begin{cases} \int_0^y \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-y), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \end{aligned}$$





### 三、小结

1. 设  $(X, Y)$  是二维离散型随机变量,  $p_{ij} (i, j = 1, 2, \dots)$  为其联合分布律, 在给定  $Y = y_j$  条件下随机变量  $X$  的条件分布律为

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}},$$

在给定  $X = x_i$  条件下随机变量  $Y$  的条件分布律为

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}},$$

其中  $i, j = 1, 2, \dots$ .



2. 设  $(X, Y)$  是二维连续型随机变量, 则有

$$\begin{aligned} F_{X|Y}(x|y) &= \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(x|y) \mathrm{d} x \\ &= \int_{-\infty}^x [f(x, y) / f_Y(y)] \mathrm{d} x. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{Y|X}(y|x) &= \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(y|x) \mathrm{d} y \\ &= \int_{-\infty}^y [f(x, y) / f_X(x)] \mathrm{d} y. \end{aligned}$$

