


성인&소아 기도폐쇄

기도폐쇄 처치 흐름도



성인&소아 기도폐쇄 응급처치 (하임리히법)

(1)상태체크 및 119신고 요청



 중앙응급의료센터
National Emergency Medical Center

환자가 숨쉬기 힘들어 하거나 목을 감싸
괴로움을 호소할 경우 기도폐쇄로 판단
하고 주변에 119에 신고를 요청한다.

(2)하임리히법 실시(의식이 있는 경우)



중앙응급의료센터
National Emergency Medical Center

환자의 등 뒤에 서서 주먹을 쥔 손의
엄지손가락 방향을 배 윗부분에 대고
다른 한 손을 위에 겹친 후 환자의 배꼽에
서 명치 사이의 배 부위를 두 손으로 위로
쓸어 올리듯 강하게 밀어 올려서 이물을
제거하고 이물이 밖으로 나왔는지 확인한
다. (임신한 여성이나 비만이 심한 사람의
경우 가슴부위를 밀어낸다.)

(3)하임리히법 실시(의식이 없는 경우)



중앙응급의료센터
National Emergency Medical Center

환자를 눕혀 놓고 명치와 배꼽사이를
손바닥으로 강하게 밀어 올린다. (손바닥의
손목 부분을 복부에 밀착 시킨다)

<주의사항>

하임리히법은 복부에 강한 압력을 주어 장
기 손상을 유발할 수 있다. 따라서 기도의
이물을 빼내었다고 해도 반드시 병원을
문하여 복부 장기 손상 여부를 확인하여야
한다. 기도폐쇄 증상이 없는 사람에게는
절대 시행하지 않는다.