

Dispersion in LFR

2dayclean

2025/10/08

1. Tabular reactor에서의 dispersion을 고려한 mass conservation equation은 다음과 같이 나타난다.

$$\frac{DC}{Dt} = \mathcal{D}_{AB} \nabla^2 C$$

로부터,

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u(r) \frac{\partial C}{\partial z} = \mathcal{D}_{AB} \left\{ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} \right\}$$

가 된다.

2. 이제, $z^* = z - Ut$ 와 같이 변환하자. (U 는 Hagen-Poiseuille flow의 average velocity, U_{\max} 의 절반.) 그러면, 다음과 같이 식을 쓸 수 있다.

$$\left(\frac{\partial C}{\partial t} \right)_{z^*} + [u(r) - U] \frac{\partial C}{\partial z^*} = \mathcal{D}_{AB} \left\{ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 C}{\partial z^{*2}} \right\}$$

3. Radial한 방향으로의 평균을 낸 \bar{C} 를 다음과 같이 정의하자.

$$\bar{C}(z, t) = \frac{1}{\pi R^2} \int_0^R C(r, z, t) 2\pi r dr$$

4. 이제, (2)의 식을 근사하기 위하여, 다음과 같은 조건을 생각하자.

$$(a) [u(r) - U] \frac{\partial C}{\partial z^*} \gg \mathcal{D}_{AB} \frac{\partial^2 C}{\partial z^{*2}}$$

$$(b) \left(\frac{\partial C}{\partial t} \right)_{z^*} \approx 0$$

$$(c) \frac{\partial C}{\partial z^*} \approx \frac{\partial \bar{C}}{\partial z^*}$$

5. 따라서, (2)의 식은 (4)의 근사로부터 다음과 같은 전개를 얻는다.

$$\begin{aligned} [u(r) - U] \frac{\partial \bar{C}}{\partial z^*} &= \mathcal{D}_{AB} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial C}{\partial r} \right) \\ \therefore r \frac{\partial C}{\partial r} &= \frac{1}{\mathcal{D}_{AB}} \frac{\partial \bar{C}}{\partial z^*} \int_0^r U \left[r - 2 \frac{r^3}{R^2} \right] dr + K_1 \end{aligned}$$

$r = 0$ 에서 $\frac{\partial C}{\partial r}$ 은 finite하므로 $K_1 = 0$ 이다.

$$\begin{aligned} r \frac{\partial C}{\partial r} &= \frac{U}{\mathcal{D}_{AB}} \frac{\partial \bar{C}}{\partial z^*} \left[\frac{1}{2} r^2 - \frac{1}{2} \frac{r^4}{R^2} \right] \\ \frac{\partial C}{\partial r} &= \frac{U}{\mathcal{D}_{AB}} \frac{\partial \bar{C}}{\partial z^*} \left[\frac{1}{2} r - \frac{1}{2} \frac{r^3}{R^2} \right] \\ C(r, z, t) &= \frac{U}{\mathcal{D}_{AB}} \frac{\partial \bar{C}}{\partial z^*} \int_0^r \frac{1}{2} r - \frac{1}{2} \frac{r^3}{R^2} dr \\ &= \frac{R^2 U}{4 \mathcal{D}_{AB}} \frac{\partial \bar{C}}{\partial z^*} \left[\left(\frac{r}{R} \right)^2 - \left(\frac{r}{R} \right)^4 \right] + K_2 \end{aligned}$$

6. 이제 \bar{C} 의 정의로부터 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
 \bar{C}(z, t) &= \frac{1}{\pi R^2} \int_0^R C(r, z, t) 2\pi r dr \\
 &= \frac{2}{R^2} \frac{R^2 U}{4\mathcal{D}_{AB}} \frac{\partial \bar{C}}{\partial z^*} \int_0^R \left[\left(\frac{r}{R} \right)^2 - \left(\frac{r}{R} \right)^4 \right] r dr + K_2 \\
 &= \frac{R^2 U}{12\mathcal{D}_{AB}} \frac{\partial \bar{C}}{\partial z^*} + K_2 \\
 K_2 &= \bar{C} - \frac{R^2 U}{12\mathcal{D}_{AB}} \frac{\partial \bar{C}}{\partial z^*} \\
 \therefore C(r, z, t) &= \bar{C} + \frac{R^2 U}{4\mathcal{D}_{AB}} \frac{\partial \bar{C}}{\partial z^*} \left[-\frac{1}{3} + \left(\frac{r}{R} \right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{R} \right)^4 \right]
 \end{aligned}$$

7. 이제, (2)의 식으로부터, 양변을 averaging하여 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{\partial \bar{C}}{\partial t} \right)_{z^*} + \frac{1}{\pi R^2} \int_0^R U \left[1 - 2 \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] \left[\frac{\partial \bar{C}}{\partial z^*} + \frac{R^2 U}{4\mathcal{D}_{AB}} \frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial z^{*2}} \left\{ -\frac{1}{3} + \left(\frac{r}{R} \right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{R} \right)^4 \right\} \right] 2\pi r dr \\
 = \mathcal{D}_{AB} \frac{1}{\pi R^2} \int_0^R 2\pi \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial C}{\partial r} \right) dr + \mathcal{D}_{AB} \frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial z^{*2}}
 \end{aligned}$$

8. Boundary condition으로, $r = 0$ 에서 $r \frac{\partial C}{\partial r} = 0$ 이고 $r = R$ 에서 $r \frac{\partial C}{\partial r} = 0$ (no flux)이므로, (7)의 식은 다음과 같다.

$$\left(\frac{\partial \bar{C}}{\partial t} \right)_{z^*} - \frac{1}{48} \frac{U^2 R^2}{\mathcal{D}_{AB}} \frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial z^{*2}} = \mathcal{D}_{AB} \frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial z^{*2}}$$

9. 이제 $z^* = z - Ut$ 를 돌려보내면, 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \bar{C}}{\partial t} + U \frac{\partial \bar{C}}{\partial z} &= \mathcal{D}^* \frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial z^2} \\
 \mathcal{D}^* &:= \mathcal{D}_{AB} + \frac{U^2 R^2}{48\mathcal{D}_{AB}}
 \end{aligned}$$

이를 **Aris-Taylor Dispersion coefficient**라고 한다.