

# Equazioni di Ricorrenza

ALGORITMI 1  
David Dragomir  
March 9, 2023

## Metodo Iterativo

Si "srotola" la ricorsione, ottenendo una sommatoria dipendente dalla sola dimensione di  $n$ .

Considerando la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} \theta(1) & \text{se } n = 0 \\ T(\frac{n}{2}) + \theta(1) & \text{se } n \geq 1 \end{cases}$$

si avrà:

$$\begin{aligned} T(n) &= T(\frac{n}{2}) + \theta(1) = T(\frac{n}{4}) + \theta(1) + \theta(1) = T(\frac{n}{8}) + \theta(1) + \theta(1) + \theta(1) \\ &= T(\frac{n}{2^3}) + 3 \cdot \theta(1) \end{aligned}$$

ci fermiamo quando  $\frac{n}{2^i} = 1$ , dunque:

$$\begin{aligned} n &= 2^i \Rightarrow i = \log_2 n \\ \Rightarrow \log_2 n \cdot \theta(1) + T(1) &\Rightarrow \log_2 n \cdot \theta(1) + \theta(1) \simeq \theta(\log_2 n) \end{aligned}$$

Altro esempio:

$$T(n) = \begin{cases} n + T(\frac{n}{2}) & \text{se } n > 1 \\ 1 & \text{se } n = 1 \end{cases}$$

Sviluppando il termine  $n + T(\frac{n}{2})$ :

$$\begin{aligned} T(n) &= n + T(\frac{n}{2}) = n + \frac{n}{2} + T(\frac{n}{4}) = n + \frac{n}{2} + \frac{n}{4} + T(\frac{n}{8}) \\ &= \frac{n}{2^0} + \frac{n}{2^1} + \frac{n}{2^2} + T(\frac{n}{2^3}) = \sum_{i=0}^{k-1} \frac{n}{2^i} + T(\frac{n}{2^k}) \end{aligned}$$

dunque ci fermeremo quando  $\frac{n}{2^k} = 1$ :

$$n = 2^k \Rightarrow k = \log_2 n$$

la sommatoria quindi diventerà:

$$\sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} \frac{n}{2^i} + T(1)$$

conoscendo la sommatoria notevole:  $\sum_{i=0}^n \alpha^i = \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha}$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} n \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} \left(\frac{1}{2}\right)^i + T(1) &\Rightarrow n \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{\log_2 n}}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)} + 1 \\ &= 2n \cdot \left(1 - \frac{1}{2^{\log_2 n}}\right) + 1 = 2n \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 1 = 2n \cdot \left(\frac{n-1}{n}\right) + 1 \\ &= 2n - 2 + 1 = 2n - 1 = \theta(n) \end{aligned}$$