

# SERVICE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET DE NEUROPATHOLOGIE - CHU - TIMONE TUMOROTHEQUE ET BANQUE DE MUSCLES DE I'AP-HM

**Professeur Laurent DANIEL** 

Pôle 18 : Biologie et Pathologie - N°FINESS : 130783293 264 rue Saint Pierre – 13385 MARSEILLE Cedex 05 Tél. 04 13 42 90 10 – Fax. 04 13 42 90 42 / 04 91 38 44 11

N°Séjour :

N° NIP :

Pr. DELAPORTE EMMANUEL CONSULT.PETITE CHIR. DERMATO-HN APHM HOPITAL NORD 13915 MARSEILLE

Prescripteur : DR BONNET Préleveur : DR TERRASA

### A. EXERESE CUTANEE: JAMBE DROITE

Renseignements : exérèse lésion kératosique, marges 5 mm. CIS ? CE ?

Exérèse cutanée – Formol – Orientation : non - Dimensions : 28 x 25 x 4 mm – Lésion : mal définie

Inclusion: 3 blocs — représentatif: A2

Description : carcinome épidermoïde cutané, infiltrant, dont la silhouette est cratériforme, ressemblant à un kératoacanthome mais présentant des aspects asymétrique, clonaux et un pléomorphisme plutôt en faveur d'un carcinome épidermoïde à la silhouette cratériforme. Ce carcinome présente en plus une morphologie multi-kystique et semble développé sur des foyers d'hyperplasie épidermique de type pseudo-épithéliomateuse. Immunohistochimie : P16(+/-) Ki67[15%]

Commentaires : ces aspects sont clairement inhabituels, il serait pertinent de comprendre le contexte clinique : existe-il un phénomène mécanogène chronique ? Une verrue préexistante ? Ou tout autre phénomène local ou inflammatoire chronique qui puisse expliquer l'évolution carcinologique ?

# Facteurs histopronostiques, adaptés du Brigham and Women's Hospital staging

- Histotype : épidermoïde (spinocellulaire commun)

Diamètre maximal : 15 mm
Infiltration verticale : 3,5 mm
Envahissement (plan cutané) : Derme
Associé : Hyperplasie

- Modalité d'invasion : cratériforme, endophytique

- Fusiforme (saracomatoïde) : (-)
- Acantholyse : (-)
- Mauvaise différenciation : (-)
- Angioinvasion, embols : (-)
- Neutropisme >0.1mm : (-)

Limites : latérales saines - profondes saines

Marge latérale : 3 mm Marge profonde : 3 mm

### **B. EXERESE CUTANEE: BRAS GAUCHE**

Renseignements : lésion nodulaire, marges 4 mm : CBC ?

Exérèse cutanée - Formol - Orientation : non - Dimensions : 20 x 7 x 4 mm - Lésion : 4 mm

Inclusion: 2 blocs - représentatifs: BI - B2

HHH2328815A;T-01000;M-80703;LIMITSAINE HHH2328815B;T-01000;M-80973;NMNM;LIMITSAINE HHH2328815C;T-01000;LIMITSAINE;M-80000;M-72750

IxQZQX032 - IxZZQX069 - IxZZQX081



#### SERVICE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET DE **NEUROPATHOLOGIE**

Pr Laurent DANIEL

Description: carcinome basocellulaire, nodulaire Limites : latérales saines - profondes saines

Marge latérale ≥3 mm Marge profonde ≥3 mm

# C. EXERESE CUTANEE: MANDIBULE DROITE

Renseignements : lésion kératosique infiltrée, marges 5 mm. CE ?

Exérèse cutanée – Formol – Orientation : non - Dimensions : 16 x 10 x 6 mm – Lésion : 8 x 4 mm

Inclusion: 2 blocs – représentatifs: CI – C2

Description : kératose séborrhéique, néoplasie kératinocytaire bénigne, bien limitée latéralement, cytologiquement basaloïde ou para-basale, invaginations infundibulaires, pseudo-kystes cornés, orthokératose et absence d'atypies cytonucléaires, silhouette générale papillomateuse, verruqueuse, exophytique

Limites : latérales saines - profondes saines

Marge latérale ≥3 mm Marge profonde ≥3 mm

### **CONCLUSION:**

- A. Exérèse cutanée jambe droite : carcinome épidermoïde infiltrant, kystique et cratériforme limites saines.
- B. Exérèse cutanée bras gauche : carcinome basocellulaire nodulaire limites saines.

C. Exérèse cutanée mandibule droite : kératose séborrhéique - limites saines.

YK P081822 Le 09/10/2023

Dr. MACAGNO Nicolas