



HHH2325367

Pr. RICHARD MARIE-ALETH
CONSULT. PETITE CHIRURGIE DERMATO-TA
APHM TIMONE ADULTES
13385 MARSEILLE

Prescripteur : Dr MOLINIER

Préleveur : Dr MOLINIER

A. EXERESE CUTANEE : JAMBE GAUCHE

Renseignements : Face antéro-interne, lésion pigmentée hétérogène suspecte. Mélanome ? Exérèse sans marge

Exérèse cutanée – Formol – Orientation : non - Dimensions : 40 x 35 x 10 mm – Lésion : ~25 mm
Inclusion : 7 bloc(s) – représentatif(s) : A1 a A7

Description : involution lésionnelle, avec pigment dermique, malgré de multiples plans de coupes observés, seul des remaniements dermiques superficiels fibro-inflammatoire, néovascularisés avec atrophie épidermique, évocateurs d'une régression lésionnelle complète sont présents. De manière tout à fait interprétative, l'aspect du stroma cicatriciel qui en résulte évoquerait plutôt une lésion mélanocytaire
L'épaisseur maximale de cette régression est de 1,3 mm.

Immunohistochimie : SOX10(-)

L'étude immunohistochimique qualitative avec SOX10 montre l'absence de prolifération mélanocytaire résiduelle décelable.

Limites d'exérèse : saines

B. BIOPSIE CUTANEE : TIBIA DROIT

Hypothèse(s) : biopsie lésion ulcéro-croûteuse suspecte de carcinome.

Biopsie cutanée - Acheminement : Formol

Inclusion totale : 1 bloc – représentatif : B1 – technique : 2 x HPS

Description : biopsie, carcinome basocellulaire, nodulaire

CONCLUSION

A. Jambe gauche : régression d'une lésion cutanée, pigmentée - limites saines.

B. Biopsie cutanée tibia droit : carcinome basocellulaire nodulaire

A147164

Le 30/08/2023
Dr. MACAGNO Nicolas