

N° NIP : [REDACTED]



HHH2326568

Pr. CASANOVA DOMINIQUE
CONSULT.CHIR.PLAST.REPARATRICE-CO
APHM CONCEPTION
13385 MARSEILLE

Prescripteur : PR BERTRAND

Préleveur : PR BERTRAND

A. EXERESE CUTANEE : THORAX

Renseignements : CBC

Exérèse cutanée – Formol – Orientation : / - Dimensions : 13 x 9 x 10 mm – Lésion : 4 mm
Inclusion : 2 bloc(s) – représentatif(s) : /

Description : carcinome kératinocytaire intraépithélial (*in situ*) peu différencié, de type Bowen, substituant l'épithélium normal par une prolifération basophile, respectant l'assise basale, avec désorganisation architecturale, pléomorphisme, prolifération.

Absence d'infiltration.

Immunohistochimie : P16[>90%] BerEP4(-) SOX10(-) YAP(⊥)

Interprétation : immunohistochimies quantitatives et qualitatives en faveur d'un carcinome *in situ* peu différencié de type Maladie de Bowen – le profil est en défaveur de mélanome, carcinome basocellulaire superficiel et porome intraépidermique.

Limites latérales : **non-saines** - atteinte latérale : des deux cotés

B. EXERESE CUTANEE : FACE EXTERNE MOLLET DROIT

Renseignements : lésion

Exérèse cutanée – Formol – Orientation : / - Dimensions : 22 x 15 x 6 mm – Lésion : 8 mm
Inclusion : 2 bloc(s) – représentatif(s) : /

Description : carcinome basocellulaire, infiltrant

Limites latérales : **saines** - marge latérale ≥5 mm

C. EXERESE CUTANEE : POINTE DU NEZ

Renseignements : lésion, mélanome de Dubreuil

Exérèse cutanée – Formol – Orientation : / - Dimensions : 18 x 19 x 4 mm – Lésion : 13 mm
Inclusion : 2 bloc(s) – représentatif(s) : /

Description : mélanome lentigineux intraépidermique (mélanome *in situ*, Mis), s'étendant au sein d'une peau avec dommages actiniques chroniques, la prolifération mélanocytaire est étendue avec un relatif grand diamètre, mal limitée latéralement, avec architecture lentigineuse, gaines folliculaires colonisées, sans invasion dermique, ni foyers inflammatoires ou rupture de la bande d'élastose.

Pronostic :

Clark : I

Ulcération (-)

Lymphocytes (-)

EPN/Neurotropisme (-)

HHH2326568A;T-01000;M-80702;MARGELAT+;M-80812

HHH2326568B;T-01000;M-80923;LIMITSAINE

HHH2326568C;T-01000;M-87423;LIMITSAINE

HHH2326568D;T-URG

L'activité libérale pratiquée dans le service est réalisée sans dépassement d'honoraire et dans le respect des conditions fixées par l'article L-6154 du code de la santé publique. Tous les prélèvements sont pris en charge par les techniques et protocoles en vigueur dont le détail est conservé dans les bases de données du SGL, des automates (colorations spéciales, histochimies, immunohistochimie, hybridation *in situ*) ainsi que dans les documents qualités correspondants.

IxQZQX032 - IxZZQX027 - IxZZQX081

UF : 3054 CASANOVA DOMINIQUE

Examen N° HHH2326568

Régression (-)

Phase latérale : lentigineuse

Naevus précurseur (0)

Immunohistochimies : SOX10 MelanA HMB45 P53 P16 PRAME

Interprétation : seul SOX10 permet de bien visualiser la densité de la prolifération avec une colonisation des gaines folliculaires, mais sans invasion, les autres marqueurs étant décevant – le mélanome est intimement intriqué à des lésions de kératoses actiniques pigmentées.

Limites latérales : **saines** - marge latérale ≥ 5 mm

Angioinvasion (-)

Métastase en transit (-)

CONCLUSION

A. Thorax : carcinome *in situ* - limites non saines

B. Face externe mollet droit : carcinome basocellulaire infiltrant - limites saines

C. Pointe du nez : mélanome LMM, *in situ* - limites saines

A147164

Le 11/09/2023

Dr. MACAGNO Nicolas

