

Le système convolutif

Rapports typique et non typiques : $1/k = 1/2$ et $1/k \neq 1/2$

Système équationnel convolutif pour les requêtes multi-rapports du pipeline cognitif





Auteur : Philippe Thomas Savard

Collaborateurs : Copilot Microsoft — Gordon Docker Desktop — E1 emergent.sh
API Anthropic — API OpenAI — Cline — Gemini Google

Adresse : 4-5354 Rue du Menuet, Lévis, Chaudière-Appalaches, Canada, G6X 2Y6
Courriel : philippethomassavard@gmail.com

Lieu et date : Lévis, Chaudière-Appalaches, Canada — le vingt-six septembre deux mille vingt-six

Licence Apache 2.0 — Document fourni tel quel, sans garantie — Créé sans financement d'aucune nature

Avertissement et licence

Les informations contenues dans le document que l'on consulte sont sous Licence Apache 2.0. Le document est présent sous la même licence sur GitHub dans le dépôt public : `https://github.com/2racinede4carreunivers-dev/Analyse-de-la-g-om-trie-du-spectre-des-nombres-premiers.git`. Il est possible, selon certaines restrictions en lien avec la Licence Apache 2.0 et la réglementation du dépôt, de contribuer via PR, de cloner, partager et modifier les informations présentes dans ce document. Le document est fourni tel quel, sans garantie ni assurance quant à sa validité, et son utilisation est permise dans la mesure de cet avertissement en ce qui concerne sa validité. Le document a été créé sans financement de toute nature, ni avantage, ni intérêt.

Le présent document est une section de la théorie unifiée « L'Univers est au carré », et fait partie du chapitre de cette théorie unifiée : « La géométrie du spectre des nombres premiers ». Cette géométrie, incluse dans la théorie mentionnée, est un outil dynamique conçu entièrement par son auteur Philippe Thomas Savard en collaboration avec les entités mentionnées. Cet outil dynamique est conçu pour résoudre la question de l'énigme de Bernhard Riemann et la conjecture de la fonction Zêta de Riemann.

Le dépôt mathlib : `https://github.com/leanprover-community/mathlib4.git` est utilisé pour certaines informations selon les termes de la licence du dépôt en question. Les informations utilisées, pouvant avoir été modifiées, sont incluses dans le fichier `.thy` de contre-validation du dépôt : `local-multiloop-Gabriel-local/theories/validation_zeta_lean.thy` ; la licence du dépôt mathlib est incluse dans le fichier `.thy`. Cette contre-validation, et la contre-validation jumelle dans le même sens `validation_hol_unifiee.thy`, concernent toutes deux la validation principale `methode_spectral.thy`, présentes aux adresses du dépôt : `local-multiloop-Gabriel-local/theories/validation_hol_unifiee.thy` et `local-multiloop-Gabriel-local/theories/methode_spectral.thy`, disponibles en sept langues différentes sur le dépôt ; quelques annotations sont en langue phonétique.

Table des matières

Avertissement et licence **1**

1 Rapports typique et non typiques : $1/k = 1/2$ et $1/k \neq 1/2$ **4**
1.1 Exemple de suites géométriques A et B 4
1.2 Reconstruction du nombre premier pour $n = 10$ 4
1.2.1 Quatre possibilités pour le Digamma 4
1.3 Généralisation des équations des suites A et B 4
1.4 Approche généralisée de niveau 1 5
1.4.1 Détermination du nombre premier 5
1.4.2 Équations des sommes des suites A et B 6

2 Définition et propriétés des rapports non typiques **6**
2.1 Exemple pour $n = 10$ des suites A et B pour un rapport non typique $1/k = 1/3$ . . 6
2.1.1 Rapport non typique $1/k = 1/3$ — équations généralisées 7
2.2 Rapport non typique $1/k = 1/4$ ($n = 10$; $p = 947$, $161^{\text{ème}}$ nombre premier) 9
2.3 Rapport non typique $1/k = 1/5$ 9
2.4 Rapport non typique $1/k = 1/6$ 11
2.5 Rapport non typique $1/k = 1/7$ 12

3 Système d'équations convolutif généralisé — pour tout rapport $1/k$ ($k \geq 2$) et tout n commun **13**
3.1 Niveau 1 — Constantes Savard universelles 13

3.2 Niveau 2 — Formules fermées (n quelconque, n commun à tous les rapports) . . . 13
3.3 Niveau 3 — Construction terme à terme (Suite A, $n \geq 8$) . . . 13
3.4 Niveau 4 — Mécanisme d'ancrage à $n = 10$ (4 candidats Digamma) . . . 13
3.5 Niveau 5 — Reconstruction pour $n \neq 10$ (n commun) . . . 14
3.6 Vérification $k = 3$ à 9 (tous corrects, 100 %) . . . 14
3.7 Tableau complet $P(1/k)$, $n = 10$ — $k = 10$ à $k = 111$ . . . 14
3.8 Synthèse statistique ($k = 10$ à 111) . . . 16
3.9 Notes importantes pour la programmation de l'agent . . . 16
3.10 Exécutions multi-rapports archivées ($n = 10$) . . . 17

4 Exemple numérique complet — $n = 15$ 17
4.1 Rapport 1/13 ($k = 13$, $n = 15$) . . . 17
4.1.1 Niveau 1 — Constantes Savard universelles . . . 17
4.1.2 Niveau 2 — Formules fermées . . . 17
4.1.3 Niveau 3 — Construction terme à terme ($n = 15$) . . . 18
4.1.4 Niveau 4 — 4 essais Digamma ($k^6 = 4\,826\,809$) . . . 18
4.1.5 Niveau 5 — Reconstruction rang cible (méthode officielle pour $n \neq 10$) . . . 18
4.2 Rapport 1/42 ($k = 42$, $n = 15$) . . . 18
4.2.1 Niveau 1 — Constantes Savard universelles . . . 19
4.2.2 Niveau 2 — Formules fermées . . . 19
4.2.3 Niveau 3 — Construction terme à terme ($n = 15$) . . . 19
4.2.4 Niveau 4 — 4 essais Digamma ($k^6 = 5\,489\,031\,744$) . . . 19
4.2.5 Niveau 5 — Reconstruction rang_cible . . . 19
4.3 Rapport 1/54 ($k = 54$, $n = 15$) . . . 20
4.3.1 Niveau 1 — Constantes Savard universelles . . . 20
4.3.2 Niveau 2 — Formules fermées . . . 20
4.3.3 Niveau 3 — Construction terme à terme ($n = 15$) . . . 20
4.3.4 Niveau 4 — 4 essais Digamma ($k^6 = 24\,794\,911\,296$) . . . 20
4.3.5 Niveau 5 — Reconstruction rang_cible . . . 21
4.4 Tableau récapitulatif final — $P(1/k,\ n = 15)$ . . . 21
4.5 Notes critiques pour l'agent . . . 21
4.5.1 1. Saut Zêta — asymétrie A / B confirmée . . . 21
4.5.2 2. Niveau 4 hors-calibrage pour $n \neq 10$ . . . 21
4.5.3 3. Niveau 5 — formule rang_cible . . . 21
4.5.4 4. Invariant spectral (Théorème XIV.3) — vérifié pour les 3 rapports . . . 22
4.5.5 5. Arithmétique — seuils de dépassement float . . . 22

5 Schéma neuronal et arborescence algorithmique du système convolutif 22
5.1 Schéma neuronal de la table convolutive . . . 22
5.2 Arborescence algorithmique — niveaux 1 et 2 . . . 22
5.3 Équations de reconstruction des suites A et B — les deux niveaux . . . 22

6 Fiche technique — Pipeline cognitif de l'agent Mm. Gabriel multiloop 24
6.1 Vocation et portée . . . 24
6.2 Architecture cognitive — les 7 moteurs collaboratifs . . . 25
6.3 Pipeline convolutif spectral (niveaux 1 et 2) . . . 25
6.4 Pipeline HOL du dépôt et corpus HOL . . . 26
6.5 Robustesse, audit et utilités pour la géométrie du spectre . . . 26

7 Fusion des rapports typiques et non typiques dans la fonction zêta spectrale de Savard 45
7.1 Droite critique spectrale : le rapport typique 1/2 . . . 45
7.2 Rapports non typiques : positions et polarité spectrales . . . 46
7.3 Définition proposée de la fonction zêta spectrale de Savard . . . 46
7.4 Reconstruction des premiers et exclusion des composés . . . 46
7.5 Comptages observés et loi de croissance proposée . . . 46
7.6 Interprétation zêta : analogie des exposants . . . 47
7.7 Hypothèse de Savard : formulation spectrale . . . 47

8 Leçon pédagogique — comprendre le système équationnel et la fonction Digamma pas à pas 47
8.1 Le but du jeu en une phrase . . . 47
8.2 Les deux acteurs : les suites A et B (niveau 3) . . . 48
8.3 Le problème central : quatre Digamma possibles . . . 48
8.4 L'astuce qui change tout : tout devient un polynôme (réduction B_0) . . . 48
8.5 Le criblage : éliminer par division, pas par primalité (exemple à la main) . . . 49
8.6 L'algorithme complet, en six pas (ce que fait l'agent Gabriel) . . . 49
8.7 Ce que cette section démontre — et ce qu'elle ne démontre pas . . . 50

9 Fonction Digamma_Savard/Cline — 20/10/2026 50
9.1 Problématique : de l'observation empirique à la fonction calculable . . . 50
9.2 Formulation algébrique du problème . . . 51
9.3 Définition formelle de la fonction DIGAMMA_SAVARD . . . 51
9.3.1 Réduction algébrique : le polynôme $B_0(k)$ . . . 51
9.3.2 Table de correspondance : branche, signe et terme . . . 52
9.3.3 Les quatre ancres de référence : $P = 29,\ 31,\ 37,\ 41$ . . . 52
9.3.4 La récurrence empirique observée . . . 53
9.4 La règle de criblage modulaire — formalisation de l'empirique . . . 53
9.4.1 Le principe : éliminer par divisibilité, non par primalité . . . 53
9.4.2 La règle de sélection . . . 54
9.4.3 La fonction DIGAMMA_SAVARD proprement dite . . . 54
9.5 Validations expérimentales . . . 54
9.5.1 Validation principale : exactitude et intégrité . . . 55
9.5.2 Contrôle anti-circularité . . . 55
9.5.3 Convergence du criblage . . . 55
9.6 Cas de référence : $P = 29,\ 31,\ 37,\ 41$ . . . 56
9.7 Limites et statut épistémologique . . . 56
9.8 Implémentation de référence . . . 57
9.9 Conclusion . . . 57

A Annexe — Tables du classeur Excel 59
A.1 Table de convolution formelle (feuille *Convolution*, extrait) . . . 59
A.2 Système généralisé (feuille *Systeme General*) . . . 59
A.3 Paramètres des règles et constantes des sommes fermées (feuille *Parametres*) . . . 60
A.4 Moteur géo convolutif (feuille *Moteur Géo Convolutif*, $k = 11$) . . . 60
A.5 Tests Digamma (feuille *Tests Digamma*) . . . 60
A.6 Suites géométriques A–B (feuille *Suites Géo A-B*, modèle hypoténuse) . . . 60
A.7 Bilan des ancrages pour $n = 10$ et extraits des grands rapports . . . 61

1. Rapports typique et non typiques : $1/k = 1/2$ et $1/k \neq 1/2$

1.1. Exemple de suites géométriques A et B

Pour le rapport typique $t = 1/k = 1/2$, les suites A et B sont construites selon le modèle de l'hypoténuse $\sqrt{a^2 + b^2}$, dix termes par suite (convention de notation : $(t^m)^2$ signifie le carré de t^m ; ainsi $(t^3)^2 = t^6$) :

Somme suite A — modèle hypoténuse

$$\begin{aligned}\mathrm{S}_A = &\left((1^1)^2 + (t^1)^2\right)^{1/2} + \left((t^1)^2 + (t^2)^2\right)^{1/2} + \left((t^2)^2 + (t^3)^2\right)^{1/2} + \left((t^3)^2 + (t^4)^2\right)^{1/2} \\ &+ \left((t^4)^2 + (t^5)^2\right)^{1/2} + \left((t^5)^2 + (t^6)^2\right)^{1/2} + \left((t^6)^2 + (t^7)^2\right)^{1/2} + \left((t^7)^2 + (t^8)^2\right)^{1/2} \\ &+ \left((t^8 - t^6)^2 + (t^9 - t^7)^2\right)^{1/2} + \left((t^9 - t^7)^2 + (t^{10} - t^8)^2\right)^{1/2}.\end{aligned}$$

Somme suite B — modèle hypoténuse (saut structurel en position 6)

$$\begin{aligned}\mathrm{S}_B = &\left((1^1)^2 + (t^1)^2\right)^{1/2} + \left((t^1)^2 + (t^2)^2\right)^{1/2} + \left((t^2)^2 + (t^3)^2\right)^{1/2} \\ &+ \left((t^3)^2 + (t^4)^2\right)^{1/2} + \left((t^4)^2 + (t^5)^2\right)^{1/2} \\ &+ \left((t^6)^2 + (t^7)^2\right)^{1/2} + \left((t^7)^2 + (t^8)^2\right)^{1/2} + \left((t^8)^2 + (t^9)^2\right)^{1/2} \\ &+ \left((t^{10} - t^8)^2 + (t^{11} - t^9)^2\right)^{1/2} \\ &+ \left((t^{11} - t^9)^2 + (t^{12} - t^{10})^2\right)^{1/2}.\end{aligned}$$

Décalage structurel A → B

La suite B ne comporte pas de terme $\left((t^5)^2 + (t^6)^2\right)^{1/2}$: c'est le *saut Zêta*, décalage structurel de A vers B. Les deux suites sont identiques pour les positions $i \leq 5$, puis divergent à partir de $i = 6$.

1.2. Reconstruction du nombre premier pour $n = 10$

1.2.1. Quatre possibilités pour le Digamma

1. Additionner la $8^{\text{ième}}$ position de la suite A à la somme de la suite A 10 termes ($n = 10$).
2. Soustraire la $8^{\text{ième}}$ position de la suite A à la somme suite A 10 termes ($n = 10$).
3. Additionner la $7^{\text{ième}}$ position de la suite A à la somme de la suite A 10 termes ($n = 10$).
4. Soustraire la $7^{\text{ième}}$ position de la suite A à la somme de la suite A 10 termes ($n = 10$).

Les quatre possibilités permettent de déterminer la valeur du Digamma calculé.

1.3. Généralisation des équations des suites A et B

1. Coefficient A :

$$\frac{\text{Somme suite A(10 termes)} - \text{Somme suite A(9 termes)}}{t^8} = \text{Coefficient A}.$$

Coefficient B :

$$\frac{\text{Somme suite B(10 termes)} - \text{Somme suite B(9 termes)}}{t^8} = \text{Coefficient B}.$$

2. Reconstruire les suites A et B en déterminant la somme des suites A et B pour toutes les valeurs n :

$$\frac{\text{Coefficient A}}{x} \times k^n - \text{Reste} = \text{Somme suite A}, \qquad \frac{\text{Coefficient A}}{\text{Somme suite A}}\, k^{10} = \text{Reste} + x.$$

$$(\text{Reste} + x) - \text{la valeur entière} = x.$$

La valeur de $(\text{Reste} + x)$ forme deux blocs A et B : A étant la partie entière de la valeur $(\text{Reste} + x)$, et B formant la partie < 1 qui est décimale de $(\text{Reste} + x)$.

$$\frac{\text{Coefficient A}}{x} \times k^{10} - \text{Reste} = \text{Somme suite A} + \text{Reste},$$
$$\text{Somme suite A} - (\text{Somme suite} + \text{Reste}) = \text{Reste}.$$

Équation reconstruite A généralisant la valeur de n

$$\frac{\text{Coefficient A}}{x} \times k^{n} - \text{Reste} = \text{Somme suite A}, \qquad \text{quand } n \text{ est un entier strictement positif.}$$

De même pour la suite B :

$$\frac{\text{Coefficient B}}{x} \times k^{n} - \text{Reste} = \text{Somme suite B}, \qquad \frac{\text{Coefficient B}}{\text{Somme suite B}} k^{10} = \text{Reste} + x,$$

$$\frac{\text{Coefficient B}}{x} \times k^{10} - \text{Reste} = \text{Somme suite B} + \text{Reste},$$
$$\text{Somme suite B} - (\text{Somme suite} + \text{Reste}) = \text{Reste}.$$

Équation reconstruite B généralisant la valeur de n

$$\frac{\text{Coefficient B}}{x} \times k^{n} - \text{Reste} = \text{Somme suite B}, \qquad \text{quand } n \text{ est un entier strictement positif.}$$

1.4. Approche généralisée de niveau 1

Sommes des suites A et B (forme formelle, $n = 10$)

$$t^1 + t^2 + t^3 + t^4 + t^5 + t^6 + t^7 + t^8 + (t^9 - t^7) + (t^{10} - t^8) = \text{Somme suite A},$$
$$t^1 + t^2 + t^3 + t^4 + t^5 + t^7 + t^8 + t^9 + (t^{10} - t^8) + (t^{11} - t^9) = \text{Somme suite B}.$$

Digamma, 4 possibilités :

1. $-$ 8ième position suite A : $-t^8$
2. $+$ 8ième position suite A : $+t^8$
3. $-$ 7ième position suite A : $-t^7$
4. $+$ 7ième position suite A : $+t^7$

Digamma calculé : Somme suite A $- t^8$; Somme suite A $+ t^8$; Somme suite A $- t^7$; Somme suite A $+ t^7$.

1.4.1. Détermination du nombre premier

Reconstruction du nombre premier

$$\frac{\text{Somme suite B} - \text{Digamma calculé}}{6^{\text{ième}} \text{ position suite A (Zêta)}} = \text{Nombre premier}.$$

1.4.2. Équations des sommes des suites A et B

Déterminer le coefficient A : $\dfrac{(\text{Somme suite A}_{n=10}) - \text{Somme suite A}_{n=9})}{t^8}$ Déterminer le coefficient B : $\dfrac{(\text{Somme suite B}_{n=10}) - \text{Somme suite B}_{n=9})}{t^8}$

Déterminer l'équation A :

$$\begin{aligned}
\frac{\text{Coefficient A}}{\text{Somme suite A}_{n=10}}\, t^{10} &= x + \text{Reste},\\
(x + \text{Reste}) - \text{Valeur réelle} &= x,\\
\frac{\text{Coefficient A}}{x} \times t^{10} &= \text{Somme suite A} + \text{Reste},\\
(\text{Somme suite A} + \text{Reste}) - (\text{Somme suite A}) &= \text{Reste}.
\end{aligned}$$

Équation A : $\dfrac{\text{Coefficient A}}{x} \times t^n - \text{Reste} = \text{Somme suite A}$, quand n est un entier strictement positif.

Déterminer l'équation B :

$$\begin{aligned}
\frac{\text{Coefficient B}}{\text{Somme suite B}_{n=10}}\, t^{10} &= x + \text{Reste},\\
(x + \text{Reste}) - \text{Valeur réelle} &= x,\\
\frac{\text{Coefficient B}}{x} \times t^{10} &= \text{Somme suite B} + \text{Reste},\\
(\text{Somme suite B} + \text{Reste}) - (\text{Somme suite B}) &= \text{Reste}.
\end{aligned}$$

Équation B : $\dfrac{\text{Coefficient B}}{x} \times t^n - \text{Reste} = \text{Somme suite B}$, quand n est un entier strictement positif.

Inspiration

Cette équation est tirée de la formule déjà connue des suites géométriques :

$$\text{Si } q \neq 1, \quad S = 1 + q + q^2 + q^3 \ldots q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

2. Définition et propriétés des rapports non typiques

Les rapports non typiques $1/k$ sont définis pour toute valeur $1/k < 1/2$, notamment $1/3$, $1/4$, $1/5$, $1/6$, …, $1/k$.

Contrairement au rapport typique $1/2$, la valeur de n ne correspond pas à la position du nombre premier. Elle représente exclusivement le nombre de termes des suites A et B.

2.1. Exemple pour $n = 10$ des suites A et B pour un rapport non typique $1/k = 1/3$

Sommes des suites A et B — rapport $1/3$, $n = 10$

$$\begin{aligned}
3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + 3^6 + 3^7 + 3^8 + (3^9 - 3^7) + (3^{10} - 3^8) &= \text{Somme suite A} = 79\,824,\\
3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + 3^7 + 3^8 + 3^9 + (3^{10} - 3^8) + (3^{11} - 3^9) &= \text{Somme suite B} = 238\,746.
\end{aligned}$$

Digamma $= 3^8$ ($8^{\text{ième}}$ position, soustraite) ; Digamma calculé $= 79\,824 - 3^8 = 73\,263$.

Déterminer le nombre premier :

$$\frac{238\,746 - 73\,263}{3^6} = 227 \quad (49^{\text{ième}} \text{ nombre premier}).$$

2.1.1. Rapport non typique $1/k = 1/3$ — équations généralisées

Somme suite A(227) = 79 824.

1. Déterminer la somme de la suite B du nombre précédent 227, qui est 223 :

$$\text{Somme suite A}(227) - 3^6 = \text{Somme suite B}(223),$$
$$\text{Somme suite B}(223) = 79\,824 - 3^6 = 79\,095.$$

9 termes, suite B(223) :

$$3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + 3^7 + 3^8 + (3^9 - 3^7) + (3^{10} + 3^8) = 79\,095.$$

9 termes, suite A(223) :

$$3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + 3^6 + 3^7 + (3^8 - 3^6) + (3^9 + 3^7) = 26\,607.$$

2. Déterminer le coefficient B, avec Somme suite B(227) = 238 746 :

$$\frac{\text{Somme suite B}(227) - \text{Somme suite B}(223)}{3^8} = \text{Coefficient B},$$
$$\frac{238\,746 - 79\,095}{3^8} = \frac{219}{9} = \text{Coefficient B}.$$

Note

Il s'agit de l'écart le plus petit entre deux suites B pour toutes les valeurs de n positives.

3. Déterminer l'écart minimum entre les termes $n = 1$ et $n = 2$ pour le rapport non typique $1/k = 1/3$ des suites B :

$$\frac{\text{Somme suite B}(227) - \text{Somme suite B}(223)}{3^6} = \text{différence entre les deux suites B}(227) \text{ et B}(223),$$
$$\frac{238\,746 - 79\,095}{3^6} = 219.$$

4. Écart entre les suites A(227) et B(223) :

$$\frac{219}{3} = 73,$$
$$\left(\frac{79\,824}{3^6} - 73\right) \times 3^6 = 26\,607 \quad \text{Somme suite A}(223).$$

5. Déterminer le coefficient pour l'équation de la suite A :

$$\frac{\text{Somme suite A}(227) - \text{Somme suite A}(223)}{3^8} = \text{Coefficient A},$$
$$\frac{79\,824 - 26\,607}{3^8} = \frac{73}{9} = \text{Coefficient A}.$$

6. Équations pour les sommes des suites A et B — l'équation est inspirée de celle déjà connue concernant les suites géométriques ($S = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$, $q \neq 1$). Déterminer l'équation pour la suite A, coefficient A $= 73/9$:

$$\left(\frac{73}{9}\,x \times 3^{10}\right) - \text{Reste} = 79\,824,$$
$$\frac{73}{9} \Big/ \frac{238\,746 + \text{reste}}{3^{10}} : \frac{73}{9} / 1.351826449 = 6.000112748,$$
$$6.000112748 - 0.000112748 = 6 = x,$$
$$\frac{73}{9} \times 6 \times 3^{10} - \text{Reste} = 79\,824,$$
$$\frac{73}{9} \times 6 \times 3^{10} = 79\,825.5,$$
$$79\,825.5 - 79\,824 = \frac{3}{2} = \text{Reste}.$$

Équation somme suite A — rapport 1/3

$$\text{Équation } n = 10 : \quad \left(\frac{73}{9} \times 6 \times 3^{10}\right) - \frac{3}{2} = 79\,824.$$

$$\text{Forme générale : } \quad \left(\frac{73}{9} \times 6 \times 3^{n}\right) - \frac{3}{2} = \text{Somme suite A} \quad (n \text{ entier strictement positif}),$$

$$\frac{73}{9} \times 3^{-n} - \frac{3}{2} = \text{Somme suite A négative} \quad (n \text{ entier strictement négatif}).$$

7. Déterminer l'équation pour la suite B (coefficient B $= 219/9$) :

$$\left(\frac{219}{9}\,x \times 3^{10}\right) - \text{Reste} = 238\,746, \qquad \frac{219}{9} \times 4.043184474 = 6.018358423,$$

$$6.018358423 - 0.018358423 = 6 = x, \qquad \frac{219}{9} \times 6 \times 3^{10} - \text{Reste} = 238\,746,$$

$$\frac{219}{9} \times 6 \times 3^{10} = 238\,476.5, \qquad 238\,476.5 - 238\,746 = 730.5 = \text{Reste}, \qquad \frac{730.5}{3/2} = 487.$$

Équation somme suite B — rapport 1/3

$$\text{Équation } n = 10 : \quad \left(\frac{219}{9} \times 6 \times 3^{10}\right) - \frac{3}{2}(487) = 238\,746.$$

$$\text{Forme générale : } \quad \left(\frac{219}{9} \times 6 \times 3^{n}\right) - \frac{3}{2}(487) = \text{Somme suite B} \quad (n \text{ entier strictement positif}),$$

$$\frac{219}{9} \times 3^{-n} - \frac{3}{2}(487) = \text{Somme suite B négative} \quad (n \text{ entier strictement négatif}).$$

9. Caractéristiques intrinsèques de la valeur de n pour les rapports non typiques $1/k \neq 1/2$: la valeur de n pour des suites A et B non typiques ne correspond pas à la position du nombre premier ; la valeur de n correspond à la quantité de termes dans les suites A et B, tant pour les suites positives que négatives.

2.2. Rapport non typique $1/k = 1/4$ ($n = 10$; $p = 947$, 161ème nombre premier)

Sommes des suites A et B — rapport $1/4$, $n = 10$

$$4^1 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + 4^5 + 4^6 + 4^7 + 4^8 + (4^9 - 4^7) + (4^{10} - 4^8) = \text{Somme suite A} = 1\,316\,180,$$
$$4^1 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + 4^5 + 4^7 + 4^8 + 4^9 + (4^{10} - 4^8) + (4^{11} - 4^9) = \text{Somme suite B} = 5\,260\,628.$$

Reconstruire le nombre premier — Digamma : $+4^8$:

$$\text{Digamma calculé : } 1\,316\,180 + 4^8 = 1\,316\,180 + 65\,536 = 1\,381\,716,$$
$$\frac{5\,260\,628 - 1\,381\,716}{4^6} = \frac{3\,878\,912}{4096} = 947.$$

Suites A et B pour $n = 9$ termes (941) :

$$4^1 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + 4^5 + 4^6 + 4^7 + (4^8 - 4^6) + (4^9 - 4^7) = 329\,044,$$
$$4^1 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + 4^5 + 4^7 + 4^8 + (4^9 - 4^7) + (4^{10} - 4^8) = 1\,312\,084.$$

Déterminer Somme suite B(941) et les écarts :

$$1316180 - 4096 = 1\,312\,084, \qquad \frac{5\,260\,628 - 1\,312\,084}{4^6} = \frac{3\,948\,544}{4096} = 964, \qquad \frac{964}{4} = 241,$$

$$\frac{1\,316\,180 - 329\,044}{4^6} = \frac{987\,136}{4096} = 241,$$
$$\text{Coefficient A} = \frac{987\,136}{65\,536} = \frac{241}{16},$$
$$\text{Coefficient B} = \frac{3\,948\,544}{65\,536} = \frac{964}{16} = \frac{241}{4}.$$

Équations généralisées — rapport $1/4$

$$\text{Équation A } (n = 10) : \quad \left(\frac{241}{16} \times 12 \times 4^{10}\right) - \frac{4}{3} = 1\,316\,180,$$
$$\frac{241}{16} \Big/ \frac{1\,316\,180}{4^{10}} = 12.000001216 \Rightarrow x = 12,$$
$$\text{Équation A généralisée : } \quad \left(\frac{241}{192} \times 4^n\right) - \frac{4}{3} = \text{Somme suite A} \quad (n \in \mathbb{Z},\ n > 0),$$
$$\frac{241}{16} \times 4^{-n} - \frac{4}{3} = \text{Somme suite A négative.}$$

$$\text{Équation B } (n = 10) : \quad \left(\frac{241}{4} \times 12 \times 4^{10}\right) - 3073\left(\frac{4}{3}\right) = 5\,260\,628,$$
$$\text{Équation B généralisée : } \quad \left(\frac{241}{4} \times 12 \times 4^n\right) - 3073\left(\frac{4}{3}\right) = \text{Somme suite B},$$
$$\frac{241}{4} \times 4^n - 3073\left(\frac{4}{3}\right) = \text{Somme suite B négative.}$$

2.3. Rapport non typique $1/k = 1/5$

Sommes des suites A et B — rapport 1/5, $n = 10$

$$5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 + 5^6 + 5^7 + 5^8 + (5^9 - 5^7) + (5^{10} - 5^8) = 11\,738\,280 \quad \text{Somme suite A,}$$
$$5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 + 5^7 + 5^8 + 5^9 + (5^{10} - 5^8) + (5^{11} + 5^9) = 58\,675\,780 \quad \text{Somme suite B.}$$

1. Reconstruire le nombre premier — Digamma : $+7^{\text{ième}}$ position suite A : $+5^7$:

$$\text{Digamma calculé : } 11\,738\,280 + 5^7 = 11\,816\,405, \qquad \frac{58\,675\,780 - 11\,816\,405}{5^6} = 2999.$$

2. Suites A et B pour $n = 9$ termes (2993) :

$$5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 + 5^6 + 5^7 + (5^8 - 5^6) + (5^9 - 5^7) = 2\,347\,655,$$
$$5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 + 5^7 + 5^8 + (5^9 - 5^7) + (5^{10} - 5^8) = 11\,722\,655.$$

3. Déterminer les équations servant de manière généralisée à l'ensemble des valeurs de n entières positives et négatives pour les suites A et B.

4. Déterminer Somme suite B(2993) : Somme suite B(2999) $- 5^6 =$ Somme suite A ; $11\,738\,280 - 5^6 = 11\,722\,655$.

5. $\dfrac{\text{Somme suite B(2999)} - \text{Somme suite B(2993)}}{5^6} = \dfrac{58\,675\,780 - 11\,722\,655}{5^6} = 3005$ (écart entre les suites B $= 3005$).

6. $\dfrac{3005}{5} = 601$ (écart entre les suites A(2999) et A(2993)) ; $\dfrac{11\,738\,280 - 2\,347\,655}{5^6} = 601$.

7. Coefficients : Coefficient A $= \dfrac{11\,738\,280 - 2\,347\,655}{5^8} = \dfrac{601}{25}$; Coefficient B $= \dfrac{58\,675\,780 - 11\,722\,655}{5^8} = \dfrac{601}{5}$.

8. Équation A :

$$\left(\frac{601}{25}\, x \times 5^{10}\right) - \text{Reste} = 11\,738\,280, \qquad \frac{601}{25} \Big/ \frac{11\,738\,280}{5^{10}} = 20.00000213 \Rightarrow x = 20,$$
$$\frac{601}{25} \times 20 \times 5^{10} - \text{Reste} = 11\,738\,281.25, \qquad 11\,738\,280 - 11\,738\,281.25 = -\frac{5}{4}.$$

Équations généralisées — rapport 1/5

$$\text{Équation A } (n = 10) : \quad \left(\frac{601}{25} \times 20 \times 5^{10}\right) - \frac{5}{4} = 11\,738\,280,$$
$$\left(\frac{601}{25} \times 20 \times 5^{n}\right) - \frac{5}{4} = \text{Somme suite A,}$$
$$\text{Équation A négative : } \quad \frac{601}{25} \times 5^n - \frac{5}{4} = \text{Somme suite A,}$$
$$\text{Équation B : } \quad \frac{601}{5} \times 20 \times 5^{10} - \text{Reste} = 58\,675\,780,$$
$$\frac{601}{5} \Big/ \frac{58\,675\,780}{5^{10}} = 20.13847323 \Rightarrow x = 20,$$
$$\left(\frac{601}{5} \times 20 \times 5^{10}\right) - \text{Reste} = 58\,691\,406.25,$$
$$58\,691\,406.25 - 58\,675\,780 = 15\,626.25,$$
$$\frac{15\,626.25}{1.25} = 12\,501,$$
$$\text{Équation B } (n = 10) : \quad \frac{601}{5} \times 20 \times 5^{10} - 12\,501\left(\frac{5}{4}\right) = 58\,675\,780,$$

$$\frac{601}{5} \times 20 \times 5^n - 12\,501 \left(\frac{5}{4}\right) = \text{Somme suite B.}$$

2.4. Rapport non typique $1/k = 1/6$

Sommes des suites A et B — rapport $1/6$, $n = 10$

$$6^1 + 6^2 + 6^3 + 6^4 + 6^5 + 6^6 + 6^7 + 6^8 + (6^9 - 6^7) + (6^{10} + 6^8) = \text{Somme suite A} = 70\,599\,858,$$
$$6^1 + 6^2 + 6^3 + 6^4 + 6^5 + 6^7 + 6^8 + 6^9 + (6^{10} - 6^8) + (6^{11} + 6^9) = \text{Somme suite B} = 423\,552\,498.$$

Digamma $= +6^8$ — la septième position est la position pour déterminer le Digamma calculé et est soustraite :

$$\text{Digamma calculé} = 70\,599\,858 + 6^7 = 72\,279\,474,$$
$$\frac{423\,552\,498 - 72\,279\,474}{6^6} = 7529 \quad \text{nombre premier.}$$

1. Suites A et B de 9 termes (7523) :

$$\begin{aligned} &6^1 + 6^2 + 6^3 + 6^4 + 6^5 \\ &+ 6^6 + 6^7 + (6^8 - 6^6) + (6^9 - 6^7) \end{aligned} = 11\,766\,642 \quad \text{Somme suite A 9 termes (7523),}$$

$$\begin{aligned} &6^1 + 6^2 + 6^3 + 6^4 + 6^5 \\ &+ 6^7 + 6^8 + (6^9 - 6^7) + (6^{10} - 6^8) \end{aligned} = 70\,553\,202 \quad \text{Somme suite B 9 termes (7523).}$$

$$\text{Somme suite A}(7529) - 6^6 = \text{Somme suite B}, \qquad 70\,599\,858 - 6^6 = 70\,553\,202.$$

2. Écart des sommes des suites B : $\dfrac{423\,552\,498 - 70\,553\,202}{6^6} = 7566.$

3. Écart entre les sommes des suites A(7529) et A(7523) : $\dfrac{7566}{6} = 1261.$

4. Coefficient A : $\dfrac{70\,599\,858 - 11\,766\,642}{6^8} = \dfrac{1261}{36}.$

5. Coefficient B : $\dfrac{423\,552\,498 - 70\,553\,202}{6^8} = \dfrac{1261}{6}.$

6. Équations généralisant la valeur de n pour les suites A et B du rapport non typique $1/k = 1/6$:

$$\frac{1261}{36} x \times 6^{10} - \text{Reste} = 70\,599\,858, \qquad \frac{1261}{36} \Big/ \frac{70\,599\,858}{6^{10}} = 30.00000051 \Rightarrow x = 30,$$
$$\frac{1261}{36} \times 30 \times 6^{10} - \text{Reste} = 70\,599\,859.2,$$
$$\frac{-46\,657.2}{6/5} = -38\,881 \times \frac{6}{5},$$
$$\frac{1261}{36} \times 30 \times 6^{10} - 38\,881 \left(\frac{6}{5}\right) = 70\,553\,202.$$

Pour la somme de la suite B :

$$\frac{1261}{6} x \times 6^{10} - \text{Reste} = 423\,552\,498, \qquad \frac{1261}{6} \Big/ \frac{423\,552\,498}{6^{10}} = 30.0033047 \Rightarrow x = 30,$$
$$\frac{1261}{6} \times 30 \times 6^{10} - \text{Reste} = 423\,599\,155.2,$$
$$\frac{-46\,657.2}{6/5} = -38\,881,$$
$$\frac{1261}{6} \times 30 \times 6^{10} - \text{Reste} = 423\,552\,498.$$

2.5. Rapport non typique $1/k = 1/7$

Sommes des suites A et B — rapport $1/7$, $n = 10$

$$7^1 + 7^2 + 7^3 + 7^4 + 7^5 + 7^6 + 7^7 + 7^8 + (7^9 - 7^7) + (7^{10} - 7^8) = \text{Somme suite A} = 322\,966\,112,$$
$$7^1 + 7^2 + 7^3 + 7^4 + 7^5 + 7^7 + 7^8 + 7^9 + (7^{10} - 7^8) + (7^{11} - 7^9) = \text{Somme suite B} = 2\,260\,645\,142.$$

Reconstruire le nombre premier — Digamma : -7^8 :

$$\text{Digamma calculé : } 322\,966\,112 - 7^8 = 322\,966\,112 - 5\,764\,801 = 317\,201\,321,$$
$$\frac{2\,260\,645\,142 - 317\,201\,321}{7^6} = \frac{1\,943\,443\,821}{117\,649} = 16\,519.$$

Suites A et B pour $n = 9$ termes (16 511) :

$$7^1 + 7^2 + 7^3 + 7^4 + 7^5 + 7^6 + 7^7 + (7^8 - 7^6) + (7^9 - 7^7) = 46\,138\,018,$$
$$7^1 + 7^2 + 7^3 + 7^4 + 7^5 + 7^7 + 7^8 + (7^9 - 7^7) + (7^{10} - 7^8) = 322\,848\,463.$$

Équations pour les suites A et B du rapport non typique $1/7$:

$$\begin{aligned}
\text{Somme suite A}(16519) - 7^6 &= 322\,966\,112 - 117\,649 \\
&= 322\,848\,463 = \text{Somme suite B (9 termes)}, \\
\frac{2\,260\,645\,142 - 322\,848\,463}{7^6} &= \frac{1\,937\,796\,679}{117\,649} = 16\,471, \\
\frac{16\,471}{7} &= 2353, \\
\frac{322\,966\,112 - 46\,138\,018}{7^6} &= \frac{276\,828\,094}{117\,649} = 2353, \\
\text{Coefficient A} &= \frac{276\,828\,094}{5\,764\,801} = \frac{2353}{49}, \\
\text{Coefficient B} &= \frac{1\,937\,796\,679}{5\,764\,801} = \frac{2353}{7}.
\end{aligned}$$

Équations généralisées — rapport $1/7$

$$\begin{aligned}
\text{Équation A } (n = 10) : \quad \left(\frac{2353}{49} \times 42 \times 7^{10}\right) - \frac{7}{6} &= 322\,966\,112, \\
\frac{2353}{49} \Big/ \frac{322\,966\,112}{7^{10}} &= 42.00000006 \Rightarrow x = 42, \\
\text{Forme générale A : } \quad \left(\frac{2353}{2058} \times 7^n\right) - \frac{7}{6} &= \text{Somme suite A}, \\
\frac{2353}{49} \times 7^{-n} - \frac{7}{6} &= \text{Somme suite A négative}, \\
\text{Équation B } (n = 10) : \quad \left(\frac{2353}{7} \times 42 \times 7^{10}\right) - 100\,843\left(\frac{7}{6}\right) &= 2\,260\,645\,142, \\
\frac{705\,901}{6} \Big/ \frac{7}{6} &= 100\,843, \\
\text{Forme générale B : } \quad \left(\frac{2353}{294} \times 7^n\right) - 100\,843\left(\frac{7}{6}\right) &= \text{Somme suite B}.
\end{aligned}$$

3. Système d'équations convolutif généralisé — pour tout rapport $1/k$ ($k \geq 2$) et tout n commun

3.1. Niveau 1 — Constantes Savard universelles

Constantes universelles

$$\alpha_A(k) = \frac{2\,(k^4 - k^2 + 1)}{(k-1)\cdot k^3}, \qquad \alpha_B(k) = k \cdot \alpha_A(k),$$

$$\delta_A(k) = \frac{k}{k-1}, \qquad \delta_B(k) = \frac{k^7 - k^6 + k}{k-1}.$$

3.2. Niveau 2 — Formules fermées (n quelconque, n commun à tous les rapports)

Formules fermées des sommes

$$\mathrm{S}_A(k,n) = \frac{\alpha_A(k)}{2}\cdot k^n - \delta_A(k), \qquad \mathrm{S}_B(k,n) = \frac{\alpha_B(k)}{2}\cdot k^n - \delta_B(k).$$

Invariant spectral prouvé algébriquement (Théorème XIV.3)

$$\frac{\mathrm{S}_A(k,n_1) - \mathrm{S}_A(k,n_2)}{\mathrm{S}_B(k,n_1) - \mathrm{S}_B(k,n_2)} = \frac{1}{k} \qquad \forall\, n_1 \neq n_2,\ k \geq 2.$$

3.3. Niveau 3 — Construction terme à terme (Suite A, $n \geq 8$)

Position i	Terme $A(k,n,i)$	Terme $B(k,n,i)$
$1 \leq i \leq n-2$	k^i	k^i $(i \leq 5)$; k^7 $(i = 6$, Saut Zêta$)$; k^{i+1} $(7 \leq i \leq n-2)$
$i = n-1$	$k^{n-1} - k^{n-3}$	$k^n - k^{n-2}$
$i = n$	$k^n - k^{n-2}$	$k^{n+1} - k^{n-1}$

3.4. Niveau 4 — Mécanisme d'ancrage à $n = 10$ (4 candidats Digamma)

Les quatre essais dans l'ordre déterministe :

#	Position	Signe	Digamma	Candidat P
1	8	$-$	$\mathrm{S}_A(k,10) - k^8$	$(\mathrm{S}_B - \mathrm{Digamma})/k^6$
2	8	$+$	$\mathrm{S}_A(k,10) + k^8$	$(\mathrm{S}_B - \mathrm{Digamma})/k^6$
3	7	$+$	$\mathrm{S}_A(k,10) + k^7$	$(\mathrm{S}_B - \mathrm{Digamma})/k^6$
4	7	$-$	$\mathrm{S}_A(k,10) - k^7$	$(\mathrm{S}_B - \mathrm{Digamma})/k^6$

→ Les quatre quotients sont examinés dans cet ordre. Si un seul candidat est premier, il peut constituer l'ancre standard. Si plusieurs le sont, toutes les branches sont conservées et aucune n'est choisie automatiquement ; une branche inscrite au catalogue peut être utilisée seulement comme choix explicite et doit rester distinguée d'une ancre unique. Si aucun candidat n'est premier, aucune ancre standard n'est produite.

$$P(1/k,\ n = 10) = \frac{\mathrm{S}_B(k,10) - \left[\mathrm{S}_A(k,10) \pm k^7 \text{ ou } \pm k^8\right]}{k^6}.$$

3.5. Niveau 5 — Reconstruction pour $n \neq 10$ (n commun)

Loi de rang spectral

$$\text{rang_cible}(k,n) = \text{rang_base}(k) + n - 10, \qquad P(k,n) = \text{premier}(\text{rang_cible}),$$
$$\text{Digamma}(k,n) = \text{S}_B(k,n) - P(k,n) \times k^6.$$

3.6. Vérification $k = 3$ à 9 (tous corrects, 100 %)

k	$P(n=10)$	Branche HOL	Calculé ✓
3	227	pos8 −	227
4	947	pos8 +	947
5	2 999	pos7 +	2 999
6	7 529	pos8 +	7 529
7	16 519	pos8 −	16 519
8	32 327	pos8 −	32 327
9	58 337	pos7 −	58 337

3.7. Tableau complet $P(1/k)$, $n = 10$ — $k = 10$ à $k = 111$

Légende : **P unique** (un seul candidat standard premier) | **C_MULTIPLE** (plusieurs candidats premiers ; aucune sélection automatique) | **AUCUN P** (aucun candidat standard premier ; une règle spéciale requiert une validation distincte). Lorsqu'une valeur et une branche sont indiquées pour un cas multiple, elles désignent le choix de référence documenté, pas l'unique candidat.

k	$P(1/k,\ n=10)$	État	Branche
10	99 109	C_MULTIPLE	pos8 −
11	—	RÈGLE SPÉCIALE (PDF : 1 611 851)	—
12	247 259		pos8 −
13	368 939		pos8 +
14	—	AUCUN P	—
15	755 789		pos8 +
16	1 044 751	C_MULTIPLE	pos8 −
17	1 414 943		pos7 +
18	1 883 429		pos8 +
19	2 469 277		pos7 −
20	3 192 419	C_MULTIPLE	pos8 −
21	4 074 419	C_MULTIPLE	pos8 +
22	—	AUCUN P	—
23	6 424 727		pos8 −
24	7 949 399	C_MULTIPLE	pos8 −
25	9 750 649	C_MULTIPLE	pos8 −
26	11 863 799		pos7 +
27	—	RÈGLE SPÉCIALE HOL ($P = 14\,330\,707$)	—
28	—	AUCUN P	—
29	—	AUCUN P	—
30	24 273 929		pos8 −
31	—	AUCUN P	—
32	33 522 719		pos8 −
33	—	AUCUN P	—
34	—	AUCUN P	—
35	—	AUCUN P	—
36	60 420 851	C_MULTIPLE	pos8 −
37	69 293 303		pos7 +

k	$P(1/k,\ n=10)$	État	Branche
38	—	AUCUN P	—
39	—	AUCUN P	—
40	102 337 639	C_MULTIPLE	pos8 −
41	—	AUCUN P	—
42	130 617 143		pos7 +
43	146 929 021		pos7 −
44	—	AUCUN P	—
45	—	AUCUN P	—
46	205 867 801	C_MULTIPLE	pos8 −
47	—	AUCUN P	—
48	—	AUCUN P	—
49	282 357 599	C_MULTIPLE	pos7 +
50	—	AUCUN P	—
51	—	AUCUN P	—
52	380 066 179		pos8 −
53	—	AUCUN P	—
54	459 010 529	C_MULTIPLE	pos8 −
55	—	AUCUN P	—
56	—	AUCUN P	—
57	601 506 977		pos7 −
58	656 165 077		pos8 −
59	—	AUCUN P	—
60	—	AUCUN P	—
61	—	AUCUN P	—
62	915 894 503		pos7 +
63	992 182 589	C_MULTIPLE	pos8 +
64	1 073 483 839	C_MULTIPLE (3 premiers !)	pos8 −
65	1 160 020 289	C_MULTIPLE	pos8 −
66	1 252 049 501	C_MULTIPLE	pos8 −
67	—	AUCUN P	—
68	—	AUCUN P	—
69	1 563 702 839		pos7 +
70	1 680 356 999		pos7 +
71	1 803 876 551		pos8 −
72	—	AUCUN P	—
73	—	AUCUN P	—
74	—	AUCUN P	—
75	2 372 624 999		pos7 +
76	—	AUCUN P	—
77	2 706 333 629		pos8 −
78	2 886 705 977		pos8 −
79	—	AUCUN P	—
80	3 276 294 479		pos8 −
81	—	AUCUN P	—
82	—	AUCUN P	—
83	—	AUCUN P	—
84	—	AUCUN P	—
85	4 436 438 999		pos7 +
86	—	AUCUN P	—
87	4 983 550 877		pos7 −
88	5 276 645 527	C_MULTIPLE	pos8 −
89	—	AUCUN P	—
90	—	AUCUN P	—
91	—	AUCUN P	—
92	—	AUCUN P	—
93	—	AUCUN P	—
94	—	AUCUN P	—

k	$P(1/k,\ n=10)$	État	Branche
95	—	AUCUN P	—
96	8 152 842 431		pos7 −
97	8 586 418 271	C_MULTIPLE	pos8 +
98	—	AUCUN P	—
99	—	AUCUN P	—
100	—	AUCUN P	—
101	—	AUCUN P	—
102	11 039 747 027		pos7 −
103	11 591 637 509		pos8 +
104	—	AUCUN P	—
105	12 761 657 999		pos7 +
106	13 381 076 101		pos8 −
107	14 024 303 819		pos8 −
108	14 692 021 271		pos7 −
109	15 384 932 747		pos8 +
110	—	AUCUN P	—
111	16 849 226 351	C_MULTIPLE	pos8 −

3.8. Synthèse statistique ($k = 10$ à 111)

État	Nombre de k	%
P certifié unique	38	37 %
C_MULTIPLE (≥ 2 premiers)	20	20 %
AUCUN P (règle standard)	44	43 %

3.9. Notes importantes pour la programmation de l'agent

Cas AUCUN P (44 valeurs)

Les 4 candidats standards sont tous composites. Deux stratégies possibles selon votre HOL :
- Règle spéciale cataloguée (comme $k = 27$: Digamma $= S_A - (2k^8 - k^6)$, $P = 14\,330\,707$) ;
- Mode CRÉATION D'ANCRAGE : l'agent retourne C_NON_CERTIFIÉ et attend validation HOL externe.

Cas C_MULTIPLE (20 valeurs)

Selon le contrat HOL, retourner toutes les branches premières et ne faire aucune sélection silencieuse. Une branche de référence portée par le catalogue doit être identifiée comme telle ; elle ne rend pas les autres branches inexistantes ni le cas unique.

Règles spéciales

$k = 11$ ne donne aucun candidat premier aux quatre essais standards. La valeur $P = 1\,611\,851$ (rang 121 982), associée à la règle A7− du moteur géométrique, est une règle spéciale distincte et doit être validée séparément. De même, $k = 27$ utilise une règle spéciale HOL documentée ; aucune de ces règles ne doit être extrapolée à d'autres rapports.

Arithmétique exacte requise

Pour $k \geq 50$, les valeurs de S_A et S_B dépassent 10^{15} : l'agent doit utiliser l'arithmétique entière Python (pas float) pour éviter les erreurs d'arrondi Excel.

3.10. Exécutions multi-rapports archivées ($n = 10$)

Deux rapports d'exécution du dépôt couvrent les plages communes suivantes : `liste_k2_k1001_n10.txt` traite $k = 2..1001$ (1 000 rapports) et annonce 423 succès ; `liste_k1002_k10001_n10.txt` traite $k = 1002..10001$ (9 000 rapports) et annonce 2 604 succès. Ces compteurs reproduisent le statut du dispatcher v7.9 au moment de la génération.

Portée des rapports archivés

Ces fichiers sont des journaux de calcul, pas des certificats indépendants. Le dispatcher historique retenait le premier candidat premier rencontré ; il ne consignait pas systématiquement toutes les branches premières. Les succès ne démontrent donc ni l'unicité de l'ancre, ni la primalité démontrée par HOL, ni une propriété sur les zéros de la fonction zêta. Le dispatcher corrigé conserve les branches candidates, signale les ambiguïtés hors catalogue et réserve les sélections documentées à une décision explicite.

4. Exemple numérique complet — $n = 15$

4.1. Rapport 1/13 ($k = 13$, $n = 15$)

4.1.1. Niveau 1 — Constantes Savard universelles

Constante	Formule	Valeur exacte
$\alpha_A(13)$	$2(13^4 - 13^2 + 1)/(12 \cdot 13^3)$	$28\,393/13\,182$
$\alpha_B(13)$	$13 \cdot \alpha_A(13)$	$28\,393/1014$
$\delta_A(13)$	$13/12$	$13/12$
$\delta_B(13)$	$(13^7 - 13^6 + 13)/12$	$57\,921\,721/12$

4.1.2. Niveau 2 — Formules fermées

$$\begin{aligned}
\mathrm{S}_A(13, 15) &= \frac{(k^4 - k^2 + 1)k^{12}}{k - 1} - \frac{k}{k - 1}, \\
&= \frac{28\,393 \times 23\,298\,085\,122\,481}{12} - \frac{13}{12}, \\
&= 55\,125\,210\,906\,883\,585, \\
\mathrm{S}_B(13, 15) &= \frac{(k^4 - k^2 + 1)k^{13}}{k - 1} - \frac{k^7 - k^6 + k}{k - 1}, \\
&= 716\,627\,741\,784\,659\,809.
\end{aligned}$$

Invariant spectral (Théorème XIV.3) :

$$\begin{aligned}
\Delta\mathrm{S}_A &= \mathrm{S}_A(n{=}15) - \mathrm{S}_A(n{=}10), \\
&= 55\,125\,210\,906\,883\,585 - 148\,468\,220\,264, \\
&= 55\,125\,062\,438\,663\,321, \\
\Delta\mathrm{S}_B &= \mathrm{S}_B(n{=}15) - \mathrm{S}_B(n{=}10), \\
&= 716\,627\,741\,784\,659\,809 - 1\,930\,082\,036\,636, \\
&= 716\,625\,811\,702\,623\,173, \\
\Delta\mathrm{S}_A/\Delta\mathrm{S}_B &= 1/13 \quad \checkmark
\end{aligned}$$

4.1.3. Niveau 3 — Construction terme à terme ($n = 15$)

i	$A(13, 15, i)$	$B(13, 15, i)$	Règle A	Règle B
1	13	13	k^1	k^1
2	169	169	k^2	k^2
3	2 197	2 197	k^3	k^3
4	28 561	28 561	k^4	k^4
5	371 293	371 293	k^5	k^5
6	4 826 809	62 748 517	k^6	k^7 ← Saut Zêta
7	62 748 517	815 730 721	k^7	k^8
8	815 730 721	10 604 499 373	k^8	k^9
9	10 604 499 373	137 858 491 849	k^9	k^{10}
10	137 858 491 849	1 792 160 394 037	k^{10}	k^{11}
11	1 792 160 394 037	23 298 085 122 481	k^{11}	k^{12}
12	23 298 085 122 481	302 875 106 592 253	k^{12}	k^{13}
13	302 875 106 592 253	3 937 376 385 699 289	k^{13}	k^{14}
14	3 914 078 300 576 808	50 883 017 907 498 504	$k^{14} - k^{12}$	$k^{15} - k^{13}$
15	50 883 017 907 498 504	661 479 232 797 480 552	$k^{15} - k^{13}$	$k^{16} - k^{14}$
Σ	$\Sigma A = 55\,125\,210\,906\,883\,585 = \mathrm{S}_A(13, 15)$		$\Sigma B = 716\,627\,741\,784\,659\,809 = \mathrm{S}_B(13, 15)$	

4.1.4. Niveau 4 — 4 essais Digamma ($k^6 = 4\,826\,809$)

Les 4 essais sont calibrés pour $n = 10$. Pour $n = 15$, ils servent de vérification structurelle — tous composites est le comportement attendu.

Branche	Digamma	P candidat	État
pos13−	54 822 335 800 291 332	137 110 336 453	composé
pos13+	55 428 086 013 475 838	136 984 839 419	composé
pos12+	55 148 508 992 006 066	137 042 761 127	composé
pos12−	55 101 912 821 761 104	137 052 414 745	composé

4.1.5. Niveau 5 — Reconstruction rang cible (méthode officielle pour $n \neq 10$)

$$P(13, n{=}10) \text{ documenté} = 368\,939,$$
$$\text{rang_base}(13) = \pi(368\,939) = 31\,452,$$
$$\Delta n = 15 - 10 = 5,$$
$$\text{rang_cible}(13, n{=}15) = 31\,452 + 5 = 31\,457,$$
$$P(13, n{=}15) = \text{premier}(31\,457) = 369\,023 \quad \textbf{PREMIER certifié}.$$

$$\begin{aligned}\text{Digamma}(13, 15) = \mathrm{S}_B - P \times k^6 &= 716\,627\,741\,784\,659\,809 \\ &\quad - 369\,023 \times 4\,826\,809 \\ &= 716\,625\,960\,581\,122\,202.\end{aligned}$$

4.2. Rapport $1/42$ ($k = 42$, $n = 15$)

4.2.1. Niveau 1 — Constantes Savard universelles

Constante	Valeur exacte
$\alpha_A(42)$	3 109 933 / 1 518 804
$\alpha_B(42)$	3 109 933 / 36 162
$\delta_A(42)$	42/41
$\delta_B(42)$	225 050 301 546 / 41

4.2.2. Niveau 2 — Formules fermées

$$\mathrm{S}_A(42, 15) = 2\,285\,381\,254\,365\,702\,554\,104\,806,$$
$$\mathrm{S}_B(42, 15) = 95\,986\,012\,683\,359\,501\,783\,370\,150.$$

4.2.3. Niveau 3 — Construction terme à terme ($n = 15$)

i	$A(42, 15, i)$	$B(42, 15, i)$	
1	42	42	
2	1 764	1 764	
3	74 088	74 088	
4	3 111 696	3 111 696	
5	130 691 232	130 691 232	
6	5 489 031 744	230 539 333 248	← Saut Zêta (k^7)
7	230 539 333 248	9 682 651 996 416	
8	9 682 651 996 416	406 671 383 849 472	
9	406 671 383 849 472	17 080 198 121 677 824	
10	17 080 198 121 677 824	717 368 321 110 468 608	
11	717 368 321 110 468 608	30 129 469 486 639 681 536	
12	30 129 469 486 639 681 536	1 265 437 718 438 866 624 512	
13	1 265 437 718 438 866 624 512	53 148 384 174 432 398 229 504	
14	53 118 254 704 945 758 547 968	2 230 966 697 607 721 859 014 656	
15	2 230 966 697 607 721 859 014 656	93 700 601 299 524 318 078 615 552	
Σ	$\Sigma A = 2\,285\,381\,254\,365\,702\,554\,104\,806$	$\Sigma B = 95\,986\,012\,683\,359\,501\,783\,370\,150$	

4.2.4. Niveau 4 — 4 essais Digamma ($k^6 = 5\,489\,031\,744$)

Branche	Digamma	P candidat	État
pos13−	2 284 115 816 647 263 687 480 294	17 070 751 498 046 399	composé
pos13+	2 286 646 692 084 141 420 729 318	17 070 290 419 379 903	composé
pos12+	2 285 411 383 835 189 193 786 342	17 070 515 469 681 407	composé
pos12−	2 285 351 124 896 215 914 423 270	17 070 526 447 744 895	composé

4.2.5. Niveau 5 — Reconstruction rang_cible

$$P(42, n{=}10) \text{ documenté} = 130\,617\,143,$$
$$\text{rang_base}(42) = \pi(130\,617\,143) = 7\,411\,117,$$
$$\Delta n = 15 - 10 = 5,$$
$$\text{rang_cible}(42, n{=}15) = 7\,411\,117 + 5 = 7\,411\,122,$$
$$P(42, n{=}15) = \text{premier}(7\,411\,122) = 130\,617\,251 \quad \textbf{PREMIER certifié}.$$

$$\begin{aligned}\text{Digamma}(42,15) &= \mathrm{S}_B - P \times k^6 \\ &= 95\,986\,012\,683\,359\,501\,783\,370\,150 \\ &\quad - 130\,617\,251 \times 5\,489\,031\,744 \\ &= 95\,986\,011\,966\,397\,264\,730\,354\,406.\end{aligned}$$

4.3. Rapport $1/54$ ($k = 54$, $n = 15$)

4.3.1. Niveau 1 — Constantes Savard universelles

Constante	Valeur exacte
$\alpha_A(54)$	8 500 141 / 4 172 796
$\alpha_B(54)$	8 500 141 / 77 274
$\delta_A(54)$	54/53
$\delta_B(54)$	1 314 130 298 742 / 53

4.3.2. Niveau 2 — Formules fermées

$$\begin{aligned}\mathrm{S}_A(54,15) &= 98\,599\,651\,085\,954\,948\,762\,648\,034,\\ \mathrm{S}_B(54,15) &= 5\,324\,381\,158\,641\,567\,208\,388\,082\,594,\\ \Delta\mathrm{S}_A/\Delta\mathrm{S}_B &= 1/54 \quad \checkmark\end{aligned}$$

4.3.3. Niveau 3 — Construction terme à terme ($n = 15$)

i	$A(54,15,i)$	$B(54,15,i)$	
1–5	54 / 2 916 / 157 464 / 8 503 056 / 459 165 024	(idem A et B)	
6	24 794 911 296	1 338 925 209 984	← Saut Zêta (54^7)
7	1 338 925 209 984	72 301 961 339 136	
8	72 301 961 339 136	3 904 305 912 313 344	
9	3 904 305 912 313 344	210 832 519 264 920 576	
10	210 832 519 264 920 576	11 384 956 040 305 711 104	
11	11 384 956 040 305 711 104	614 787 626 176 508 399 616	
12	614 787 626 176 508 399 616	33 198 531 813 531 453 579 264	
13	33 198 531 813 531 453 579 264	1 792 720 717 930 698 493 280 256	
14	1 792 105 930 304 521 984 880 640	96 773 720 236 444 187 183 554 560	
15	96 773 720 236 444 187 183 554 560	5 225 780 892 767 986 107 911 946 240	
Σ	$\Sigma A = 98\,599\,651\,085\,954\,948\,762\,648\,034$	$\Sigma B = 5\,324\,381\,158\,641\,567\,208\,388\,082\,594$	

4.3.4. Niveau 4 — 4 essais Digamma ($k^6 = 24\,794\,911\,296$)

Branche	Digamma	P candidat	État
pos13−	98 566 452 554 141 417 309 068 770	210 761 581 023 702 719	composé
pos13+	98 632 849 617 768 480 216 227 298	210 758 903 173 282 751	composé
pos12+	98 600 265 873 581 125 271 047 650	210 760 217 303 581 439	composé
pos12−	98 599 036 298 328 772 254 248 418	210 760 266 893 404 031	composé

4.3.5. Niveau 5 — Reconstruction rang_cible

$$P(54, n{=}10) \text{ documenté} = 459\,010\,529,$$
$$\text{rang_base}(54) = \pi(459\,010\,529) = 24\,304\,918,$$
$$\Delta n = 15 - 10 = 5,$$
$$\text{rang_cible}(54, n{=}15) = 24\,304\,918 + 5 = 24\,304\,923,$$
$$P(54, n{=}15) = \text{premier}(24\,304\,923) = 459\,010\,597 \quad \textbf{PREMIER certifié}.$$

$$\begin{aligned}\text{Digamma}(54, 15) = \mathrm{S}_B - P \times k^6 \\ &= 5\,324\,381\,158\,641\,567\,208\,388\,082\,594 \\ &\quad - 459\,010\,597 \times 24\,794\,911\,296 \\ &= 5\,324\,381\,147\,260\,440\,171\,849\,078\,882.\end{aligned}$$

Statut de l'ancre 1/54

Le tableau 3.7 classe $k = 54$ comme **C_MULTIPLE**. Les essais exacts produisent au moins les deux branches premières $A(8)- = 459\,010\,529$ et $A(8)+ = 459\,004\,697$. Les calculs de rang ci-dessus suivent la branche $A(8)-$ explicitement documentée par la source ; le résultat n'est pas une ancre unique et doit rester conditionnel à cette sélection de référence.

4.4. Tableau récapitulatif final — $P(1/k,\ n = 15)$

k	$\mathrm{S}_A(k, 15)$	$\mathrm{S}_B(k, 15)$	rang base	rang cible	$P(k, n{=}15)$	$P(k, n{=}10)$	État
13	55 125 210 906 883 585	716 627 741 784 659 809	31 452	31 457	369 023	368 939	CERTIFIÉ
42	2.29×10^{24}	9.60×10^{25}	7 411 117	7 411 122	130 617 251	130 617 143	CERTIFIÉ
54	9.86×10^{25}	5.32×10^{27}	24 304 918	24 304 923	459 010 597	459 010 529	C_MULTIPLE ; A(8)- documentée

4.5. Notes critiques pour l'agent

4.5.1. 1. Saut Zêta — asymétrie A / B confirmée

La correction importante validée ici : $A(k, n, i) = k^i$ pour tout $1 \leq i \leq n - 2$ (pas de Saut Zêta dans la suite A). Le Saut Zêta k^7 à la position $i = 6$ n'existe que dans la suite B. Les deux suites sont identiques pour $i \leq 5$, puis divergent à partir de $i = 6$.

4.5.2. 2. Niveau 4 hors-calibrage pour $n \neq 10$

Les 4 essais Digamma (pos$(n-2)\pm$, pos$(n-3)\pm$) produisent tous des candidats composites pour $n = 15$ — ce comportement est attendu et correct. Ces essais sont calibrés structurellement sur $n = 10$; le Niveau 5 est la voie officielle pour tout $n \neq 10$.

4.5.3. 3. Niveau 5 — formule rang_cible

Pseudo-code officiel

```
rang_base(k) = primepi(P(k, n=10))   # rang du P certifié à n=10
rang_cible(k, n) = rang_base(k) + (n - 10)
P(k, n) = prime(rang_cible(k, n))   # arithmétique exacte sympy
```

L'écart en rang +5 (pour $\Delta n = 5$) est cohérent pour les trois k, et illustre la règle de rang pour ces trois exemples. Trois cas numériques ne suffisent pas à établir l'universalité de cette règle pour tout k.

4.5.4. 4. Invariant spectral (Théorème XIV.3) — vérifié pour les 3 rapports

$$\Delta S_A(k, n{=}15, n{=}10) \,/\, \Delta S_B(k, n{=}15, n{=}10) = 1/k \qquad \forall\, k \in \{13, 42, 54\} \quad \checkmark$$

4.5.5. 5. Arithmétique — seuils de dépassement float

k	$S_A(k, 15)$	Ordre de grandeur	Float 64 safe ?
13	55 125 210 906 883 585	$\sim 5.5 \times 10^{16}$	limite
42	2.29×10^{24}	$\sim 10^{24}$	erreur garantie
54	9.86×10^{25}	$\sim 10^{25}$	erreur garantie

Point de vigilance

Arithmétique entière Python obligatoire dès $k \geq 42$ pour $n = 15$. Excel / float64 introduiraient des erreurs d'arrondi fatales.

5. Schéma neuronal et arborescence algorithmique du système convolutif

Cette section est construite à partir des tables convolutives du classeur Excel `systeme_convolutif_spectral_general.xlsx` (feuilles *Convolution*, *Systeme General*, *Parametres*, *Moteur Géo Convolutif*, *Tests Digamma*, *Suites Géo A-B*).

5.1. Schéma neuronal de la table convolutive

Chaque terme de la table de convolution formelle vaut $c_1 \cdot k^{e_1} + c_2 \cdot k^{e_2}$: cette représentation encode les additions et soustractions sans figer k. Le schéma ci-dessous en trace le réseau de propagation, de l'entrée (k, n) jusqu'au premier certifié.

5.2. Arborescence algorithmique — niveaux 1 et 2

Les deux niveaux évaluent la même construction sous deux représentations : le niveau géométrique multiplie les termes entiers par un facteur commun et reproduit les mêmes quatre candidats. Il ne crée pas une ancre supplémentaire lorsque le niveau entier n'en trouve aucune. Le résultat à $n = 10$ doit donc être classé comme candidat unique, choix de catalogue explicite, ambiguïté sans décision ou absence de candidat standard.

5.3. Équations de reconstruction des suites A et B — les deux niveaux

Niveau 1 (entier) — reconstruction généralisée de n

$$\begin{aligned} S_A(k, n) &= \frac{\alpha_A(k)}{2}\, k^n - \delta_A(k) \\ &= \frac{k^4 - k^2 + 1}{(k-1)\, k^3}\, k^n - \frac{k}{k-1}, \\ S_B(k, n) &= \frac{\alpha_B(k)}{2}\, k^n - \delta_B(k) \\ &= \frac{k^4 - k^2 + 1}{(k-1)\, k^2}\, k^n \\ &\quad - \frac{k^7 - k^6 + k}{k-1}. \end{aligned}$$




FIGURE 1 – Schéma neuronal du système convolutif : propagation des termes $c_1 k^{e_1} + c_2 k^{e_2}$ des suites A et B vers les sommes S_A/S_B, puis vers les quatre branches Digamma et la division Zêta k^6 menant au premier certifié (ancrage $n = 10$) ou à la loi de rang spectral (Niveau 5).




FIGURE 2 – Arborescence algorithmique des étapes du système convolutif pour les niveaux 1 (entier) et 2 (géométrique), avec la voie officielle du Niveau 5 pour tout $n \neq 10$. Invariants : le Digamma (4 possibilités) et les équations de reconstruction pour $\forall n$ demeurent identiques d'un niveau à l'autre.

formes fermées exactes valables pour tout k entier ≥ 3 et tout n entier (positif ou négatif), coïncidant avec la construction terme à terme (Niveau 3) dès $n = 8$; pour $n \leq 7$, la construction terme à terme progression simple fait foi (seuil des formes fermées : $n = 8$).

Niveau 2 (géométrique) — modèle hypoténuse $\sqrt{a^2+b^2}$

Chaque terme géométrique est le terme entier correspondant multiplié par le zêta géométrique $g(k) = \dfrac{\sqrt{1+k^2}}{k}$:

$$\begin{aligned} \mathrm{S}_A^{\text{géo}}(k,n) &= g(k)\cdot \mathrm{S}_A(k,n),\\ \mathrm{S}_B^{\text{géo}}(k,n) &= g(k)\cdot \mathrm{S}_B(k,n),\\ \mathrm{Digamma}_{\text{géo}} &= g(k)\cdot \mathrm{Digamma},\\ \mathrm{Zêta}_{\text{géo}} &= g(k)\cdot k^6. \end{aligned}$$

Identité centrale : le facteur $g(k)$ s'annule dans

$$\begin{aligned} P &= \frac{\mathrm{S}_B^{\text{géo}} - \mathrm{Digamma}_{\text{géo}}}{\mathrm{Zêta}_{\text{géo}}}\\ &= \frac{\mathrm{S}_B - \mathrm{Digamma}}{k^6}. \end{aligned}$$

Les deux niveaux ont les mêmes utilités et les mêmes ancrages (8/8 conformes, Section XIV.5).

Exemple numérique croisé — rapport 1/3

Au niveau 1 :

$$\mathrm{S}_A(3,10) = \frac{73}{9}\cdot 6\cdot 3^{10} - \frac{3}{2} = 79\,824, \qquad \mathrm{Digamma} = \mathrm{S}_A - 3^8 = 73\,263.$$

La reconstruction donne

$$P = \frac{238\,746 - 73\,263}{729} = 227 \quad (49^{\text{ème}}\textit{premier}).$$

Au niveau 2, les sommes géométriques sont multipliées par $g(3) = \sqrt{10}/3 \approx 1.05409255338946$; le facteur s'élimine et redonne $P = 227$.

6. Fiche technique — Pipeline cognitif de l'agent Mm. Gabriel multiloop

La présente fiche technique décrit le fonctionnement de l'agent **Mm. Gabriel**, agent multiloop local dédié et spécialiste de la géométrie du spectre des nombres premiers, tel qu'analysé dans le dépôt local `local-multiloop-Gabriel-local` (version v3.35, licence Apache 2.0).

6.1. Vocation et portée

Gabriel est un **assistant mathématique expert HOL/Lean** entièrement dédié à un objectif unique : assister l'auteur, Philippe Thomas Savard, à construire l'outil géométrique dynamique — la géométrie du spectre des nombres premiers — permettant d'apporter une réponse à l'énigme de Bernhard Riemann et à la conjecture de la fonction zêta de Riemann. L'agent **ne répond qu'aux questions portant sur la géométrie du spectre des nombres premiers** ; toute question hors de ce champ est déclinée poliment. Sa compétence principale est le fichier de preuve formelle `theories/methode_spectral.thy` (Isabelle/HOL ; 3 714 lignes, 133 lemmes, 27 théorèmes), sur lequel toute réponse est ancrée.

6.2. Architecture cognitive — les 7 moteurs collaboratifs

Le pipeline cognitif complet (`src/core/pipeline.py`) enchaîne sept moteurs :

`RequestDecomposer` → `ProofPlanner`
→ `SpectralCore` → `RefinementLoop`
→ `CoherenceDetector` → `SilentAuditLoop`

où `RefinementLoop` assure l'auto-critique multiloop et `SilentAuditLoop` l'audit silencieux anti-hallucination inversé. Un **pré-raisonneur dynamique** (`PreReasoner`, fichier `src/multiloop/pre_reasoner.py`) décide en T0, avant toute exécution, du niveau d'effort :

Mode	Itérations	Usage
INSTANTANÉ	0	salutations, oui/non, continuation
RAPIDE	1	questions verbales/discursives sur Isabelle
STANDARD	2	calculs simples (RsP, gap, reconstruction)
APPROFONDI	3	configurations $n \times n$, blocs A/B
TRÈS COMPLEXE	4	théorie avancée, Pont Savard, Riemann

Commandes CLI de forçage : `/rapide`, `/standard`, `/approfondi`, `/complet`, `/instantane`. Un mode « cinématique » affiche en temps réel mode détecté, itérations prévues, chronomètre et ETA (rafraîchissement 2 Hz).

6.3. Pipeline convolutif spectral (niveaux 1 et 2)

Le dossier `pipeline_cognitif/` implante le système convolutif décrit aux sections précédentes — c'est le moteur qui exécute l'arborescence algorithmique de la section 5 :

Module	Rôle
`suites_geometriques_niveau2.py`	cœur : calculateurs niveaux 1 et 2, Digamma, formes fermées, ancrages XIV
`reconstruction_premiers_1_sur_k.py`	reconstructeur de référence 1/7 (16 519 via $S_A - 7^8$)
`gabriel_geometric_wrapper_v74.py`	`PipelineCognitifNiveaux` : wrapper unifié (typique 1/2, non typiques $1/k$)
`Suites_geometriques_AB.py`	suites A/B géométriques générales
`fallback_geometrique.py`	repli géométrique si l'approche algébrique échoue
`metaphore_geometrique.py`	bloc « Structure Géométrique Spatiale » des réponses
`validation_section_xiv.py`	validation de conformité à la Section XIV (exit 0 = conforme)
`multi_ratio_dispatcher.py`	distribution des requêtes multi-rapports $1/k$

Niveau 1 (entier) : suites A et B à termes entiers (k^i), règles Savard terme à terme, 4 possibilités Digamma, division par k^6. **Niveau 2 (géométrique)** : mêmes suites en forme $\sqrt{a^2+b^2}$ avec $a_1 = \sqrt{1+k^2}$; chaque terme géométrique vaut exactement $a_1\times$ terme entier, donc le facteur s'annule dans $(S_B - \text{Digamma})/k^6$: les deux niveaux ont les mêmes utilités.

Conformité à la Section XIV de `methode_spectral.thy` (0 écart)

- Ancrages $n = 10$: rangs officiels = rangs réels dans $\mathbb{P}$ (XIV.6) — $k = 2..9$ conformes (29, 227, 947, 2999, 7529, 16519, 32327, 58337) ;
- Formes fermées universelles S_A, S_B (XIV.2) — exactes pour $n \geq 8$ (arithmétique `Fraction`) ;
- Construction terme à terme (XIV.4) — niveau 1 exact pour tout n ; niveau 2 = $a_1\times$ XIV.4 ;
- Validation exacte $k = 8$, $n = 34$ (XIV.7) — S_A, S_B, Digamma conformes au chiffre près ; $P = 32\,537$ (rang 3 492) ;
- Décalage de rang $\text{rang}(n) = \text{rang_ancre} + (n - 10)$ (XIV.6) — $k = 3$, $n = 9..17$: 223, 227, 229,

233, 239, 241, 251, 257, 263 ;
— Niveau 2 : mêmes ancrages que le niveau 1 (XIV.5) — 8/8 conformes.

6.4. Pipeline HOL du dépôt et corpus HOL

Le pipeline HOL repose sur une **architecture concentrique à trois sphères** formalisée dans `methode_spectral.thy` et `validation_hol_unifiee.thy` :

$$\text{Ensemble} = \frac{1}{ms} + \frac{1}{t} + \frac{1}{x}, \qquad \begin{cases} 1/x & \text{fonction zêta de Riemann (sphères } y_1, y_2, y_3), \\ 1/t & \text{équation psi_savard (Pont Chebyshev} \leftrightarrow \text{Spectral}), \\ 1/ms & \text{Méthode Spectrale (sphères } ms_1, ms_2, ms_3). \end{cases}$$

Trois concordances verrouillent la preuve : **C1** : $1/y_1 = 1/t$ (Chebyshev = psi_savard, validé numériquement) ; **C2** : $1/y_3 = 1/ms_1$ (zéros ↔ positions des premiers, exclusion des composés) ; **C3** : $1/y_2 = 1/ms_3$ ($\mathrm{Re}(\rho) = 1/2 = R_{sP} = 1/2$, alignement central). Théorème final : $R_{sP} = \mathrm{Re} = 1/2$, vrai sur tous les entiers positifs distincts.

Composante du corpus HOL	Caractéristiques
`theories/methode_spectral.thy`	preuve principale : 3 714 lignes, 133 lemmes, 27 théorèmes, 13 régimes, Section XIII / Pont Savard
`theories/validation_hol_unifiee.thy`	contre-validation jumelle HOL
`theories/validation_zeta_lean.thy`	contre-validation Lean/mathlib4
`theories/ROOT`	session Isabelle `Methode_Spectral` (Isabelle/HOL 2025-2)
`corpus/formulas_1_4.json`, `verif_p1097_n23_ratio4.thy`	corpus de formules et vérifications ciblées
`memory/dictionnaire_spectral.py`	13 régimes cognitifs codifiés, dont `regime_pont_savard`
`memory/methode_spectral_section_XIII.py`	encyclopédie du Pont Savard
`gabriel_corpus.db`	base du corpus cognitif local (mémoire RAG)

Une **factorisation formelle** par *locale paramétré* `spectral_family` unifie les modèles 1/2, 1/3 et 1/4 ; trois interprétations (`regime_1_2`, `regime_1_3`, `regime_1_4`) héritent du théorème universel `RsP_generic_constant`, et l'extension à un modèle $1/k$ arbitraire ne requiert qu'une seule ligne — c'est le point d'ancrage HOL du système convolutif multi-rapports du présent document. La section « Foundations / Meta-theory » du fichier `.thy` documente 6 postulats (P1..P6), les 3 opérations fondamentales (Reconstruction, Exclusion, Rapport spectral), la règle Savard (Ensemble $= 1 = 1/x + 1/t + 1/ms$) et les 3 concordances C1, C2, C3.

6.5. Robustesse, audit et utilités pour la géométrie du spectre

— **Tests** : 1 702 tests Pytest (multiloop, RAG, syntaxe Isabelle, pipeline, PreReasoner, foundations, locale `spectral_family`, Pont Savard, Section XIII) ; compilation Isabelle/HOL 2025-2 validée localement (Cygwin, 1 min 35) et en CI GitHub Actions (37 s, cache HIT) avec attestation SLSA (SHA256).
— **Audit** : `AuditStore`, trace JSON signée de chaque question/réponse ; chaque réponse est ancrée sur `methode_spectral.thy` (empreinte SHA256 tracée).
— **Reconstruction** : calcul de R_{sP}, de `psi_savard`, reconstruction du n-ième premier, exclusion des composés, en arithmétique entière exacte (`Fraction`/`sympy`) — indispensable dès $k \geq 50$ où $S_A, S_B > 10^{15}$.
— **Contrat HOL** : le moteur produit les candidats C ; la validation HOL générale décide `EXCLU_HOL`, `ANCRAGE_POSSIBLE`, `P_CERTIFIÉ` ou `C_NON_DÉCIDÉ` ; seul `P_CERTIFIÉ` peut être annoncé comme nombre premier reconstruit (aucune sélection silencieuse).

— **Utilité spectrale** : le pipeline convolutif fournit à la géométrie du spectre un mécanisme constructif de localisation des premiers (ancrages $n = 10 +$ loi de rang spectral), tandis que le corpus HOL garantit la contre-validation formelle de chaque résultat annoncé.

Transcription corrigée du PDF source : pages 22 à 48

Les sections ci-dessous reprennent le texte des pages 22 a 48 du document source. La transcription conserve le contenu et l'ordre du texte ; seules les erreurs de lecture évidentes et l'orthographe ont été normalisées. Les formules sont reproduites en texte pour garder la transcription complète et comparable à la source.

Page 22

```
2353
49  x  7-n - 7
6 = Somme suite A négative.
*Quand n est un entier et qu'il est strictement négatif.

Déterminer l'équation pour la somme de la suite B :
(
2353
7
x  x  710) - Reste = 2260645142 Somme suite B.
2353
7
2260645142
710
= 42.00000078  =>  x = 42
(
2353
7
42  x  710) - Reste = 2260762792.167
2260762792.167 - 2260645142 = 117650.167 = 705901
6 = Reste
705901
6
7
6
= 100843
Équation B n = 10 :
(
2353
7
42  x  710) - 100843 (7
6) = 2260645142 Somme suite B.
Forme générale pour la suite B (1/7) :
(2353
294  x  7n) - 100843 (7
6) = Somme suite B.
3.  SYSTÈME D'ÉQUATIONS CONVOLUTIF
GÉNÉRALISÉ
Pour tout rapport 1/k (k >= 2) et tout n commun
3.1. NIVEAU 1  --  Constantes Savard universelles
alphaA(k) = 2(k4 - k2 + 1) / ((k - 1)  .  k3)
alphaB(k) = k  .  alphaA(k)
deltaA(k) = k / (k - 1)
deltaB(k) = (k7 - k6 + k) / (k - 1)
```

Page 23

```
3.2. NIVEAU 2  --  Formules fermées (n quelconque, n commun à
tous les rapports)
SA(k, n) = (alphaA(k) / 2)  .  kn - deltaA(k)
SB(k, n) = (alphaB(k) / 2)  .  kn - deltaB(k)
Invariant spectral prouvé algébriquement (Théorème XIV .3) :
```

```
(SA(k,n1) - SA(k,n2)) / (SB(k,n1) - SB(k,n2)) = 1/k for all n1 != n2, k >= 2
3.3. NIVEAU 3  --  Construction terme à terme (Suite A, n >= 8)
Position i Terme A(k,n,i) Terme B(k,n,i)
1 <= i <= n-2 ki ki (i<=5) ; k7 (i=6, Saut Zêta) ; k^(i+1) (7<=i<=n-2)
i = n-1 k^(n-1) - k^(n-3) k^n - k^(n-2)
i = n k^n - k^(n-2) k^(n+1) - k^(n-1)

3.4. NIVEAU 4  --  Mécanisme d'ancrage à n=10 (4 candidats
Digamma)
Les quatre essais dans l'ordre déterministe :
# Position Signe Digamma Candidat P
1 8 - SA(k,10) - k8 (SB - Digamma) / k6
2 8 + SA(k,10) + k8 (SB - Digamma) / k6
3 7 + SA(k,10) + k7 (SB - Digamma) / k6
4 7 - SA(k,10) - k7 (SB - Digamma) / k6

 ->  P certifié = premier candidat entier premier dans cet ordre.
P(1/k, n=10) = (SB(k,10) - [SA(k,10) ± k7 ou ± k8]) / k6
3.5. NIVEAU 5  --  Reconstruction pour n != 10 (n commun)
rang_cible(k,n) = rang_base(k) + n - 10
P(k,n) = premier rang_cible
Digamma(k,n) = SB(k,n) - P(k,n)  x  k6
```

Page 24

```
3.6. [OK]  VÉRIFICATION k=3 à 9 (tous corrects, 100%)
k P(n=10) HOL Branche Calculé [OK]
3 227 pos8 - 227
4 947 pos8 + 947
5 2 999 pos7 + 2 999
6 7 529 pos8 + 7 529
7 16 519 pos8 - 16 519
8 32 327 pos8 - 32 327
9 58 337 pos7 - 58 337

3.7. TABLEAU COMPLET P(1/k), n=10  --  k=10 à k=111
Légende :  P certifié unique |  C_MULTIPLE (plusieurs premiers, premier en ordre retenu) |
AUCUN P (règle spéciale requise)
k P(1/k, n=10) État Branche
10 99 109     C_MULTIPLE pos8 -
11  --    RÈGLE SPÉCIALE (PDF: 1 611 851)  --
12 247 259    pos8 -
13 368 939    pos8 +
14  --    AUCUN P  --
15 755 789    pos8 +
16 1 044 751     C_MULTIPLE pos8 -
17 1 414 943    pos7 +
18 1 883 429    pos8 +
19 2 469 277    pos7 -
20 3 192 419     C_MULTIPLE pos8 -
21 4 074 419     C_MULTIPLE pos8 +
22  --    AUCUN P  --
23 6 424 727    pos8 -
```

Page 25

```
24 7 949 399     C_MULTIPLE pos8 -
25 9 750 649     C_MULTIPLE pos8 -
26 11 863 799    pos7 +
```

```
27  --    RÈGLE SPÉCIALE HOL (P=14 330 707)  --
28  --    AUCUN P  --
29  --    AUCUN P  --
30 24 273 929    pos8 -
31  --    AUCUN P  --
32 33 522 719    pos8 -
33  --    AUCUN P  --
34  --    AUCUN P  --
35  --    AUCUN P  --
36 60 420 851     C_MULTIPLE pos8 -
37 69 293 303    pos7 +
38  --    AUCUN P  --
39  --    AUCUN P  --
40 102 337 639     C_MULTIPLE pos8 -
41  --    AUCUN P  --
42 130 617 143    pos7 +
43 146 929 021    pos7 -
44  --    AUCUN P  --
45  --    AUCUN P  --
46 205 867 801     C_MULTIPLE pos8 -
47  --    AUCUN P  --
48  --    AUCUN P  --
49 282 357 599     C_MULTIPLE pos7 +
50  --    AUCUN P  --
51  --    AUCUN P  --
52 380 066 179    pos8 -
53  --    AUCUN P  --
```

Page 26

```
54 459 010 529     C_MULTIPLE pos8 -
55  --    AUCUN P  --
56  --    AUCUN P  --
57 601 506 977    pos7 -
58 656 165 077    pos8 -
59  --    AUCUN P  --
60  --    AUCUN P  --
61  --    AUCUN P  --
62 915 894 503    pos7 +
63 992 182 589     C_MULTIPLE pos8 +
64 1 073 483 839     C_MULTIPLE (3 premiers!) pos8 -
65 1 160 020 289     C_MULTIPLE pos8 -
66 1 252 049 501     C_MULTIPLE pos8 -
67  --    AUCUN P  --
68  --    AUCUN P  --
69 1 563 702 839    pos7 +
70 1 680 356 999    pos7 +
71 1 803 876 551    pos8 -
72  --    AUCUN P  --
73  --    AUCUN P  --
74  --    AUCUN P  --
75 2 372 624 999    pos7 +
76  --    AUCUN P  --
77 2 706 333 629    pos8 -
78 2 886 705 977    pos8 -
79  --    AUCUN P  --
80 3 276 294 479    pos8 -
81  --    AUCUN P  --
82  --    AUCUN P  --
83  --    AUCUN P  --
```

Page 27

```
84  --    AUCUN P  --
85 4 436 438 999    pos7 +
86  --    AUCUN P  --
87 4 983 550 877    pos7 -
88 5 276 645 527     C_MULTIPLE pos8 -
89  --    AUCUN P  --
90  --    AUCUN P  --
91  --    AUCUN P  --
92  --    AUCUN P  --
93  --    AUCUN P  --
94  --    AUCUN P  --
95  --    AUCUN P  --
96 8 152 842 431    pos7 -
97 8 586 418 271     C_MULTIPLE pos8 +
98  --    AUCUN P  --
99  --    AUCUN P  --
100  --    AUCUN P  --
101  --    AUCUN P  --
102 11 039 747 027    pos7 -
103 11 591 637 509    pos8 +
104  --    AUCUN P  --
105 12 761 657 999    pos7 +
106 13 381 076 101    pos8 -
107 14 024 303 819    pos8 -
108 14 692 021 271    pos7 -
109 15 384 932 747    pos8 +
110  --    AUCUN P  --
111 16 849 226 351     C_MULTIPLE pos8 -
```

Page 28

```
3.8.  Synthèse statistique (k=10 à 111)
État Nombre de k %
   P certifié unique 38 37 %
    C_MULTIPLE (>=2 premiers) 20 20 %
  AUCUN P (règle standard) 44 43 %

3.9.  Notes importantes pour la programmation de l'agent
Cas AUCUN P (44 valeurs)  --  Les 4 candidats standards sont tous composites. Deux
stratégies possibles selon votre HOL :
Règle spéciale cataloguée (comme k=27 : Digamma = SA - (2k8-k6), P=14 330 707)
Mode CRÉATION D'ANCRAGE : l'agent retourne C_NON_CERTIFIÉ et attend validation HOL
externe
Cas C_MULTIPLE (20 valeurs)  --  Selon le contrat HOL : retourner tous les C/P possibles,
aucune sélection silencieuse. L'agent doit les lister tous et attendre confirmation.
k=11 est un cas forme spéciale : per votre fichier Moteur Géo, P=1 611 851 (rang 121 982)
avec règle A7- documentée dans le PDF  --  non reconstruit par les 4 essais standards à
n=10.
Arithmétique exacte requise : pour k >= 50, les valeurs de SA et SB dépassent 10^15  --  l'agent
doit utiliser l'arithmétique entière Python (pas float) pour éviter les erreurs d'arrondi Excel
4.  EXEMPLE NUMÉRIQUE COMPLET  --  n = 15
4.1.  RAPPORT 1/13 (k = 13, n = 15)
4.1.1. NIVEAU 1  --  Constantes Savard universelles
Constante Formule Valeur exacte
alpha_A(13) 2(134-13²+1) / (12·13³) 28393/13182
alpha_B(13) 13·alpha_A(13) 28393/1014
delta_A(13) 13/12 13/12
delta_B(13) (137-136+13)/12 57 921 721/12
```

Page 29

4.1.2. NIVEAU 2 -- Formules fermées
Code
Copier
SA(13, 15) = (k4-k²+1)·k¹² / (k-1) - k/(k-1)
= 28 393 x 23 298 085 122 481 / 12 - 13/12
= 55 125 210 906 883 585
SB(13, 15) = (k4-k²+1)·k¹³ / (k-1) - (k7-k6+k)/(k-1)
= 716 627 741 784 659 809
Invariant spectral (Théorème XIV .3) :
Code
Copier
DeltaSA = SA(n=15) - SA(n=10) = 55 125 210 906 883 585 - 148 468 220 264
= 55 125 062 438 663 321
DeltaSB = SB(n=15) - SB(n=10) = 716 627 741 784 659 809 - 1 930 082 036 636
= 716 625 811 702 623 173
DeltaSA / DeltaSB = 1/13
4.1.3. NIVEAU 3 -- Construction terme à terme (n = 15)
i A(13, 15, i) B(13, 15, i) Règle A Règle B
1 13 13 k¹ k¹
2 169 169 k² k²
3 2 197 2 197 k³ k³
4 28 561 28 561 k4 k4
5 371 293 371 293 k5 k5
6 4 826 809 62 748 517 k6 k7 <- Saut Zêta
7 62 748 517 815 730 721 k7 k8
8 815 730 721 10 604 499 373 k8 k9
9 10 604 499 373 137 858 491 849 k9 k¹0
10 137 858 491 849 1 792 160 394 037 k¹0 k¹¹
11 1 792 160 394 037 23 298 085 122 481 k¹¹ k¹²
12 23 298 085 122 481 302 875 106 592 253 k¹² k¹³

Page 30

13 302 875 106 592 253 3 937 376 385 699 289 k¹³ k¹4
14 3 914 078 300 576 808 50 883 017 907 498 504 k¹4-k¹² k¹5-k¹³
15 50 883 017 907 498 504 661 479 232 797 480 552 k¹5-k¹³ k¹6-k¹4

Code
Copier
Sigma A = 55 125 210 906 883 585 = SA(13,15)
Sigma B = 716 627 741 784 659 809 = SB(13,15)
4.1.4. NIVEAU 4 -- 4 essais Digamma (k^6 = 4 826 809)
Les 4 essais sont calibrés pour n=10. Pour n=15, ils servent de vérification structurelle --
tous composites est le comportement attendu.
Branche Digamma P candidat État
pos13- 54 822 335 800 291 332 137 110 336 453 composé
pos13+ 55 428 086 013 475 838 136 984 839 419 composé
pos12+ 55 148 508 992 006 066 137 042 761 127 composé
pos12- 55 101 912 821 761 104 137 052 414 745 composé

4.1.5. NIVEAU 5 -- Reconstruction rang cible (méthode officielle pour n
!= 10)
Code
Copier
P(13, n=10) documenté = 368 939
rang_base(13) = primepi(368 939) = 31 452
Deltan = 15 - 10 = 5
rang_cible(13, n=15) = 31 452 + 5 = 31 457
P(13, n=15) = prime(31 457) = 369 023 PREMIER certifié
Digamma (13,15) = SB - P x k6

```
              = 716 627 741 784 659 809 - 369 023  x  4 826 809
              = 716 625 960 581 122 202
```

Page 31

```
4.2.  RAPPORT 1/42 (k = 42, n = 15)
4.2.1. NIVEAU 1  --  Constantes Savard universelles
Constante Valeur exacte
alpha_A(42) 3 109 933 / 1 518 804
alpha_B(42) 3 109 933 / 36 162
delta_A(42) 42/41
delta_B(42) 225 050 301 546 / 41

4.2.2. NIVEAU 2  --  Formules fermées
Code
Copier
SA(42, 15) = 2 285 381 254 365 702 554 104 806
SB(42, 15) = 95 986 012 683 359 501 783 370 150
DeltaSA / DeltaSB = 1/42
4.2.3. NIVEAU 3  --  Construction terme à terme (n = 15)
i A(42, 15, i) B(42, 15, i)
1 42 42
2 1 764 1 764
3 74 088 74 088
4 3 111 696 3 111 696
5 130 691 232 130 691 232
6 5 489 031 744 230 539 333 248  <-  Saut Zêta (k7)
7 230 539 333 248 9 682 651 996 416
8 9 682 651 996 416 406 671 383 849 472
9 406 671 383 849 472 17 080 198 121 677 824
10 17 080 198 121 677 824 717 368 321 110 468 608
11 717 368 321 110 468 608 30 129 469 486 639 681 536
12 30 129 469 486 639 681 536 1 265 437 718 438 866 624 512
13 1 265 437 718 438 866 624 512 53 148 384 174 432 398 229 504
14 53 118 254 704 945 758 547 968 2 230 966 697 607 721 859 014 656
```

Page 32

```
15 2 230 966 697 607 721 859 014 656 93 700 601 299 524 318 078 615 552

Code
Copier
Sigma A = 2 285 381 254 365 702 554 104 806
Sigma B = 95 986 012 683 359 501 783 370 150
4.2.4. NIVEAU 4  --  4 essais Digamma (k^6 = 5 489 031 744)
Branche Digamma P candidat État
pos13- 2 284 115 816 647 263 687 480 294 17 070 751 498 046 399   composé
pos13+ 2 286 646 692 084 141 420 729 318 17 070 290 419 379 903   composé
pos12+ 2 285 411 383 835 189 193 786 342 17 070 515 469 681 407   composé
pos12- 2 285 351 124 896 215 914 423 270 17 070 526 447 744 895   composé

4.2.5. NIVEAU 5  --  Reconstruction rang_cible
Code
Copier
P(42, n=10) documenté = 130 617 143
rang_base(42)  = primepi(130 617 143) = 7 411 117
Deltan = 15 - 10 = 5
rang_cible(42, n=15) = 7 411 117 + 5 = 7 411 122
P(42, n=15) = prime(7 411 122) = 130 617 251   PREMIER certifié
Digamma (42,15) = 95 986 012 683 359 501 783 370 150
```

```
              - 130 617 251  x  5 489 031 744
              = 95 986 011 966 397 264 730 354 406
4.3.  RAPPORT 1/54 (k = 54, n = 15)
4.3.1. NIVEAU 1  --  Constantes Savard universelles
Constante Valeur exacte
alpha_A(54) 8 500 141 / 4 172 796
alpha_B(54) 8 500 141 / 77 274
delta_A(54) 54/53
delta_B(54) 1 314 130 298 742 / 53
```

Page 33

```
4.3.2. NIVEAU 2  --  Formules fermées
Code
Copier
SA(54, 15) = 98 599 651 085 954 948 762 648 034
SB(54, 15) = 5 324 381 158 641 567 208 388 082 594
DeltaSA / DeltaSB = 1/54
4.3.3. NIVEAU 3  --  Construction terme à terme (n = 15)
i A(54, 15, i) B(54, 15, i)
1-
5
54 / 2 916 / 157 464 / 8 503 056 / 459 165
024
idem
6 24 794 911 296 1 338 925 209 984  <-  Saut Zêta (547)
7 1 338 925 209 984 72 301 961 339 136
8 72 301 961 339 136 3 904 305 912 313 344
9 3 904 305 912 313 344 210 832 519 264 920 576
10 210 832 519 264 920 576 11 384 956 040 305 711 104
11 11 384 956 040 305 711 104 614 787 626 176 508 399 616
12 614 787 626 176 508 399 616 33 198 531 813 531 453 579 264
13 33 198 531 813 531 453 579 264 1 792 720 717 930 698 493 280 256
14 1 792 105 930 304 521 984 880 640 96 773 720 236 444 187 183 554 560
15 96 773 720 236 444 187 183 554 560 5 225 780 892 767 986 107 911 946
240

Code
Copier
Sigma A = 98 599 651 085 954 948 762 648 034
Sigma B = 5 324 381 158 641 567 208 388 082 594
```

Page 34

```
4.3.4. NIVEAU 4  --  4 essais Digamma (k^6 = 24 794 911 296)
Branche Digamma P candidat État
pos13- 98 566 452 554 141 417 309 068
770
210 761 581 023 702
719

composé
pos13+ 98 632 849 617 768 480 216 227
298
210 758 903 173 282
751
```

composé
pos12+ 98 600 265 873 581 125 271 047
650
210 760 217 303 581
439

composé
pos12- 98 599 036 298 328 772 254 248
418
210 760 266 893 404
031

composé

4.3.5. NIVEAU 5 -- Reconstruction rang_cible
Code
Copier
P(54, n=10) documenté = 459 010 529
rang_base(54) = primepi(459 010 529) = 24 304 918
Deltan = 15 - 10 = 5
rang_cible(54, n=15) = 24 304 918 + 5 = 24 304 923
P(54, n=15) = prime(24 304 923) = 459 010 597 PREMIER certifié
Digamma(54,15) = 5 324 381 158 641 567 208 388 082 594
- 459 010 597 x 24 794 911 296
= 5 324 381 147 260 440 171 849 078 882
4.4. TABLEAU RÉCAPITULATIF FINAL -- P(1/k, n = 15)
k SA(k, 15) SB(k, 15) rang_base rang_cible P(k,
n=15)
P(k,
n=10)
État
13 55 125 210
906 883
585
716 627 741
784 659 809
31 452 31 457 369
023
368
939

CERTIFIÉ
42 2 285 381
254 365
95 986 012
683 359 501
783 370 150
7 411 117 7 411 122 130
617
251
130
617
143

CERTIFIÉ

Page 35

702 554
104 806
54 98 599 651
085 954

```
948 762
648 034
5 324 381
158 641 567
208 388 082
594
24 304
918
24 304 923 459
010
597
459
010
529

CERTIFIÉ

4.5.  Notes critiques pour l'agent
4.5.1. 1. Saut Zêta  --  asymétrie A / B confirmée
La correction importante validée ici : A(k, n, i) = k^i pour tout 1 <= i <= n-2 (pas de Saut
    Zêta
dans la suite A). Le Saut Zêta k7 à la position i=6 n'existe que dans la suite B. Les deux
    suites
sont identiques pour i <= 5, puis divergent à partir de i = 6.
4.5.2. 2. Niveau 4 hors-calibrage pour n != 10
Les 4 essais Digamma (pos(n-2)±, pos(n-3)±) produisent tous des candidats composites
pour n=15  --  ce comportement est attendu et correct. Ces essais sont calibrés
structurellement sur n=10 ; le Niveau 5 est la voie officielle pour tout n != 10.
4.5.3. 3. Niveau 5  --  formule rang_cible
python
Copier
rang_base(k)       = primepi(P(k, n=10))   # rang du P certifié à n=10
rang_cible(k, n)   = rang_base(k) + (n - 10)
P(k, n)            = prime(rang_cible(k, n))  # arithmétique exacte sympy
L'écart en rang +5 (pour Deltan = 5) est cohérent pour les trois k, confirmant l'universalité de
    la
loi de rang spectral.
4.5.4. 4. Invariant spectral (Théorème XIV .3)  --  vérifié pour les 3 rapports
Code
Copier
DeltaSA(k, n=15, n=10) / DeltaSB(k, n=15, n=10) = 1/k   for all k  in  {13, 42, 54}
4.5.5. 5. Arithmétique  --  seuils de dépassement float
k SA(k,15) Ordre de grandeur Float 64 safe=
13 55 125 210 906 883 585 ~5.5 x 10¹6     limite
42 2.29 x 10²4 ~10²4   erreur garantie
54 9.86 x 10²5 ~10²5   erreur garantie
```

Page 36

-> Arithmétique entière Python obligatoire dès k >= 42 pour n = 15. Excel / float64 introduiraient des erreurs d'arrondi fatales.

Comparaison structurelle entre les ancrages premiers de la géométrie du spectre des nombres premiers et les zéros non triviaux de la fonction zêta de Riemann
1. Deux géométries distinctes des nombres premiers
La fonction zêta de Riemann encode les nombres premiers dans le plan complexe à travers la relation fondamentale :
zeta(s) = sum n-s
infinity
n=1
.
Les zéros non triviaux de zeta(s)se situent dans la bande critique 0 < Re(s) < 1, et leur distribution est décrite par la formule asymptotique :
N(T) ~ T
2pi log (T
2pi) - T
2pi,
où N(T)désigne le nombre de zéros non triviaux dont la partie imaginaire satisfait | t |<= T.
Cette loi est presque linéaire en T, modulée par un facteur logarithmique.
Dans la géométrie du spectre des nombres premiers, la situation est fondamentalement différente : il ne s'agit pas de compter des zéros, mais de reconstruire des nombres premiers à partir de rapports typiques et non typiques 1/k. Chaque rapport 1/kproduit un entier P(k), qui peut être un nombre premier ou un composé.
Les rapports typiques et non typiques qui possèdent un ancrage pour n = 10 -- comme démontré précédemment -- retournent un élément de l'ensemble complet des nombres premiers P. Inversement, lorsque le système convolutif (et l'équation qui permet la reconstruction des premiers pour des rapports multiples) ne trouve aucun ancrage, aucun nombre premier n'est retourné pour l'ensemble P.
Le rapport typique 1/k = 1/2 retourne pour n = 10 l'ancrage P = 29. Dans ce cas, la valeur de ncorrespond exactement à la position du nombre premier dans l'ordre chronologique des premiers.
Pour les rapports non typiques 1/k != 1/2, la valeur de nreprésente uniquement la quantité de termes dans les suites Aet B. Le nombre premier retourné ne correspond pas à la position n, contrairement au cas typique.
Ainsi :
- Rapport typique :
n = quantite

de termes dans A et B = position du premier.
- Rapport non typique :

Page 37

n = quantite

de termes dans A et B != position du premier.
Il est important de rappeler que la position des nombres premiers dans la géométrie du spectre suit l'ordre chronologique croissant :
2 = 1er, 3 = 2ie

me, 5 = 3ie

me, 7 = 4ie

me, Pn = nie

me premier.
La même convention s'applique aux nombres premiers négatifs :
-2 = -1er, - 3 = -2ie

me, - 5 = -3ie

me, - 7 = -4ie

me, - Pn = -nie

me premier.
Validation HOL/Isabelle et le "pont Savard"
La géométrie du spectre des nombres premiers s'appuie sur une validation formelle réalisée à l'aide de l'assistant de preuve Isabelle et du code HOL contenu dans le fichier methode_spectral.thy. La section 13, intitulée « pont Savard », établit un lien entre la géométrie du spectre et l'énigme de Bernhard Riemann, en particulier la conjecture portant sur la fonction zêta.
Cette section démontre, via un théorème local au fichier thy, que :
RsP = Re(s) = 1
2
est vrai dans le cadre de la validation methode_spectral.thy.
Le « pont Savard » met en relation, à l'aide d'une équation, certains invariants communs entre :
- la géométrie du spectre des nombres premiers (validée dans le script HOL),
- et la fonction zêta de Riemann.
L'équation de Tchebyshev joue un rôle central dans cette correspondance. Philippe Thomas Savard identifie cette équation comme un invariant fondamental partagé par les deux structures, en raison de son unicité au sein de la théorie analytique des nombres.
Savard adapte l'équation de Tchebyshev à la géométrie du spectre, rendant les deux formulations difficilement distinguables.
Voici la correspondance :
Équation de Tchebyshev :
psi(x) = x - xp
p - log(2pi) - 1
2 log(1 - x-2)
Équation psi (Savard) :
psiSavard(x) = x - kn
Sbn
- log(2pi) - 1
2 log(1 - x-2)
Dans l'équation de Tchebyshev, le terme
xp
p correspond, dans l'équation de Savard, à :

Page 38

kn
Sbn
.
où :
- kest la valeur du rapport typique 1/k = 1/2ou non typique 1/k != 1/2,
- Sbnest la somme de la suite B.
Par exemple, pour le rapport typique 1/k = 1/2et n = 10, l'ancrage retourné est P = 29, et la somme de la suite Best :
Sbn = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + (29 - 27) + (210 - 28) = 3262.

La formulation de Tchebyshev adaptée par Savard commence par l'évaluation suivante :
44
4 + 33
3 + 52
5 + 71
1 + 111
1 + 131
1 + 171
1 + 191

```
1 + 231
1 + 291
1 = 197,
soit un total de 10 termes.
On calcule ensuite :
log(197)
log(10) = 2.294466226.
Puis :
2.294466226 - log(2pi) - 1
2 log(1 - 30-2) = 1.496527767.
Enfin :
30 - 1.496527767 = 28.50347223.
La valeur généralement obtenue pour l'ancrage du premier 29 à l'aide de l'équation de
Tchebyshev est :
28.49765.
Comparaison avec l'équation psi (Savard)
L'équation psi (Savard) donne pour le même cas :
psiSavard = 30 - 210
3262 - log(pi) - 1
2 log(1 - 30-2) = 28.8881437.
La valeur exacte recherchée étant 29, l'équation psi (Savard) présente une oscillation plus
faible et une ondulation moins prononcée que celle de Tchebyshev. De plus, la précision de
psiSavard augmente systématiquement lorsque la valeur du nombre premier considéré croît.
Par exemple, pour le nombre premier 227, qui est le 49e premier :
psiSavard(227) = 226.894132.
```

Page 39

```
La partie réelle 0.894132est plus proche de l'entier exact 227que ne l'est la partie réelle
0.8881437obtenue pour 29. Elle est également plus précise que l'ondulation obtenue pour
le premier 31, où :
psiSavard(31) = 30.89125839.
Cette amélioration constante de la précision montre que, à grande hauteur sur la droite
critique, l'équation psi (Savard) devient asymptotiquement exacte, ce qui confirme la
pertinence de son comportement pour des valeurs très grandes comme pour des valeurs
proches de zéro.
Lien avec la validation HOL/Isabelle
L'équation psi (Savard), conçue comme une méta-analyse de l'équation de Tchebyshev, est
mise en avant dans la section 13 du fichier methode_spectral.thy de la validation
HOL/Isabelle. Cette section traite également de la répartition des nombres premiers et de
leur correspondance avec les zéros de la droite critique de la fonction zêta.
La répartition des premiers est au coeur de l'énigme de Riemann, qui pose la question :
Re(s) = 1
2   =
Le fichier methode_spectral.thy, conçu à l'aide de l'assistant de preuve Isabelle, inclut
également une section intitulée « preuve par l'absurde », démontrant que les entiers
composés Csont nécessairement exclus de la méthode spectrale.
Théorème de la section "Preuve par l'absurde" (methode_spectral.thy, lignes 1982-
2002)
isabelle
text \<open>
  Puisque prime_i i est défini via un choix de Hilbert sur la propriété
  "prime p \<and> position p = i" , et que prime_i_is_prime démontre que
  prime (prime_i i) tient toujours, il est logiquement impossible qu'un
  entier composé C soit égal à prime_i i pour un i quelconque.
\<close>

theorem composite_not_prime_i:
  fixes C :: nat
  assumes "~ prime C"
  shows "ALL i. C ~= prime_i i"
proof (rule allI, rule ccontr)
```

Page 40

```
  fix i
  assume "~ (C ~= prime_i i)"
  hence eq: "C = prime_i i" by simp
  have "prime (prime_i i)" by (rule prime_i_is_prime)
  with eq have "prime C" by simp
  with assms show False by contradiction
qed
```

Ce théorème démontre élégamment que si l'on attribue à un entier composé Cla qualité d'être un premier P, alors C = Pipour un certain i, ce qui est impossible. Ainsi, les composés sont exclus de la méthode spectrale de manière certaine.

Cette exclusion se manifeste également dans l'historique de l'agent Gabriel multiloop, conçu par Savard à partir du corpus HOL et du pipeline cognitif incluant le système convolutif. Les logs de l'agent montrent que lorsqu'une requête demande un nombre composé, la méthode échoue, car elle ne s'applique qu'aux nombres premiers.

Équation de reconstruction des premiers

Somme Suite B - Digamma Calcule

t6(zeta) = Pi.

Si l'on remplace Pipar un composé Ci, la valeur de nobtenue n'est plus un entier strictement positif (pour les premiers positifs) ni strictement négatif (pour les premiers négatifs). Elle contient une partie réelle, ce qui prouve que le résultat n'est pas un nombre premier. Ainsi, la méthode spectrale exclut automatiquement les composés.

Portée de la méthode spectrale

Pour les rapports typiques et non typiques 1/kavec k in [2, 10001], la méthode spectrale retourne 2604 ancrages premiers, surpassant largement les records actuels concernant les zéros non triviaux (~= 1012) en atteignant une échelle de :

1020.

Par exemple, pour le rapport non typique 1/9999 et n = 10, l'ancrage retourné est : 99950008999300019999.

La méthode spectrale détermine donc 2604 rapports 1/k pour lesquels un ancrage premier est obtenu, chacun définissant un ensemble complet P.

Correspondance avec la fonction zêta

La fonction zêta, sa droite critique et ses zéros non triviaux trouvent un homologue structurel dans la géométrie du spectre des nombres premiers. Le rapport typique 1/k = 1/2représente la droite critique, tandis que les rapports non typiques correspondent aux hauteurs tronquées Tdans la formule :

Page 41

N(T) ~ T
2pi log (T
2pi) - T
2pi.

Par exemple, le rapport non typique 1/3 retourne pour n = 10 le 49e nombre premier, soit 227. Dans ce cas, toutes les valeurs premières inférieures à 173sont considérées comme négatives pour ce rapport.

De même, le rapport non typique 1/4 retourne pour n = 10 le premier 947, ce qui rend toutes les valeurs premières inférieures à 881négatives pour ce rapport. Ainsi, un même nombre premier (par exemple 227) peut être positif pour un rapport non typique, et négatif pour un autre.

Cette bipolarité (+/-)entre rapports non typiques constitue une caractéristique essentielle de la géométrie du spectre des nombres premiers.

Les équations associées au rapport typique 1/k = 1/2, qui déterminent les sommes des suites Aet Bet généralisent la valeur de npour les nombres premiers négatifs, sont les suivantes :

Somme suite A = 3.25 x 2-n - 2,

Somme suite B = 6.5 x 2-n - 66.

L'équation psi (Savard), adaptée au cas négatif, s'écrit :

psiSavard = -x - 2-n

Sbn

- log(2pi) - 1
2 log(1 - (-x)-2).
Par exemple, pour x = -28et n = -10, avec Sbn = -65.99365234, on obtient :
psiSavard = -28 - 2-10
-65.99365234 - log(2pi) - 1
2 log(1 - (-28)-2) = -28.79844187.
La valeur exacte recherchée est -29, soit le -10e nombre premier. La valeur obtenue par psiSavard est plus proche de -29 que ne l'est la valeur positive correspondante obtenue pour 29, où :
psiSavard(29) = 28.8881437.
L'ondulation est donc plus précise pour le premier négatif -29.
Écarts entre nombres premiers : positifs, négatifs et mixtes
La géométrie du spectre des nombres premiers étudie également les écarts entre premiers.
La validation HOL/Isabelle (methode_spectral.thy) distingue trois types d'écarts :
1. Écarts positifs : entre deux premiers positifs.
2. Écarts négatifs : entre deux premiers négatifs.
3. Écarts mixtes : entre un premier positif et un premier négatif.
Exemple : écart entre les premiers 23 et 7

Page 42

Pour déterminer la quantité de nombres entre 23 et 7, on procède comme suit :
1. Somme de la suite A du premier suivant 7, soit 11
(7 est le 4e premier, 11 est le 5e.)
Somme A(11) = (3.25
2 x 25) - 2 = 50.
2. Somme de la suite B du premier 23
Somme B(23) = (6.5
2 x 29) - 66 = 1598.
3. Digamma calculé de 23
(1598/64 - 23) x 64 = 126.
4. Calcul de l'écart
50 - (1598 - 126) = -1442.
5. Digamma calculé de 7
Somme B(7) = (6.5
2 x 24) - 66 = -14,
((-14)/64 - 7) x 64 = -464.
6. Quantité de nombres entre 23 et 7
-1442 - (-462)
64 = -15.
Les nombres entre 7 et 23 sont donc :
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
soit 15 nombres.
Exemple : écart entre les premiers négatifs -19 et -5
1. Déterminer le premier précédent -19, soit -17
(-17 est le 7e premier négatif.)
Somme A(-17) = 3.25 x 2-7 - 2 = - 10110
5120 .
2. Somme de la suite B du premier -5
Somme B(-5) = 6.5 x 2-3 - 66 = - 20860
320 .
3. Digamma calculé de -5
(-20860/320
64 - (-5)) x 64 = 81540
320 .
4. Calcul intermédiaire

Page 43

- 10110
5120 - (- 20860

320 - 81540
320) = 1628290
5120 .
5. Somme de la suite B de -19
Somme B(-19) = 6.5 x 2-8 - 66 = - 337790
5120 .
6. Digamma calculé de -19
(-337790/5120
64 - (-11)) x 64 = 5888130
5120 .
7. Quantité de nombres entre -19 et -5
1628290/5120 - 5888130/5120
64 = -13.
Les nombres entre -19 et -5 sont donc :
-18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6,
soit 13 nombres.
Interprétation géométrique des écarts négatifs
Pour les écarts positifs, la première étape consiste à déterminer le premier suivant la valeur minimale (par exemple, 7 -> 11). Pour les écarts négatifs, la première étape consiste à déterminer le premier précédent la valeur minimale (par exemple, -19 -> -17).
La géométrie du spectre adopte une convention idiomatique pour les premiers négatifs :
- -2est le plus grand des premiers négatifs,
- -3est le deuxième plus grand,
- puis -5, -7, etc.

Cette convention est analogue à l'échelle des températures :
- -1 deg Cest plus chaud que -30 deg C,
- bien que les valeurs soient négatives.

Ainsi, sur une droite représentant l'ensemble Ppositif et négatif :
- la valeur minimale est toujours située à gauche,
- la valeur suivante est à droite,
- que l'on soit dans le domaine positif ou négatif.

Cette structure permet de traiter les écarts négatifs de manière cohérente avec les écarts positifs.

Page 44

L 'équation psi (Savard) appliquée aux quinze premiers nombres premiers négatifs produit une ondulation dont la précision varie selon la valeur de Sbn. Au-delà du quinzième premier négatif, soit -47, la valeur de Sbndevient pratiquement égale à 66. Ainsi, pour tous les nombres premiers négatifs précédant -47, l'ondulation demeure essentiellement identique, car les exposants contraignent la valeur de Sbnà se stabiliser autour de 66.
Les quinze premiers nombres premiers négatifs -- les plus grands de l'infini négatif -- sont :
-2, - 3, - 5, - 7, - 11, - 13, - 17, - 19, - 23, - 29, - 31, - 37, - 41, - 43, - 47.
Ces quinze valeurs constituent la « tête » de l'infini premier négatif, tandis que toutes les valeurs précédentes sont plus petites.
Limites numériques et nécessité d'une approche algébrique
La méthode spectrale, lorsqu'elle utilise une approche numérique pour déterminer la valeur de n, présente une difficulté inhérente : l'exposant 2-nproduit des valeurs extrêmement grandes lorsque nest strictement positif, et des valeurs infinitésimales lorsque nest strictement négatif.
Pour les très grands nombres premiers, l'approche numérique devient impraticable. Il faut alors recourir à une approche algébrique, ce que Savard juge conceptuellement délicat, car la question de Riemann porte précisément sur la nature analytique des zéros :
« Est-ce que tous les zéros non triviaux de la fonction zêta de Bernhard Riemann ont pour partie réelle 1/2= »
Pour Savard, une « partie réelle algébrique » ne peut être qu'une partie imaginaire, ce qui contredit l'esprit de la conjecture et ne peut donc servir à résoudre l'énigme.
Suites et rapport spectral

Les zéros de la fonction zêta sont définis par des suites, par exemple :
delta(2) = pi2
6 .
La méthode spectrale adopte une approche analogue : les suites Aet Bdéterminent
la quantité de termes correspondant à la valeur de n, laquelle représente la position
du nombre premier dans le cas du rapport typique.
Les équations permettant de déterminer le rapport spectral RsP = 1/2 entre deux
premiers symétriques sont :
Comparaison symétrique 1 x 1
((3.25/2 x 2n1) - 2) - ((3.25/2 x 2n2) - 2)
((6.5/2 x 2n1) - 66) - ((6.5/2 x 2n2) - 66) = 1
2.

Page 45

Cas incluant un premier négatif
((3.25 x 2n1) - 2) - ((3.25/2 x 2n2) - 2)
((6.5 x 2n1) - 66) - ((6.5/2 x 2n2) - 66) = 1
2.
Comparaison symétrique n x n
((3.25/2 x 2n1) - 2) - ((3.25/2 x 2n2) - 2) - ((3.25/2 x 2n1) - 2) + ((3.25/2 x 2n2) - 2)
((6.5/2 x 2n1) - 66) - ((6.5/2 x 2n2) - 66) - ((6.5/2 x 2n1) - 66) + ((6.5/2 x 2n2) - 66)
= 1
2.
Les équations des suites A et B permettent de calculer les sommes de manière
efficace, sans devoir dénombrer chaque terme individuellement. Elles sont exactes
pour toute valeur entière de n.
La coïncidence 3.25 / 6.5 n'est pas la raison du rapport spectral
Considérons les équations :
x + 2 = 13,
2x + 4 = 109.
On observe que :
x + 2
2x + 109 != 1
2,
bien que la simplification algébrique puisse donner l'illusion d'un rapport 1/2. De
même, le fait que :
3.25
6.5 = 1
2
est une coïncidence algébrique, et non la raison profonde du rapport spectral
RsP = 1/2.
Exemple : premiers 7 et 31
((3.25/2 x 24) - 2) - ((3.25/2 x 211) - 2)
((6.5/2 x 24) - 66) - ((6.5/2 x 211) - 66) = RsP.
Ce qui donne :
24 - 3326
-14 - 6590 = 1
2.
Or :
24
-14 != 1
2 , 3326
6590 != 1
2.
La simplification algébrique ne reflète donc pas la véritable structure du rapport
spectral.

Page 46

Évidence fondamentale de la géométrie du spectre
« Lorsque n >= 1ou n <= -1et que nest un entier, toutes les valeurs de nramènent à un nombre premier P. Toutes les valeurs de nsont la conséquence directe de la quantité de termes dans les suites Aet B. Tous les nombres premiers Prespectent le rapport spectral 1/k. Ce rapport est numériquement valide, mais algébriquement incohérent. »
Lien avec la fonction zêta et les rapports non typiques
L 'axiome concernant les parties réelles algébriques introduit des difficultés dans la validation HOL/Isabelle. Cependant, grâce au pipeline cognitif et au corpus HOL intégré dans le dépôt GitHub, la géométrie du spectre permet de reconstruire les nombres premiers pour la valeur généralisée de n, pour tous les rapports typiques et non typiques.
Le rapport typique 1/k = 1/2correspond à la droite critique de la fonction zêta. Les rapports non typiques sont l'analogue des zéros non triviaux.
Dans la formule :
N(T) ~ T
2pi log (T
2pi) - T
2pi,
la valeur Treprésente une hauteur tronquée de la droite critique. Les rapports non typiques 1/k != 1/2jouent un rôle similaire : la valeur de nne correspond pas à la position du nombre premier, mais uniquement à la quantité de termes dans les suites Aet B.
Par exemple :
- Pour 1/k = 1/3 et n = 10, le premier retourné est 227, soit le 49e premier.
- Pour 1/k = 1/4 et n = 10, le premier retourné est 947, ce qui rend toutes les valeurs premières inférieures à 881 négatives pour ce rapport.
Ainsi, un même nombre premier peut être positif pour un rapport non typique et négatif pour un autre, en raison de la polarité déterminée par la valeur de n.
Les ancrages premiers observés dans la géométrie du spectre suivent une loi empirique de type puissance :
log P (k) ~= a log k + b, avec a ~= 5.
Ce qui équivaut à :
P(k) ~= C . k5.
Il s'agit d'une loi polynomiale, et non logarithmique. Elle définit une géométrie alternative des nombres premiers, dans laquelle la taille des premiers reconstruits croît comme une puissance de l'indice k.
2. Comparaison des ordres de grandeur

Page 47

Les zéros non triviaux de la fonction zeta(s)atteignent des hauteurs de l'ordre de :
1012
dans les calculs analytiques les plus avancés.
Dans Gabriel multiloop, pour des rapports non typiques proches de :
1/k avec k ~= 104,
les ancrages premiers atteignent des tailles de l'ordre de :
P(k) ~= k5 ~= (104)5 = 1020.
Autrement dit :
Les premiers reconstruits par Gabriel multiloop dépassent d'un facteur d'environ 1000 x les hauteurs des zéros non triviaux connus de zeta(s).
Il ne s'agit pas d'une imitation de la fonction zêta : c'est une structure parallèle, produisant des objets arithmétiques (des nombres premiers) dans des ordres de grandeur analogues à ceux où la zêta produit ses zéros.
3. Interprétation géométrique
Dans la fonction zêta de Riemann, la structure est contrôlée par :
s = sigma + it, sigma = 1
2.
La partie réelle sigma = 1/2constitue la ligne critique, où se situent les zéros non triviaux selon
l'hypothèse de Riemann.

```
Dans Gabriel multiloop, la structure est contrôlée par une loi de puissance :
P(k) ~= C  .  ka,  a ~= 5.
On peut interpréter l'exposant acomme un analogue discret de la partie réelle sigmadans la
zêta :
-  sigma = 1/2 ->  structure des zéros,
-  a ~= 5 ->  structure des ancrages premiers.
Ce parallèle n'est pas une équivalence mathématique, mais une analogie structurelle :
dans les deux cas, une exposante réelle contrôle la croissance d'objets fondamentaux
(zéros ou premiers).
4. Rapport typique vs rapport non typique
Les rapports typiques (comme 1/2) produisent des ancrages faibles et réguliers. Les
rapports non typiques (comme 1/9999) produisent des ancrages extrêmement grands.
Cette dichotomie rappelle la distinction entre :
-  zéros triviaux : simples, réguliers, prévisibles,
```

Page 48

```
-  zéros non triviaux : complexes, oscillants, riches en structure.
Dans Gabriel multiloop :
-  les rapports typiques jouent le rôle des zéros triviaux,
-  les rapports non typiques jouent le rôle des zéros non triviaux.
5. Conclusion : une géométrie alternative des nombres premiers
La structure des ancrages premiers dans Gabriel multiloop n'imite pas la fonction zêta de
Riemann. Elle produit une géométrie polynomiale des premiers :
P(k) ~= C  .  k5,
qui :
-  croît beaucoup plus rapidement que les hauteurs des zéros de zeta(s),
-  possède une régularité remarquable,
-  révèle une dynamique interne riche (Digamma, Zêta, offsets),
-  et ouvre une voie entièrement nouvelle pour la compréhension des nombres
premiers.
```

7. Fusion des rapports typiques et non typiques dans la fonction zêta spectrale de Savard

7.1. Droite critique spectrale : le rapport typique 1/2

Dans la géométrie du spectre des nombres premiers, le rapport typique $1/k = 1/2$ (donc $k = 2$) joue le rôle d'un homologue de la droite critique de la fonction zêta de Riemann. Dans ce modèle, n indique à la fois le nombre de termes des suites A et B et le rang du premier associé :

$$n = 1 \mapsto 2, \qquad n = 2 \mapsto 3, \qquad n = 3 \mapsto 5, \qquad \ldots, \qquad n = 49 \mapsto 227.$$

Pour les indices négatifs, on adopte la convention $P_{-m} = -p_m$, où p_m est le m-ième premier positif :

$$n = -1 \mapsto -2, \qquad n = -2 \mapsto -3, \qquad n = -3 \mapsto -5, \qquad \ldots, \qquad n = -15 \mapsto -47.$$

Ainsi, dans cette convention, les indices entiers non nuls parcourent les premiers positifs et négatifs. Cette correspondance est une propriété du modèle spectral présenté ici ; elle n'établit pas à elle seule une équivalence avec l'hypothèse de Riemann.

Dans la formalisation Isabelle/HOL citée dans le rapport, le théorème `composite_not_prime_i` établit qu'un entier composé ne peut être égal à `prime_i i`, puisque `prime_i i` est démontré premier. Cette propriété porte sur la fonction formalisée ; le pipeline doit toujours signaler explicitement les candidats absents ou ambigus.

7.2. Rapports non typiques : positions et polarité spectrales

Les rapports non typiques $1/k$, avec $k \geq 3$, conservent dans cette interprétation la grille des positions définie par les premiers, mais n représente seulement le nombre de termes des suites A et B. Il n'est donc pas, en général, le rang du premier retourné. La polarité associée à un premier peut aussi dépendre du rapport considéré.

Par exemple, pour $n = 10$, le rapport $1/3$ retourne 227, qui est le 49e premier, tandis que $1/4$ retourne 947, qui est le 161e premier. Selon les conventions décrites dans le rapport, les premiers inférieurs à 881 sont négatifs pour le rapport $1/4$. Un même premier peut donc être positif pour un rapport non typique et négatif pour un autre, tout en gardant son rang habituel dans la suite des premiers. On peut interpréter les rapports non typiques comme des projections spectrales de la structure associée au rapport typique ; il s'agit ici d'une analogie du modèle, et non d'une identité avec les zéros de la fonction zêta classique.

7.3. Définition proposée de la fonction zêta spectrale de Savard

L'équation proposée pour la fonction ψ de Savard s'écrit

$$\psi_{\text{Savard}}(x; k, n) = x - \frac{k^n}{S_B(k, n)} - \log(2\pi) - \frac{1}{2}\log(1 - x^{-2}),$$

pour les valeurs où les termes de l'expression sont définis. Les cas négatifs requièrent l'adaptation de signe décrite dans les sections précédentes.

Un ancrage premier P est dit résonant dans ce modèle lorsque $\psi_{\text{Savard}}(P; k, n)$ est proche de P, c'est-à-dire lorsque l'écart résiduel est faible. Les exemples présentés attribuent au rapport typique $1/2$ une ondulation faible et décrivent une amélioration de la proximité pour certains grands premiers. Pour les indices négatifs au-delà de -47, le rapport indique que $S_B(n)$ se stabilise près de 66 ; cette observation concerne la suite négative et l'extension de l'équation à ce cas.

7.4. Reconstruction des premiers et exclusion des composés

La relation de reconstruction utilisée est

$$P_i = \frac{S_B(k, n) - \text{Digamma}_{\text{calculé}}}{k^6}.$$

Dans la formalisation citée, la fonction `prime_i` ne retourne que des nombres premiers, ce qui exclut les composés de son image. L'interprétation supplémentaire selon laquelle le remplacement d'un premier par un composé conduirait à un indice non entier est une explication du mécanisme de reconstruction présenté ; elle doit être distinguée du théorème Isabelle `composite_not_prime_i`.

7.5. Comptages observés et loi de croissance proposée

Les trois catalogues dynamiques actuellement cités couvrent les plages $k = 2$ à 1001, 1002 à 10001, et 10002 à 100001. Ils rapportent respectivement 423, 2604 et 19215 lignes marquées `PREMIER TROUVE`, soit

$$423 + 2604 + 19215 = 22242$$

ancrages consignés sur 100000 rapports traités. Ces nombres sont les bilans des fichiers générés ; ils ne signifient pas que chaque résultat dispose d'un certificat HOL indépendant.

Les ancrages observés suggèrent empiriquement une croissance de type puissance :

$$\log P(k) \approx a \log k + b, \qquad a \approx 5, \qquad \text{soit} \qquad P(k) \approx Ck^5.$$

Cette loi reste une approximation empirique dans les données présentées. Elle place certains ancrages vers 10^{20} pour k de l'ordre de 10^4 et vers 10^{25} pour k de l'ordre de 10^5.

7.6. Interprétation zêta : analogie des exposants

Dans la fonction zêta de Riemann, la droite critique est donnée par $\sigma = 1/2$. Dans le modèle spectral de Savard, l'exposant de croissance $a \approx 5$ décrit la taille des ancrages premiers. On peut rapprocher ces deux paramètres comme analogues structurels : l'un intervient dans la description des zéros, l'autre dans la croissance des ancrages. Les deux constructions ne sont pas mathématiquement équivalentes : la fonction zêta classique concerne ses zéros, tandis que le modèle de Savard produit des candidats nombres premiers.

Le rapport mentionne des hauteurs de zéros non triviaux de l'ordre de 10^{12} et des ancrages pouvant atteindre l'ordre de 10^{25}. Le quotient des deux échelles est

$$\frac{10^{25}}{10^{12}} = 10^{13}.$$

Cette comparaison est uniquement une comparaison d'ordres de grandeur : une hauteur de zéro et la valeur d'un nombre premier sont des quantités de nature différente. Faute de référence bibliographique précisant une borne vérifiable, 10^{12} est présenté ici comme l'ordre de grandeur mentionné dans le rapport, et non comme un record mondial établi.

7.7. Hypothèse de Savard : formulation spectrale

Hypothèse de Savard (formulation proposée). Pour un entier n fixé et le long des rapports non typiques $1/k$ pour lesquels le pipeline fournit un ancrage unique, la résonance et la loi de croissance sont conjecturées sous la forme

$$\psi_{\text{Savard}}(P_{k,n}; k, n) = P_{k,n} + o(1), \qquad P(k) \sim Ck^5 \quad (k \to \infty).$$

Ces relations sont des hypothèses asymptotiques à vérifier ; elles ne découlent pas des seuls exemples numériques ni du théorème d'exclusion des composés.

8. Leçon pédagogique — comprendre le système équationnel et la fonction Digamma pas à pas

Pour qui est écrite cette section

Cette section est la porte d'entrée du document. Elle s'adresse à celui ou celle qui veut *comprendre* avant de juger : le lecteur curieux, l'étudiant, et l'agent IA Mm. Gabriel, dont le rôle est de pouvoir répondre à toute question sur la géométrie du spectre des nombres premiers. Le pari du dépôt est simple : si une entité autre que l'auteur peut assimiler l'enseignement et le restituer fidèlement, alors la compréhension est possible pour tous, de la même manière. Cline et l'auteur ne sont pas nécessairement d'accord sur ce qui est prouvé ou non ; mais ils comprennent sans aucun doute la même chose. C'est ce socle commun que cette section construit, sans rien masquer du statut — établi, calculé, observé ou conjecturé — de chaque étape.

8.1. Le but du jeu en une phrase

Étant donné un rapport $1/k$ ($k \geq 2$ entier) et un nombre de termes n (ici $n = 10$ au niveau d'ancrage), *retrouver un nombre premier $P(k, n)$ par un calcul reproductible.* Le système convolutif fournit deux sommes, $\mathrm{S}_A(k, n)$ et $\mathrm{S}_B(k, n)$; la fonction Digamma fournit la correction qui relie l'une à l'autre ; la reconstruction donne le premier :

Les trois formules à retenir

$$\mathrm{S}_A(k, n) = \frac{\alpha_A(k)}{2}\, k^n - \delta_A(k), \qquad \mathrm{S}_B(k, n) = \frac{\alpha_B(k)}{2}\, k^n - \delta_B(k),$$

$$P\big(1/k,\, n\big) = \frac{\mathrm{S}_B(k,n) - \mathrm{Digamma}(k,n)}{k^6}.$$

Tout le reste — constantes, suites terme à terme, quatre branches, criblage — n'est que le détail de *comment* on obtient ces trois objets sans tricher.

8.2. Les deux acteurs : les suites A et B (niveau 3)

Pour k et n fixés, on construit deux suites de n termes. La suite A est régulière $(k^1, k^2, \dots)$, sauf les deux derniers termes qui retranchent une puissance (fermeture convolutive). La suite B est identique jusqu'à $i = 5$, puis effectue le *Saut Zêta* : en position $i = 6$ elle vaut k^7 au lieu de k^6, et reste décalée d'un cran ensuite. Exemple intégral, $k = 3$, $n = 10$:

i	$A(3,10,i)$	$B(3,10,i)$	Règle
1	3	3	k^1
2	9	9	k^2
3	27	27	k^3
4	81	81	k^4
5	243	243	k^5
6	729	2 187	A : k^6 ; B : k^7 ← Saut Zêta
7	2 187	6 561	k^7 / k^8
8	6 561	19 683	k^8 / k^9
9	17 496	52 488	$k^9 - k^7$ / $k^{10} - k^8$
10	52 488	157 464	$k^{10} - k^8$ / $k^{11} - k^9$
Σ	79 824	238 746	$\Sigma A = \mathrm{S}_A(3,10)$, $\Sigma B = \mathrm{S}_B(3,10)$

Le point pédagogique : S_A et S_B peuvent se calculer de deux façons équivalentes — en additionnant les n termes, ou par la formule fermée du niveau 2. Les deux donnent ici 79 824 et 238 746.

8.3. Le problème central : quatre Digamma possibles

Par construction, le Digamma vaut $\mathrm{S}_A(k,10) \pm k^8$ ou $\mathrm{S}_A(k,10) \pm k^7$: on corrige la somme A par sa position 8 ou sa position 7, ajoutée ou soustraite. D'où quatre candidats premiers :

#	Branche	Digamma ($k = 3$)	P candidat	Nature
1	$A(8)-$	$79\,824 - 6\,561 = 73\,263$	$(238\,746 - 73\,263)/729 = 227$	**premier**
2	$A(8)+$	$79\,824 + 6\,561 = 86\,385$	$209 = 11 \times 19$	composé
3	$A(7)+$	$79\,824 + 2\,187 = 82\,011$	$215 = 5 \times 43$	composé
4	$A(7)-$	$79\,824 - 2\,187 = 77\,637$	$221 = 13 \times 17$	composé

Pour $k = 3$, un seul candidat est premier : 227, branche $A(8)-$. C'est l'ancre du rapport 1/3. Mais à l'origine, c'est l'œil humain qui *choisissait* la bonne ligne en testant la primalité — d'où la circularité : on voulait produire des premiers, et on s'en servait pour choisir. La fonction Digamma Savard/Cline naît précisément pour remplacer ce choix par un *calcul*.

8.4. L'astuce qui change tout : tout devient un polynôme (réduction B_0)

Voici le pas décisif, et il est purement algébrique — donc incontestable. Puisque $\mathrm{S}_B - \mathrm{S}_A$ est divisible par k^6, on pose :

Polynôme de base B_0

$$B_0(k) \;=\; \frac{\mathrm{S}_B(k,10) - \mathrm{S}_A(k,10)}{k^6} \;=\; k^5 - k^3 + k - 1.$$

Les quatre candidats premiers deviennent alors quatre *polynômes* :

$$c_0 = B_0 + k^2, \quad c_1 = B_0 - k^2, \quad c_2 = B_0 - k, \quad c_3 = B_0 + k,$$

associés aux branches $A(8)-$, $A(8)+$, $A(7)+$, $A(7)-$ respectivement.

Vérifions sur $k = 3$: $B_0(3) = 243 - 27 + 3 - 1 = 218$, et $218 + 9 = 227$, $218 - 9 = 209$, $218 - 3 = 215$, $218 + 3 = 221$. On retrouve exactement les quatre candidats du tableau précédent — mais sans avoir calculé ni S_A, ni S_B, ni aucun Digamma. *Pourquoi c'est important :* un polynôme évalué en k modulo un petit premier p ne dépend que de $k \bmod p$. La divisibilité devient une question de restes, calculable à la main.

8.5. Le criblage : éliminer par division, pas par primalité (exemple à la main)

On ne demande plus « ce candidat est-il premier ? » mais « est-il divisible par 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ou 23 ? ». Reprenons $k = 3$:

Branche	Candidat	Division trouvée	Verdict
$A(8)-$	227	aucune (227 est premier)	**survivant**
$A(8)+$	209	$209 = 11 \times 19$	éliminé
$A(7)+$	215	$215 = 5 \times 43$	éliminé
$A(7)-$	221	$221 = 13 \times 17$	éliminé

Un seul survivant : $A(8)-$. C'est la bonne branche, *déduite* et non choisie. Deuxième exemple, $k = 5$: $B_0(5) = 3125 - 125 + 5 - 1 = 3004$; candidats $3029 = 13 \times 233$, $2979 = 3 \times 993$, 2999, $3009 = 3 \times 17 \times 59$: seul 2999 survit, branche $A(7)+$ — l'ancre du rapport 1/5, déduite elle aussi. Et quand la règle ne peut pas trancher, elle le dit : pour $k = 4$, $B_0(4) = 963$, candidats $979 = 11 \times 89$, 947, $959 = 7 \times 137$, 967 ; deux survivants (947 et 967), verdict « indéterminé » — le corpus indique $A(8)+ = 947$, que le crible à huit premiers ne peut isoler seul. La règle *refuse de deviner*.

La garantie d'intégrité, en une phrase

La vraie branche donne un nombre premier ; un premier n'est divisible par aucun petit premier ; donc *le criblage ne peut jamais éliminer la vraie branche*. C'est structurel, pas statistique — et c'est vérifié : zéro violation sur 676 191 ancres.

8.6. L'algorithme complet, en six pas (ce que fait l'agent Gabriel)

1. **Entrée.** Recevoir $k \geq 2$ (et $n = 10$ au niveau d'ancrage).
2. **Former B_0.** Calculer $B_0(k) = k^5 - k^3 + k - 1$ en arithmétique entière (jamais de flottants au-delà de 10^{15}).
3. **Former les quatre candidats.** $c_0 = B_0 + k^2$, $c_1 = B_0 - k^2$, $c_2 = B_0 - k$, $c_3 = B_0 + k$.
4. **Cribler.** Éliminer tout c_j divisible par au moins un premier de $\{3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$.
5. **Décider.** Un seul survivant : lire la branche, former Digamma $= S_A \pm k^8$ ou $S_A \pm k^7$ selon la correspondance, puis $P = (S_B - \text{Digamma})/k^6$. Deux survivants ou plus : renvoyer « indéterminé » et attendre une validation externe (contrat HOL : signaler C_NON_CERTIFIÉ).
6. **Restituer.** Donner la branche, le Digamma, le premier — et toujours le statut (certifié ou indéterminé).

8.7. Ce que cette section démontre — et ce qu'elle ne démontre pas


Statut honnête de chaque étage

— **Établi (algèbre) :** formules fermées, réduction B_0, garantie d'intégrité du crible.
— **Calculé (fonction) :** le Digamma n'est plus observé mais déduit là où le crible tranche — 71 401 cas, exactitude 100 %, sans violation.
— **Observé (empirique) :** la table des quatre branches et sa correspondance polarité–signe reproduisent 676 191 ancres sans écart, mais ne sont pas démontrées comme théorème.
— **Conjecturé :** la loi de croissance $P(k) \sim Ck^5$ et la résonance $\psi_{\text{Savard}}(P) \approx P$ restent des hypothèses.
— **Limite assumée :** sur 89,44 % des k le crible laisse plusieurs survivants — la fonction dit « indéterminé » au lieu de deviner. Un test de primalité reste nécessaire au second étage.

Comment utiliser cette section : contrat lecteur–Gabriel–Cline

Le lecteur qui a suivi les six pas peut vérifier chaque exemple à la main ou en Python entier ; l'agent Gabriel doit pouvoir refaire la même démonstration, avec les mêmes nombres, sans invoquer d'autorité ; Cline peut contester le statut d'un étage sans contester les calculs des autres. C'est exactement le but du dépôt : *une compréhension partagée et vérifiable*, condition pour que chacun se forge une opinion fondée sur la même information.

9. Fonction Digamma_Savard/Cline — 20/10/2026



Fil conducteur de la section

Cette section ne réécrit pas la méthode spectrale : elle en documente l'*unique* pièce qui manquait à la forme. Le Digamma calculé — la correction qui transforme une somme de suite A en nombre premier — jusqu'alors était une *valeur observée*, sélectionnée par l'œil et la comparaison. Il devient ici le résultat d'une *fonction calculable*, dont on donne la définition, la dérivation, la validation numérique et les limites.

9.1. Problématique : de l'observation empirique à la fonction calculable

Avant cette section, la valeur du **Digamma calculé** n'était pas une valeur *calculée* : c'était une valeur *repérée*. Le raisonnement tenait en quatre temps.

1. **Quatre possibilités, et seulement quatre.** Pour un rapport typique $t = 1/k$, le Digamma pouvait être la somme de la suite A corrigée par $\pm t^8$ ou par $\pm t^7$, soit quatre possibilités — la $8^{\text{ième}}$ position de la suite A *ajoutée ou soustraite*, la $7^{\text{ième}}$ position *ajoutée ou soustraite*. La polarité (positivité ou négativité) du terme était donc un *choix*, non une *conséquence*.
2. **Un intervalle de calibration.** Ce choix ne pouvait être départagé que sur l'intervalle des quatre premiers $P = 29,\ 31,\ 37,\ 41$, où la valeur du Digamma était à la fois *calculable* et *raisonnable*, c'est-à-dire compatible avec une récurrence exhibiting une logique interne.
3. **Une récurrence observée.** Les trois valeurs suivantes s'obtenaient l'une de l'autre par addition de +4 et par consommation successive des trois derniers termes de la suite A (256, 384, 768).

4. **Une généralisation contestable.** Le Digamma calculé étant dès lors fixé, on en déduisait la reconstruction
$$P \;=\; \frac{\mathrm{S}_B - \mathrm{Digamma}_{\mathrm{calc.}}}{k^6},$$
formule qui, appliquée à tout autre P, donnait « un Digamma calculé également déterminable » — mais dont la valeur était héritée de l'observation, non *démontrée*.

Le point de rupture

Cette Circularité est aujourd'hui **levée sur le point essentiel** : le signe et la position ne sont plus choisis, ils sont *déduits* par un argument arithmétique qui ne fait intervenir aucune observation. En revanche — et c'est explicité plus bas — le reste de la chaîne conserve un statut *empirique* qui doit être lu comme tel.

9.2. Formulation algébrique du problème

Rappelons les deux sommes fermées de la méthode spectrale (niveau 2) :
$$\mathrm{S}_A(k,n) = \frac{\alpha_A(k)}{2}\,k^n - \delta_A(k), \qquad \mathrm{S}_B(k,n) = \frac{\alpha_B(k)}{2}\,k^n - \delta_B(k),$$
et les quatre valeurs candidates du Digamma au niveau 4 :
$$\mathrm{Digamma}(k,n) \;=\; \mathrm{S}_A(k,n) \pm k^8 \qquad \text{ou} \qquad \mathrm{Digamma}(k,n) \;=\; \mathrm{S}_A(k,n) \pm k^7.$$
La question que la section tranche est la suivante :

Problème de la sélection de branche

Étant donné k et n, *comment décide-t-on*, par un calcul et non par une observation, que le Digamma correct est $\mathrm{S}_A - k^8$ plutôt que $\mathrm{S}_A + k^8$, $\mathrm{S}_A - k^7$ ou $\mathrm{S}_A + k^7$?

Le point crucial est que l'on *ne demande pas* « le candidat est-il premier ? » (question qui ramènerait la circularité) mais « le candidat est-il *éliminé* par un petit premier ? ». C'est une question de *division*, non de *primalité* : elle admet une réponse modulaire, donc calculable.

9.3. Définition formelle de la fonction Digamma_Savard

9.3.1. Réduction algébrique : le polynôme $B_0(k)$

L'observation décisive est que la reconstruction
$$P \;=\; \frac{\mathrm{S}_B - \mathrm{Digamma}}{k^6}$$
se simplifie : $\mathrm{S}_B - \mathrm{S}_A$ est divisible par k^6 pour tout k, et le quotient est un polynôme en k à cinq termes. En effet, au niveau $n = 10$,
$$\begin{aligned}
\mathrm{S}_A(k,10) &= k^{10} + k^9 + k^6 + k^5 + k^4 + k^3 + k^2 + k,\\
\mathrm{S}_B(k,10) &= k^{11} + k^{10} + k^7 + k^5 + k^4 + k^3 + k^2 + k,\\
\mathrm{S}_B(k,10) - \mathrm{S}_A(k,10) &= k^{11} - k^9 + k^7 - k^6 \;=\; k^6\bigl(k^5 - k^3 + k - 1\bigr).
\end{aligned}$$

Polynôme de base B_0

$$\boxed{B_0(k) \;=\; \frac{\mathrm{S}_B(k,10) - \mathrm{S}_A(k,10)}{k^6} \;=\; k^5 - k^3 + k - 1}$$

Le Digamma étant $\mathrm{S}_A \pm k^8$ ou $\mathrm{S}_A \pm k^7$, on obtient, pour chacune des quatre branches, un candidat *polynomial* en k :

$$P_{A(8)-}(k) = B_0(k) + k^2, \qquad P_{A(8)+}(k) = B_0(k) - k^2,$$
$$P_{A(7)+}(k) = B_0(k) - k, \qquad P_{A(7)-}(k) = B_0(k) + k.$$

Pourquoi la polarité de la suite A commande le signe

Le signe du Digamma et le signe de la correction *retombent* sur la polarité de la position dans la suite A : la position 8 (terme k^8) donne une correction en k^2 *positive* quand elle est soustraite, la position 7 (terme k^7) donne une correction en k *positive* quand elle est *ajoutée*. Ce renversement n'est pas conventionnel : il découle mécaniquement de $\mathrm{S}_B - \mathrm{S}_A = k^6 B_0$, où le terme de rang 6 est celui qui a été *retiré* à la suite B par le saut Zêta.

9.3.2. Table de correspondance : branche, signe et terme

Branche	Position dans la suite A	Terme correctif	Candidat polynomial
$A(8)-$	$8^{\text{ième}}$	$-k^8$	$B_0 + k^2$
$A(8)+$	$8^{\text{ième}}$	$+k^8$	$B_0 - k^2$
$A(7)+$	$7^{\text{ième}}$	$+k^7$	$B_0 - k$
$A(7)-$	$7^{\text{ième}}$	$-k^7$	$B_0 + k$

Cette table est la *vraie* table de correspondance : elle a été revérifiée numériquement sur 676 191 ancres, après qu'une version antérieure (issue du script de criblage originel) eut inversé les lignes $A(7)+$ et $A(7)-$. L'inversion était invisible au regard mais destructrice : elle inversait le signe de la correction Digamma pour une branche sur quatre.

9.3.3. Les quatre ancres de référence : $P = 29,\ 31,\ 37,\ 41$

Pour le rapport typique $t = 1/2$ (soit $k = 2$), les suites à dix termes valent

$$\mathrm{S}_A(2, 10) = 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 384 + 768 = 1\,662,$$

$$\mathrm{S}_B(2, 10) = 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 128 + 256 + 512 + 768 + 1536 = 3\,262,$$

et la $6^{\text{ième}}$ position de la suite A (le « Zêta ») vaut $2^6 = 64$.

n	P	$\mathrm{S}_A(2,n)$	$\mathrm{S}_B(2,n)$	Digamma	S_A + Digamma	Branche
10	29	1 662	3 262	−256	1 406	$A(8)-$
11	31	3 326	6 590	+1 280	4 606	$A(8)+$
12	37	6 654	13 246	+4 224	10 878	$A(8)+$
13	41	13 310	26 558	+10 624	23 934	$A(8)+$

Vérification de la reconstruction sur les quatre ancres

$$\frac{\mathrm{S}_B - \text{Digamma}_{\text{calc.}}}{64} = \frac{3262 - 1406}{64} = 29, \qquad \frac{\mathrm{S}_B - \text{Digamma}_{\text{calc.}}}{64} = \frac{6590 - 4606}{64} = 31,$$
$$\frac{\mathrm{S}_B - \text{Digamma}_{\text{calc.}}}{64} = \frac{13246 - 10878}{64} = 37, \qquad \frac{\mathrm{S}_B - \text{Digamma}_{\text{calc.}}}{64} = \frac{26558 - 23934}{64} = 41.$$

Point d'exactitude relevé à la relecture

La valeur du Digamma pour $n = 13$ vaut 10 624 et donne S_A + Digamma = 23 934. La reconstruction $(26\,558 - 23\,934)/64 = 41$ est donc exacte. Une saisie antérieure portait 23 936 (soit 10 626), qui ne

redonne pas 41 mais 40,96875 : l'écart est de 2 sur le Digamma et faute de reproduction du nombre premier. La valeur 10 624 est la bonne.

9.3.4. La récurrence empirique observée

Les quatre valeurs du Digamma se lisent aussi comme des décompositions sur les trois derniers termes de la suite A de référence (256, 384, 768), avec des coefficients formant une progression de pas 4 (1, 5, 9, 13) :

$$\begin{aligned} 256 &= 1 \times 256, \\ 1\,280 &= 5 \times 256, \\ 4\,224 &= 9 \times 256 + 5 \times 384, \\ 10\,624 &= 13 \times 256 + 9 \times 384 + 5 \times 768. \end{aligned}$$

Cette décomposition canonique s'écrit

$$\mathrm{Digamma}(2,n) \;=\; \sum_{j=0}^{\max(0,\,n-11)} \big(4\,(n-10-j)+1\big)\,b_j, \qquad b_0 = 256,\; b_1 = 384,\; b_2 = 768,\; b_{j+1} = 2\,b_j.$$

Statut exact de cette récurrence

La formule ci-dessus est *exacte* pour $n = 10, 11, 12, 13$ — les quatre valeurs de la table de référence. **Elle devient fausse dès** $n = 14$: la règle canonique donne 23 936 là où la valeur exacte est 23 808 (écart +128), puis +896 en $n = 15$, +2 816 en $n = 16$, +6 784 en $n = 17$ et +14 592 en $n = 18$. Elle est donc *une description de la table, non* une loi générale. La fonction qui suit ne s'appuie pas sur elle.

9.4. La règle de criblage modulaire — formalisation de l'empirique

9.4.1. Le principe : éliminer par divisibilité, non par primalité

Les quatre candidats $P_{A(8)-}$, $P_{A(8)+}$, $P_{A(7)+}$, $P_{A(7)-}$ sont des *polynômes* en k. Il en résulte une propriété décisive : pour tout premier p,

$$c_j(k) \equiv 0 \pmod{p} \quad\Longleftrightarrow\quad c_j(k \bmod p) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Autrement dit, la divisibilité d'un candidat par p ne dépend que de la classe de k modulo p. L'élimination d'un candidat par un petit premier est donc une opération *modulaire*, entièrement calculable et *indépendante* de toute conjecture sur les nombres premiers.

Définition — élimination modulaire

Soit $\mathcal{P} = \{3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$ un ensemble de petits premiers. Le candidat $c_j(k)$ est dit **éliminé par criblage** s'il existe $p \in \mathcal{P}$ tel que $p \mid c_j(k)$; il est dit **survivant** si aucun $p \in \mathcal{P}$ ne le divise.

Puisque chaque c_j est un polynôme, l'ensemble des branches éliminées est une fonction de k modulo

$$M \;=\; \prod_{p \in \mathcal{P}} p \;=\; 111\,546\,435.$$

9.4.2. La règle de sélection

Théorème empirique — règle de branche

Étant donné k, on forme les quatre candidats

$$c_0 = B_0 + k^2, \qquad c_1 = B_0 - k^2, \qquad c_2 = B_0 - k, \qquad c_3 = B_0 + k.$$

On élimine tout candidat divisible par au moins un premier de $\mathcal{P} = \{3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$. **Si le criblage laisse un seul survivant, ce survivant est la branche correcte.**

Pourquoi l'élimination est sûre

La branche correcte étant, par construction, celle qui donne le nombre premier P, son candidat n'est divisible par aucun premier strictement inférieur à P — et en particulier par aucun des huit premiers de $\mathcal{P}$. *Le criblage ne peut donc jamais éliminer la vraie branche.* C'est la garantie d'*intégrité* de la règle, et elle est structurelle, non statistique.

Ce que la règle ne fait pas

La règle *ne remplace pas* un test de primalité. Elle indique *quelle* branche est compatible avec la primalité, pas que le candidat retenu est premier. Symétriquement, elle ne prouve pas que les trois candidats éliminés sont composés : ils le sont bien (ils ont un diviseur trouvé), mais *pour la mauvaise raison* — par un petit premier — ce qui est une information *plus faible* que la composante complète.

9.4.3. La fonction Digamma_Savard proprement dite

Définition — fonction Digamma_Savard/Cline

Pour $k \geq 2$ et n entier positif, on pose

$$\mathrm{Digamma}_{\mathrm{S/C}}(k) \;=\; \begin{cases} \mathrm{S}_A(k,n) - k^8, & \text{si le survivant unique est } A(8)-, \\ \mathrm{S}_A(k,n) + k^8, & \text{si le survivant unique est } A(8)+, \\ \mathrm{S}_A(k,n) + k^7, & \text{si le survivant unique est } A(7)+, \\ \mathrm{S}_A(k,n) - k^7, & \text{si le survivant unique est } A(7)-, \end{cases}$$

et l'on pose $\mathrm{Digamma}_{\mathrm{S/C}}(k) =$ indéterminé lorsque le criblage laisse deux survivants ou davantage.

Caractère de la fonction : une fonction *définie* à totaux, *partiellement* calculable

La fonction ci-dessus est *totale* en tant qu'application : pour tout k, la règle de criblage produit un verdict. Elle est cependant *partiellement calculable* au sens où, sur une fraction non négligeable des k, elle renvoie « indéterminé » : c'est le prix de l'exigence d'*exactitude* (on ne devine jamais) devant celle de *complétude* (on couvre tout).

9.5. Validations expérimentales

Toutes les validations reposent sur le même corpus : les 676 191 ancres uniques extraites d'une reconstruction portant sur 4 millions de rapports, et qui associent à chaque k la branche effective et la valeur correspondante.

9.5.1. Validation principale : exactitude et intégrité

Mesure	Résultat
Ancres analysées	676 191
Écarts au modèle polynomial B_0	0
Violations du criblage (0 attendues)	**0**
Ancres à survivant unique	71 401 (10,56 %)
Exactitude sur ces ancres	71 401/71 401 = **100,000000 %**
Module de criblage M	111 546 435

Résultat de la validation

Sur l'ensemble du corpus, la règle de branche ne présente **aucune violation** et atteint une **exactitude de 100 %** sur les 71 401 cas où elle se prononce. Le taux de couverture — soit la proportion de k pour lesquels la règle désigne une branche unique — est de 10,56 %.

9.5.2. Contrôle anti-circularité

Le risque d'une telle règle est d'être circulaire : si elle ne distinguait rien, une sélection *arbitraire* fonctionnerait aussi. Le test consiste donc à *permuter* les quatre signes et à mesurer la pureté obtenue.

Essai	Permutation des signes	Pureté
Référence (règle true)	$[0, 1, 2, 3]$	**100,000000 %**
Essai 0	$[3, 1, 0, 2]$	8,627330 %
Essai 1	$[1, 2, 3, 0]$	0,000000 %
Essai 2	$[1, 0, 3, 2]$	0,000000 %

Lecture du contrôle

Sous permutation aléatoire, la pureté s'effondre à 0–8,6 %, très en deçà du taux de base de 28,84 % correspondant à la branche majoritaire. La règle ne peut donc pas être « bonne » par hasard : l'information qu'elle exploite est *spécifique* à l'association entre la polarité de la position dans la suite A et le signe de la correction Digamma. C'est le test le plus important de la section.

Un second contrôle porte sur le *hors-échantillon* : appliqué à 20 000 valeurs de k arbitraires, hors du corpus d'ancres, la règle désigne un survivant unique pour 4 088 d'entre elles, et le candidat désigné est impair dans les 4 088 cas (rapport typique 1/2 : le Digamma et k^6 sont pairs, donc P doit l'être aussi après soustraction — la parité est un test de cohérence immédiat).

9.5.3. Convergence du criblage

# premiers	Couverture	Exactitude	Intégrité	Ambigüité	Temps
9	10,56 %	100,0000 %	100,00 %	89,44 %	2 s
25	22,69 %	100,0000 %	100,00 %	77,31 %	4 s
168	42,39 %	100,0000 %	100,00 %	57,61 %	19 s
430	49,65 %	100,0000 %	100,00 %	50,35 %	41 s

Ce que montre la convergence

À mesure que l'on ajoute des petits premiers au crible, la *couverture* croît de façon monotone (10,56 % à 49,65 %), tandis que l'*exactitude* et l'*intégrité* restent parfaitement constantes à 100 %. C'est le comportement attendu et souhaitable : le criblage élimine de plus en plus de branches, mais ne sacrifie jamais la rigueur. La couverture pourrait tendre vers 100 % en augmentant le nombre de premiers *au prix* d'un coût de calcul qui croît brutalement : c'est le compromis central de la règle.

9.6. Cas de référence : $P = 29,\ 31,\ 37,\ 41$

Le tableau qui suit applique la procédure complète — criblage, choix de branche, calcul du Digamma, reconstruction — aux quatre nombres premiers d'ancrage, pour le rapport typique 1/2.

k	Digamma	Branche retenue	P reconstruit	P attendu	Verdict
2	−256	$A(8)-$	29	29	conforme
2	+1 280	$A(8)+$	31	31	conforme
2	+4 224	$A(8)+$	37	37	conforme
2	+10 624	$A(8)+$	41	41	conforme

Mise en garde sur la lecture de ce tableau

Ces quatre lignes *valident la procédure*, elles ne la *démontrent pas* : les quatre cas appartiennent à la table d'observation qui a servi à formuler la règle. Leur valeur est méthodologique — ils prouvent que la formalisation reproduit exactement le comportement empirique qu'elle remplace — et non probatoire au sens d'un test sur données inédites. La preuve opératoire est le test anti-circularité et l'exactitude à 100 % sur 71 401 ancres *hors table d'observation*.

9.7. Limites et statut épistémologique

Limite 1 — la couverture n'est pas totale

La règle se prononce sur 10,56 % des k du corpus. Sur les 89,44 % restants, le criblage laisse au moins deux survivants : la fonction renvoie alors « indéterminé ». Le résidu est *intrinsèque* et non un défaut d'implémentation : sur un k donné, le nombre de branches survivantes ne dépend que de k mod M, et aucune extension finie du crible ne peut faire disparaître toutes les classes ambguës sans coût prohibitif.

Limite 2 — la règle n'est pas un test de primalité

Elle indique *quelle* branche est compatible, non que le candidat retenu est premier. Pour lever l'ambiguïté résiduelle, un test de primalité reste nécessaire — c'est-à-dire un aller-retour vers la primalité, que la formalisation n'a pas supprimé mais simplement *repoussé* à un second étage, plus étroit et mieux circonscrit.

Limite 3 — la partie algébrique conserve un statut empirique

La réduction $\mathrm{S}_B - \mathrm{S}_A = k^6 B_0$ et la formule fermée de niveau 2 sont établies et vérifiées. En revanche la *table de correspondance* entre polarité de la position et signe de la correction, ainsi que l'ensemble des quatre candidats, sont le fruit d'une exploration numérique : ils sont *corrects* au sens où ils reproduisent 676 191 ancres sans un seul écart, mais ils ne sont pas *démontrés* au sens d'un théorème. La section franchit la frontière entre « observé » et « calculé » ; elle ne franchit pas celle entre « calculé » et « prouvé ».

Limite 4 — la récurrence de la table ne se généralise pas

Comme établi plus haut, la formule canonique de décomposition du Digamma est exacte pour $n = 10, 11, 12, 13$ et fausse dès $n = 14$. Elle est conservée dans le présent document comme *description de la table d'observation*, à titre d'outil de calcul et de contrôle, et non comme une loi.

Position dans l'architecture générale

La fonction DIGAMMA_SAVARD/CLINE intervient exactement là où la méthode spectrale attendait une information manquante : au niveau 4 (mécanisme d'ancrage), où les quatre essais Digamma étaient jusqu'alors lancés *simultanément* et sans critère de choix. Elle ne modifie ni les niveaux 1 à 3 (constantes, formules fermées, construction terme à terme) ni le niveau 5 (reconstruction pour $n \neq 10$), et ne modifie

pas non plus la formule de reconstruction

$$P = \frac{\mathrm{S}_B - \mathrm{Digamma}}{k^6},$$

dont elle ne fournit que le *contenu* de la correction.

9.8. Implémentation de référence

Pseudo-code de la fonction

```
DIGAMMA_SAVARD(k, n) :
    S_A <- somme_suite_A(k, n)      # arithmétique entière
    S_B <- somme_suite_B(k, n)
    B0  <- k**5 - k**3 + k - 1
    C   <- [B0+k^2, B0-k^2, B0-k, B0+k]  # A(8)-, A(8)+, A(7)+, A(7)-

    survivants <- []
    pour j de 0 a 3 :
        si tous(C[j] mod p != 0 pour p dans [3,5,7,11,13,17,19,23]) :
            ajouter j a survivants

    si longueur(survivants) == 1 :
        j <- survivants[0]
        signe   <- -1 si j dans {0,3} sinon +1
        exposant <- 8 si j dans {0,1} sinon 7
        Digamma <- S_A + signe * k**exposant
        retourner (Digamma, (S_B - Digamma) / k**6)
    sinon :
        retourner (INDETERMINE, branches survivantes)
```

Précautions d'implémentation

- **Arithmétique entière obligatoire.** Pour $k \geq 50$, les valeurs de S_A et S_B dépassent 10^{15} : l'arithmétique flottante introduit des erreurs d'arrondi qui se propagent au test de divisibilité et faussent le verdict de criblage.
- **Le test de divisibilité précède toute hypothèse de primalité.** La fonction ne doit jamais court-circuiter sur un « candidat préféré » : c'est précisément ce court-circuit qui réintroduirait la circularité.
- **Le cas indéterminé doit être rendu visible.** En cas d'ambiguïté, l'agent doit signaler C_NON_CERTIFIÉ et attendre une validation externe, conformément au contrat HOL, plutôt que de trancher silencieusement.

9.9. Conclusion

La correction Digamma, longtemps traitée comme une valeur observée, devient ici le résultat d'une *fonction calculable* : la *fonction* DIGAMMA_SAVARD/CLINE. Sa structure est la suivante.

1. **Une réduction algébrique.** Les quatre candidats possibles se ramènent à quatre polynômes $B_0 \pm k^2$ et $B_0 \pm k$, où $B_0(k) = k^5 - k^3 + k - 1$.
2. **Une règle de sélection par criblage modulaire.** La polarité de la position dans la suite A commande le signe de la correction ; ce signe est *déduit* par élimination modulaire, jamais *choisi*.
3. **Une validation rigoureuse.** Zéro violation d'intégrité sur 676 191 ancres ; exactitude de 100 % sur les 71 401 ancres à survivant unique ; effondrement de la pureté à 0–8,6 % sous permutation des signes ; stabilité de l'exactitude à 100 % lorsque la couverture passe de 10,56 % à 49,65 %.
4. **Un statut honnête.** La règle est exacte là où elle se prononce et le dit quand elle ne peut pas se prononcer ; elle ne prétend ni tester la primalité, ni démontrer la table de correspondance.

Énoncé final

Pour tout $k \geq 2$, la fonction Digamma_Savard/Cline retourne une correction calculée, non observée, dont le signe est déterminé par la seule arithmétique modulaire ; et elle retourne « indéterminé » plutôt que de trancher au hasard. *La fonction ne prétend pas résoudre la primalité : elle déplace le problème du* choix *vers la* contamination.

A. Annexe — Tables du classeur Excel

Classeur source : `systeme_convolutif_spectral_general.xlsx`.

A.1. Table de convolution formelle (feuille *Convolution*, extrait)

Chaque terme vaut $c_1 \cdot k^{e_1} + c_2 \cdot k^{e_2}$: cette représentation encode les additions et soustractions sans figer k.

Rapport	Suite	Ordre	Coeff 1	Exp 1	Coeff 2	Exp 2	Valeur	Expression formelle
1/3	A	1	1	1	0	0	3	k^1
1/3	A	8	1	8	0	0	6 561	k^8
1/3	A	9	1	9	−1	7	17 496	$k^9 - k^7$
1/3	A	10	1	10	−1	8	52 488	$k^{10} - k^8$
1/3	B	9	1	9	0	0	19 683	k^9
1/3	B	10	1	10	−1	8	52 488	$k^{10} - k^8$
1/3	B	11	1	11	−1	9	157 464	$k^{11} - k^9$
1/8	A	9	1	9	−1	7	132 120 576	$k^9 - k^7$
1/8	A	10	1	10	−1	8	1 056 964 608	$k^{10} - k^8$

A.2. Système généralisé (feuille *Systeme General*)

Formules fermées exactes, valables pour tout k entier ≥ 3 et tout n entier (positif ou négatif), validées contre les exemples numériques $k = 3..7$: $\mathrm{S}_A(k,n) = (\alpha_A(k)/2)\,k^n - \delta_A(k)$ et $\mathrm{S}_B(k,n) = (\alpha_B(k)/2)\,k^n - \delta_B(k)$. À $n = 10$: Digamma $= \mathrm{S}_A \pm A(7 \text{ ou } 8)$; les quatre possibilités servent uniquement à déterminer l'ancrage premier du rapport. À $n \neq 10$: rang cible = rang premier à $n = 10 + n - 10$; P cible lu dans `tblPremiers` ; Digamma calculé $= \mathrm{S}_B(k,n) - P_{\text{cible}} \times k^6$. Reconstruction : $P = [\mathrm{S}_B(k,n) - \text{Digamma calculé}]/k^6$; un rapport sans ancrage unique à $n = 10$ demeure bloqué.

Rapport	k	n	Somme A	Somme B	Pos. Dig.	Signe	Digamma	Premier	Rang	Statut
1/3	3	10	79 824	238 746	8	−1	73 263	227	49	Résolu
1/4	4	10	1 316 180	5 260 628	8	+1	1 381 716	947	161	Résolu
1/5	5	10	11 738 280	58 675 780	7	+1	11 816 405	2 999	430	Résolu
1/6	6	10	70 599 858	423 552 498	8	+1	72 279 474	7 529	954	Résolu
1/7	7	10	322 966 112	2 260 645 142	8	−1	317 201 311	16 519	1 913	Résolu
1/8	8	10	1 208 259 144	9 665 811 016	8	−1	1 191 481 928	32 327	3 468	Résolu
1/9	9	10	3 874 802 760	34 872 693 408	7	−1	3 870 019 791	58 337	5 906	Résolu
1/10	10	10	11 001 111 110	110 010 111 110			—			Ambigu (3 candidats)
1/11	11	10	28 297 321 008	311 268 759 538			—			Ambigu (aucun candidat)
1/12	12	10	67 080 402 012	804 961 838 172			—			Ambigu (2 candidats)

Cas corrigé exact — rapport 1/8, $n = 34$: 32 327 est le $3\,468^{\text{ème}}$ premier à $n = 10$; le décalage de 24 rangs donne le $3\,492^{\text{ème}}$ premier, soit 32 537. $\mathrm{S}_A(8,34) = 5\,705\,842\,489\,643\,358\,455\,620\,763\,423\,304$; $\mathrm{S}_B(8,34) = 45\,646\,739\,917\,146\,867\,644\,966\,107\,124\,296$; Zêta $k^6 = 262\,144$; Digamma exact $= 45\,646\,739\,917\,146\,867\,644\,957\,577\,744\,968$ — *reconstruit exactement.*

A.3. Paramètres des règles et constantes des sommes fermées (feuille *Parametres*)

Rapport	k	n	Exp. reconstruction	Position Digamma	Signe Digamma	Statut
1/3	3	10	6	8	−1	Ancrage $n = 10$ validé ; séquence par rang active
1/4	4	10	6	8	+1	Ancrage $n = 10$ validé ; séquence par rang active
1/5	5	10	6	7	+1	Ancrage $n = 10$ validé ; séquence par rang active
1/6	6	10	6	8	+1	Ancrage $n = 10$ validé ; séquence par rang active
1/7	7	10	6	8	−1	Ancrage $n = 10$ validé ; séquence par rang active
1/8	8	10	6	8	−1	Ancrage $n = 10$ validé ; séquence par rang active
1/9	9	10	6	7	−1	Ancrage $n = 10$ validé ; séquence par rang active
1/10	10	10	6	—		Essai-erreur requis
1/11	11	10	6	—		Essai-erreur requis
1/12	12	10	6	—		Essai-erreur requis

Obligation universelle : chaque premier cible doit être produit une fois par le catalogue complet. Règles actives — $n = 10$: A et B construites, quatre Digamma $\pm A(7)$, $\pm A(8)$, sélection du seul entier premier, dénominateur k^6, création de l'ancrage ; $n \neq 10$: A et B construites, rang cible = rang base $+ n - 10$, premier lu dans `tblPremiers`, Digamma $= \Sigma B - P \times k^6$, ancrage $n = 10$ obligatoire.

A.4. Moteur géo convolutif (feuille *Moteur Géo Convolutif*, $k = 11$)

Implémentation des annexes PDF 16.1–16.19 : chaque terme géométrique est le terme entier correspondant multiplié par $g(k) = \sqrt{1 + k^2}/k$ ($g(11) = 1.0041237288352056$). Identité centrale : $\mathrm{S}_A^{\text{géo}} = g(k) \cdot \mathrm{S}_A^{\text{entier}}$; $\mathrm{S}_B^{\text{géo}} = g(k) \cdot \mathrm{S}_B^{\text{entier}}$; $\text{Digamma}_{\text{géo}} = g(k) \cdot \text{Digamma}_{\text{entier}}$; $\text{Zêta}_{\text{géo}} = g(k) \cdot k^6$ — le facteur s'annule dans P. Somme entière A = 28 297 321 008, B = 311 268 759 538 ; sommes géométriques : contrôle facteur 0. Pour $k = 11$, les six branches $A(n-3)\pm$, $A(n-2)\pm$, diagnostics $B(n-2)\pm$ donnent des candidats entiers non premiers : verdict pipeline « AUCUN P — COMPOSÉS EXCLUS » (6 composés exclus HOL) ; la règle standard ne sélectionne que les quatre branches A. Référence PDF : premier imprimé 1 611 851 (règle A7−, forme spéciale) ; correction séquentielle : ancrage rang 121 982 à $n = 10$, cible rang 121 987 à $n = 15 \Rightarrow$ premier 1 611 901.

A.5. Tests Digamma (feuille *Tests Digamma*)

Le candidat est A ajustée = Somme A + signe $\cdot k^{\text{position}}$; puis P = (Somme B − A ajustée)$/k^{\text{exp reconstruction}}$. Pour 1/3 ($n = 10$) : seule la combinaison position 8 / signe − produit 227, premier de rang 49 ; les trois autres candidats sont composés (221, 215, 209). Essai convolutif 1/3, $n = 18$: $\mathrm{S}_A(18) = 523\,735\,104$, $\mathrm{S}_B(18) = 1\,571\,204\,586$; les quatre options donnent des quotients entiers, et les options position 8 produisent deux premiers consécutifs (1 436 849 et 1 436 867) : la règle Digamma ne sélectionne pas encore une solution unique pour $n = 18$ — un critère supplémentaire est requis, d'où la voie officielle du Niveau 5 (décalage de rang, Digamma calculé à rebours).

A.6. Suites géométriques A–B (feuille *Suites Géo A-B*, modèle hypoténuse)

Pour $t = 1/k$: typique $k = 2$ ($t = 1/2$, $\mathrm{S}_A = 2.2469862782$, $\mathrm{S}_B = 2.2016753304$, $\mathrm{S}_A + \mathrm{S}_B = 4.4486616086$) ; non typiques $k = 3..12$ (ex. $k = 7$: $\mathrm{S}_A = 1.1785207100$, $\mathrm{S}_B = 1.1784513659$). Logique de repli automatique : Étape 1 approche algébrique (k^n + 4 Digamma) ; si 0 premier, Étape 2 approche géométrique (suites $\sqrt{a^2 + b^2}$, extraction floor/ceil/round de S_A, S_B, $n\mathrm{S}_A$, $n\mathrm{S}_B$, test de primalité). Invariants : Digamma inchangé ; les équations pour $\forall n$ restent identiques.

A.7. Bilan des ancrages pour $n = 10$ et extraits des grands rapports

Les trois catalogues dynamiques couvrant successivement $k = 2$–1001, 1002– 10001, puis 10002–100001 rapportent les nombres de resultats suivants. Les nombres de la colonne "ancrages" sont les lignes marquees `PREMIER TROUVE` par le pipeline dans les fichiers de resultats cites.

Plage de k	Rapports traites	Ancrages trouves	Proportion
2–1001	1 000	423	42,30%
1002–10001	9 000	2 604	28,93%
10002–100001	90 000	19 215	21,35%
Total (2–100001)	100 000	**22 242**	22,242%

Les totaux reproduisent les bilans des fichiers `liste_k2_k1001_n10.txt`, `liste_k1002_k10001_n10.txt` et `liste_k10002_k100001_n10.txt`. Ils decrivent les resultats consignes par le pipeline ; ils ne remplacent pas un certificat independant pour chaque ancrage.

Comparaison d'ordres de grandeur. Les ancrages des rapports proches de 1/100000 atteignent environ 10^{25} dans le catalogue ci-dessous. Le document evoque des calculs de zeros non triviaux de hauteur de l'ordre de 10^{12}. Le quotient de ces ordres de grandeur est $10^{25}/10^{12} = 10^{13}$, soit 10 000 milliards. Cette comparaison porte uniquement sur les tailles numeriques : une hauteur de zero et la valeur d'un nombre premier sont des quantites de nature differente. Faute de reference bibliographique precisant une borne et un record verifiables, 10^{12} est presente ici comme un ordre de grandeur, non comme un record mondial etabli.

Extrait dynamique : $k = 9978$–10001

Rapport	Ancre $P(n = 10)$	Etat DYN	Resultat du rapport
1/9978	98 904 828 370 293 156 971	**TROUVE**	Essais DYN : premier retourne
1/9979	98 954 399 755 106 335 579	**TROUVE**	Essais DYN : premier retourne
1/9980	99 003 991 013 984 807 999	**TROUVE**	Essais DYN : premier retourne
1/9981	—	**ECHEC**	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9982	—	**ECHEC**	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9983	—	**ECHEC**	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9984	—	**ECHEC**	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9985	—	**ECHEC**	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9986	—	**ECHEC**	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9987	99 351 686 808 222 880 721	**TROUVE**	Essais DYN : premier retourne
1/9988	—	**ECHEC**	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9989	—	**ECHEC**	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9990	—	**ECHEC**	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9991	—	**ECHEC**	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9992	—	**ECHEC**	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9993	99 650 488 659 218 583 521	**TROUVE**	Essais DYN : premier retourne

Rapport	Ancre $P(n=10)$	Etat DYN	Resultat du rapport
1/9994	99 700 358 785 863 712 439	**TROUVE**	Essais DYN : premier retourne
1/9995	—	**ECHEC**	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9996	99 800 158 937 112 409 019	**TROUVE**	Essais DYN : premier retourne
1/9997	99 850 088 973 903 799 777	**TROUVE**	Essais DYN : premier retourne
1/9998	—	**ECHEC**	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9999	99 950 008 999 300 019 999	**TROUVE**	Essais DYN : premier retourne
1/10000	—	**ECHEC**	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/10001	—	**ECHEC**	Aucun ancrage (4 essais Digamma)

Extrait du catalogue detaille : $k = 99975$–100001

Rapport	Ancre $P(n=10)$	Etat	Branche / remarque
1/99975	9 987 506 247 438 445 115 449 949	**UNIQUE**	Branche A(7)-
1/99976	9 988 005 757 618 485 707 451 151	**UNIQUE**	Branche A(7)-
1/99977	—	**ABSENT**	–
1/99978	—	**ABSENT**	–
1/99979	—	**AMBIGU**	A(8)+ : 9 989 504 408 074 617 108 424 697 ; A(7)- : 9 989 504 408 074 627 104 325 117
1/99980	—	**ABSENT**	–
1/99981	—	**ABSENT**	–
1/99982	—	**ABSENT**	–
1/99983	—	**ABSENT**	–
1/99984	—	**ABSENT**	–
1/99985	—	**ABSENT**	–
1/99986	—	**ABSENT**	–
1/99987	9 993 501 688 780 714 226 931 059	**UNIQUE**	Branche A(8)-
1/99988	—	**ABSENT**	–
1/99989	—	**ABSENT**	–
1/99990	9 995 000 998 900 304 969 900 999	**UNIQUE**	Branche A(7)+
1/99991	—	**ABSENT**	–
1/99992	—	**ABSENT**	–
1/99993	—	**ABSENT**	–
1/99994	—	**ABSENT**	–
1/99995	—	**ABSENT**	–
1/99996	9 998 000 158 993 720 123 199 039	**UNIQUE**	Branche A(7)+
1/99997	—	**ABSENT**	–
1/99998	—	**ABSENT**	–
1/99999	—	**ABSENT**	–
1/100000	—	**ABSENT**	–
1/100001	—	**ABSENT**	–

Pour $k = 99979$, le catalogue detaille signale deux candidats de branches differentes ; le statut reste **AMBIGU** et aucun choix unique n'est presente ici. Les Etats **ABSENT** et **AMBIGU** ne

sont donc pas comptes comme ancrages uniques dans le bilan precedent.