



Le système convolutif

Rapports typique et non typiques : $1/k = 1/2$ et $1/k \neq 1/2$

Système équationnel convolutif pour les requêtes multi-rapports du pipeline cognitif



Auteur : Philippe Thomas Savard

Collaborateurs : Copilot Microsoft — Gordon Docker Desktop — E1 emergent.sh
API Anthropic — API OpenAI — Cline — Gemini Google

Adresse : 4-5354 Rue du Menuet, Lévis, Chaudière-Appalaches, Canada, G6X 2Y6

Courriel : philippethomassavard@gmail.com

Lieu et date : Lévis, Chaudière-Appalaches, Canada — le vingt-six septembre deux mille vingt-six

Avertissement et licence

Les informations contenues dans le document que vous consultez sont sous LICENCE APACHE 2.0. Le document est présent sous la même licence sur GitHub dans le dépôt public : <https://github.com/2racinede4carreunivers-dev/agent-multiloop-Gabriel-local.git>. Il est possible, selon certaines restrictions en lien avec la LICENCE APACHE 2.0 et la réglementation du dépôt, de contribuer via PR, de cloner, partager et modifier les informations présentes dans ce document. Le document est fourni tel quel, sans garantie ni assurance quant à sa validité, et son utilisation est permise dans la mesure de cet avertissement en ce qui concerne sa validité. Le document a été créé sans financement de toute nature, ni avantage, ni intérêt.

Le présent document est une section de la théorie unifiée « L'Univers est au carré », et fait partie du chapitre de cette théorie unifiée : « La géométrie du spectre des nombres premiers ». Cette géométrie, incluse dans la théorie mentionnée, est un outil dynamique conçu entièrement par son auteur Philippe Thomas Savard en collaboration avec les entités mentionnées. Cet outil dynamique est conçu pour résoudre la question de l'énigme de Bernhard Riemann et la conjecture de la fonction Zêta de Riemann.

Le dépôt mathlib : <https://github.com/leanprover-community/mathlib4.git> est utilisé pour certaines informations selon les termes de la licence du dépôt en question. Les informations utilisées, pouvant avoir été modifiées, sont incluses dans le fichier `.thy` de contre-validation du dépôt : `agent-multiloop-Gabriel-local/theories/validation_zeta_lean.thy`; la licence du dépôt mathlib est incluse dans le fichier `.thy`. Cette contre-validation, et la contre-validation jumelle dans le même sens `validation_hol_unifiee.thy`, concernent toutes deux la validation principale `methode_spectral.thy`, présentes aux adresses du dépôt : `agent-multiloop-Gabriel-local/theories/validation_hol_unifiee.thy` et `agent-multiloop-Gabriel-local/theories/methode_spectral.thy`, disponibles en sept langues différentes sur le dépôt; quelques annotations sont en langue phonétique.

Table des matières

Avertissement et licence	1
1 Rapports typique et non typiques : $1/k = 1/2$ et $1/k \neq 1/2$	4
1.1 Exemple de suites géométriques A et B	4
1.2 Reconstruction du nombre premier pour $n = 10$	4
1.2.1 Quatre possibilités pour le Digamma	4
1.3 Généralisation des équations des suites A et B	4
1.4 Approche généralisée de niveau 1	5
1.4.1 Détermination du nombre premier	5
1.4.2 Équations des sommes des suites A et B	6
2 Définition et propriétés des rapports non typiques	6
2.1 Exemple pour $n = 10$ des suites A et B pour un rapport non typique $1/k = 1/3$. .	6
2.1.1 Rapport non typique $1/k = 1/3$ — équations généralisées	7
2.2 Rapport non typique $1/k = 1/4$ ($n = 10$; $p = 947$, 161 ^{ème} nombre premier)	9
2.3 Rapport non typique $1/k = 1/5$	9
2.4 Rapport non typique $1/k = 1/6$	11
2.5 Rapport non typique $1/k = 1/7$	12
3 Système d'équations convolutif généralisé — pour tout rapport $1/k$ ($k \geq 2$) et tout n commun	13
3.1 Niveau 1 — Constantes Savard universelles	13

3.2	Niveau 2 — Formules fermées (n quelconque, n commun à tous les rapports) . . .	13
3.3	Niveau 3 — Construction terme à terme (Suite A, $n \geq 8$)	13
3.4	Niveau 4 — Mécanisme d'ancrage à $n = 10$ (4 candidats Digamma)	13
3.5	Niveau 5 — Reconstruction pour $n \neq 10$ (n commun)	14
3.6	Vérification $k = 3$ à 9 (tous corrects, 100 %)	14
3.7	Tableau complet $P(1/k)$, $n = 10$ — $k = 10$ à $k = 111$	14
3.8	Synthèse statistique ($k = 10$ à 111)	16
3.9	Notes importantes pour la programmation de l'agent	16
3.10	Exécutions multi-rapports archivées ($n = 10$)	17
4	Exemple numérique complet — $n = 15$	17
4.1	Rapport 1/13 ($k = 13$, $n = 15$)	17
4.1.1	Niveau 1 — Constantes Savard universelles	17
4.1.2	Niveau 2 — Formules fermées	17
4.1.3	Niveau 3 — Construction terme à terme ($n = 15$)	18
4.1.4	Niveau 4 — 4 essais Digamma ($k^6 = 4\,826\,809$)	18
4.1.5	Niveau 5 — Reconstruction rang cible (méthode officielle pour $n \neq 10$) . . .	18
4.2	Rapport 1/42 ($k = 42$, $n = 15$)	18
4.2.1	Niveau 1 — Constantes Savard universelles	19
4.2.2	Niveau 2 — Formules fermées	19
4.2.3	Niveau 3 — Construction terme à terme ($n = 15$)	19
4.2.4	Niveau 4 — 4 essais Digamma ($k^6 = 5\,489\,031\,744$)	19
4.2.5	Niveau 5 — Reconstruction rang_cible	19
4.3	Rapport 1/54 ($k = 54$, $n = 15$)	20
4.3.1	Niveau 1 — Constantes Savard universelles	20
4.3.2	Niveau 2 — Formules fermées	20
4.3.3	Niveau 3 — Construction terme à terme ($n = 15$)	20
4.3.4	Niveau 4 — 4 essais Digamma ($k^6 = 24\,794\,911\,296$)	20
4.3.5	Niveau 5 — Reconstruction rang_cible	21
4.4	Tableau récapitulatif final — $P(1/k)$, $n = 15$)	21
4.5	Notes critiques pour l'agent	21
4.5.1	1. Saut Zêta — asymétrie A / B confirmée	21
4.5.2	2. Niveau 4 hors-calibrage pour $n \neq 10$	21
4.5.3	3. Niveau 5 — formule rang_cible	21
4.5.4	4. Invariant spectral (Théorème XIV.3) — vérifié pour les 3 rapports	22
4.5.5	5. Arithmétique — seuils de dépassement float	22
5	Schéma neuronal et arborescence algorithmique du système convolutif	22
5.1	Schéma neuronal de la table convolutive	22
5.2	Arborescence algorithmique — niveaux 1 et 2	22
5.3	Équations de reconstruction des suites A et B — les deux niveaux	22
6	Fiche technique — Pipeline cognitif de l'agent Mm. Gabriel multiloop	24
6.1	Vocation et portée	24
6.2	Architecture cognitive — les 7 moteurs collaboratifs	25
6.3	Pipeline convolutif spectral (niveaux 1 et 2)	25
6.4	Pipeline HOL du dépôt et corpus HOL	26
6.5	Robustesse, audit et utilités pour la géométrie du spectre	26

7	Fusion des rapports typiques et non typiques dans la fonction zêta spectrale de Savard	45
7.1	Droite critique spectrale : le rapport typique $1/2$	45
7.2	Rapports non typiques : positions et polarité spectrales	46
7.3	Définition proposée de la fonction zêta spectrale de Savard	46
7.4	Reconstruction des premiers et exclusion des composés	46
7.5	Comptages observés et loi de croissance proposée	46
7.6	Interprétation zêta : analogie des exposants	47
7.7	Hypothèse de Savard : formulation spectrale	47
A	Annexe — Tables du classeur Excel	48
A.1	Table de convolution formelle (feuille <i>Convolution</i> , extrait)	48
A.2	Système généralisé (feuille <i>Systeme General</i>)	48
A.3	Paramètres des règles et constantes des sommes fermées (feuille <i>Parametres</i>)	49
A.4	Moteur géo convolutif (feuille <i>Moteur Géo Convolutif</i> , $k = 11$)	49
A.5	Tests Digamma (feuille <i>Tests Digamma</i>)	49
A.6	Suites géométriques A–B (feuille <i>Suites Géo A-B</i> , modèle hypoténuse)	49
A.7	Bilan des ancrages pour $n = 10$ et extraits des grands rapports	50

1. Rapports typique et non typiques : $1/k = 1/2$ et $1/k \neq 1/2$

1.1. Exemple de suites géométriques A et B

Pour le rapport typique $t = 1/k = 1/2$, les suites A et B sont construites selon le modèle de l'hypoténuse $\sqrt{a^2 + b^2}$, dix termes par suite (convention de notation : $(t^m)^2$ signifie le carré de t^m ; ainsi $(t^3)^2 = t^6$) :

Somme suite A — modèle hypoténuse

$$S_A = ((1^1)^2 + (t^1)^2)^{1/2} + ((t^1)^2 + (t^2)^2)^{1/2} + ((t^2)^2 + (t^3)^2)^{1/2} + ((t^3)^2 + (t^4)^2)^{1/2} \\ + ((t^4)^2 + (t^5)^2)^{1/2} + ((t^5)^2 + (t^6)^2)^{1/2} + ((t^6)^2 + (t^7)^2)^{1/2} + ((t^7)^2 + (t^8)^2)^{1/2} \\ + ((t^8)^2 + (t^9)^2)^{1/2} + ((t^9)^2 + (t^{10})^2)^{1/2}.$$

Somme suite B — modèle hypoténuse (saut structurel en position 6)

$$S_B = ((1^1)^2 + (t^1)^2)^{1/2} + ((t^1)^2 + (t^2)^2)^{1/2} + ((t^2)^2 + (t^3)^2)^{1/2} \\ + ((t^3)^2 + (t^4)^2)^{1/2} + ((t^4)^2 + (t^5)^2)^{1/2} \\ + ((t^6)^2 + (t^7)^2)^{1/2} + ((t^7)^2 + (t^8)^2)^{1/2} + ((t^8)^2 + (t^9)^2)^{1/2} \\ + ((t^{10})^2 + (t^{11})^2)^{1/2} \\ + ((t^{11})^2 + (t^{12})^2)^{1/2}.$$

Décalage structurel A $\rightarrow$ B

La suite B ne comporte pas de terme $((t^5)^2 + (t^6)^2)^{1/2}$: c'est le *saut Zêta*, décalage structurel de A vers B. Les deux suites sont identiques pour les positions $i \leq 5$, puis divergent à partir de $i = 6$.

1.2. Reconstruction du nombre premier pour $n = 10$

1.2.1. Quatre possibilités pour le Digamma

1. Additionner la 8^{ième} position de la suite A à la somme de la suite A 10 termes ($n = 10$).
 2. Soustraire la 8^{ième} position de la suite A à la somme suite A 10 termes ($n = 10$).
 3. Additionner la 7^{ième} position de la suite A à la somme de la suite A 10 termes ($n = 10$).
 4. Soustraire la 7^{ième} position de la suite A à la somme de la suite A 10 termes ($n = 10$).
- Les quatre possibilités permettent de déterminer la valeur du Digamma calculé.

1.3. Généralisation des équations des suites A et B

1. Coefficient A :

$$\frac{\text{Somme suite A}(10 \text{ termes}) - \text{Somme suite A}(9 \text{ termes})}{t^8} = \text{Coefficient A.}$$

Coefficient B :

$$\frac{\text{Somme suite B}(10 \text{ termes}) - \text{Somme suite B}(9 \text{ termes})}{t^8} = \text{Coefficient B.}$$

2. Reconstruire les suites A et B en déterminant la somme des suites A et B pour toutes les valeurs n :

$$\frac{\text{Coefficient A}}{x} \times k^n - \text{Reste} = \text{Somme suite A}, \quad \frac{\text{Coefficient A}}{\text{Somme suite A}} k^{10} = \text{Reste} + x.$$

$$(\text{Reste} + x) - \text{la valeur entière} = x.$$

La valeur de $(\text{Reste} + x)$ forme deux blocs A et B : A étant la partie entière de la valeur $(\text{Reste} + x)$, et B formant la partie < 1 qui est décimale de $(\text{Reste} + x)$.

$$\frac{\text{Coefficient A}}{x} \times k^{10} - \text{Reste} = \text{Somme suite A} + \text{Reste},$$

$$\text{Somme suite A} - (\text{Somme suite} + \text{Reste}) = \text{Reste}.$$

Équation reconstruite A généralisant la valeur de n

$$\frac{\text{Coefficient A}}{x} \times k^n - \text{Reste} = \text{Somme suite A}, \quad \text{quand } n \text{ est un entier strictement positif.}$$

De même pour la suite B :

$$\frac{\text{Coefficient B}}{x} \times k^n - \text{Reste} = \text{Somme suite B}, \quad \frac{\text{Coefficient B}}{\text{Somme suite B}} k^{10} = \text{Reste} + x,$$

$$\frac{\text{Coefficient B}}{x} \times k^{10} - \text{Reste} = \text{Somme suite B} + \text{Reste},$$

$$\text{Somme suite B} - (\text{Somme suite} + \text{Reste}) = \text{Reste}.$$

Équation reconstruite B généralisant la valeur de n

$$\frac{\text{Coefficient B}}{x} \times k^n - \text{Reste} = \text{Somme suite B}, \quad \text{quand } n \text{ est un entier strictement positif.}$$

1.4. Approche généralisée de niveau 1

Sommes des suites A et B (forme formelle, $n = 10$)

$$t^1 + t^2 + t^3 + t^4 + t^5 + t^6 + t^7 + t^8 + (t^9 - t^7) + (t^{10} - t^8) = \text{Somme suite A},$$

$$t^1 + t^2 + t^3 + t^4 + t^5 + t^7 + t^8 + t^9 + (t^{10} - t^8) + (t^{11} - t^9) = \text{Somme suite B}.$$

Digamma, 4 possibilités :

1. $- 8^{\text{ième}}$ position suite A : $-t^8$
2. $+ 8^{\text{ième}}$ position suite A : $+t^8$
3. $- 7^{\text{ième}}$ position suite A : $-t^7$
4. $+ 7^{\text{ième}}$ position suite A : $+t^7$

Digamma calculé : Somme suite A $- t^8$; Somme suite A $+ t^8$; Somme suite A $- t^7$; Somme suite A $+ t^7$.

1.4.1. Détermination du nombre premier

Reconstruction du nombre premier

$$\frac{\text{Somme suite B} - \text{Digamma calculé}}{6^{\text{ième}} \text{ position suite A (Zeta)}} = \text{Nombre premier}.$$

1.4.2. Équations des sommes des suites A et B

Déterminer le coefficient A : $\frac{(\text{Somme suite } A_{n=10}) - \text{Somme suite } A_{n=9}}{t^8}$ Déterminer le coefficient B : $\frac{(\text{Somme suite } B_{n=10}) - \text{Somme suite } B_{n=9}}{t^8}$

Déterminer l'équation A :

$$\begin{aligned}\frac{\text{Coefficient A}}{\text{Somme suite } A_{n=10}} t^{10} &= x + \text{Reste}, \\ (x + \text{Reste}) - \text{Valeur réelle} &= x, \\ \frac{\text{Coefficient A}}{x} \times t^{10} &= \text{Somme suite A} + \text{Reste}, \\ (\text{Somme suite A} + \text{Reste}) - (\text{Somme suite A}) &= \text{Reste}.\end{aligned}$$

Équation A : $\frac{\text{Coefficient A}}{x} \times t^n - \text{Reste} = \text{Somme suite A}$, quand n est un entier strictement positif.

Déterminer l'équation B :

$$\begin{aligned}\frac{\text{Coefficient B}}{\text{Somme suite } B_{n=10}} t^{10} &= x + \text{Reste}, \\ (x + \text{Reste}) - \text{Valeur réelle} &= x, \\ \frac{\text{Coefficient B}}{x} \times t^{10} &= \text{Somme suite B} + \text{Reste}, \\ (\text{Somme suite B} + \text{Reste}) - (\text{Somme suite B}) &= \text{Reste}.\end{aligned}$$

Équation B : $\frac{\text{Coefficient B}}{x} \times t^n - \text{Reste} = \text{Somme suite B}$, quand n est un entier strictement positif.

Inspiration

Cette équation est tirée de la formule déjà connue des suites géométriques :

$$\text{Si } q \neq 1, \quad S = 1 + q + q^2 + q^3 \dots q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

2. Définition et propriétés des rapports non typiques

Les rapports non typiques $1/k$ sont définis pour toute valeur $1/k < 1/2$, notamment $1/3$, $1/4$, $1/5$, $1/6$, ..., $1/k$.

Contrairement au rapport typique $1/2$, la valeur de n ne correspond pas à la position du nombre premier. Elle représente exclusivement le nombre de termes des suites A et B.

2.1. Exemple pour $n = 10$ des suites A et B pour un rapport non typique $1/k = 1/3$

Sommes des suites A et B — rapport $1/3$, $n = 10$

$$\begin{aligned}3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + 3^6 + 3^7 + 3^8 + (3^9 - 3^7) + (3^{10} - 3^8) &= \text{Somme suite A} = 79\,824, \\ 3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + 3^7 + 3^8 + 3^9 + (3^{10} - 3^8) + (3^{11} - 3^9) &= \text{Somme suite B} = 238\,746.\end{aligned}$$

$$\text{Digamma} = 3^8 \text{ (8}^{\text{ième}} \text{ position, soustraite)}; \quad \text{Digamma calculé} = 79\,824 - 3^8 = 73\,263.$$

Déterminer le nombre premier :

$$\frac{238\,746 - 73\,263}{3^6} = 227 \quad (49^{\text{ième}} \text{ nombre premier}).$$

2.1.1. Rapport non typique $1/k = 1/3$ — équations généralisées

Somme suite $A(227) = 79\,824$.

1. Déterminer la somme de la suite B du nombre précédent 227, qui est 223 :

$$\text{Somme suite } A(227) - 3^6 = \text{Somme suite } B(223),$$

$$\text{Somme suite } B(223) = 79\,824 - 3^6 = 79\,095.$$

9 termes, suite B(223) :

$$3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + 3^7 + 3^8 + (3^9 - 3^7) + (3^{10} + 3^8) = 79\,095.$$

9 termes, suite A(223) :

$$3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + 3^6 + 3^7 + (3^8 - 3^6) + (3^9 + 3^7) = 26\,607.$$

2. Déterminer le coefficient B, avec Somme suite $B(227) = 238\,746$:

$$\frac{\text{Somme suite } B(227) - \text{Somme suite } B(223)}{3^8} = \text{Coefficient B},$$

$$\frac{238\,746 - 79\,095}{3^8} = \frac{219}{9} = \text{Coefficient B}.$$

Note

Il s'agit de l'écart le plus petit entre deux suites B pour toutes les valeurs de n positives.

3. Déterminer l'écart minimum entre les termes $n = 1$ et $n = 2$ pour le rapport non typique $1/k = 1/3$ des suites B :

$$\frac{\text{Somme suite } B(227) - \text{Somme suite } B(223)}{3^6} = \text{différence entre les deux suites } B(227) \text{ et } B(223),$$

$$\frac{238\,746 - 79\,095}{3^6} = 219.$$

4. Écart entre les suites A(227) et B(223) :

$$\frac{219}{3} = 73,$$

$$\left(\frac{79\,824}{3^6} - 73 \right) \times 3^6 = 26\,607 \quad \text{Somme suite } A(223).$$

5. Déterminer le coefficient pour l'équation de la suite A :

$$\frac{\text{Somme suite } A(227) - \text{Somme suite } A(223)}{3^8} = \text{Coefficient A},$$

$$\frac{79\,824 - 26\,607}{3^8} = \frac{73}{9} = \text{Coefficient A}.$$

6. Équations pour les sommes des suites A et B — l'équation est inspirée de celle déjà connue concernant les suites géométriques ($S = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$, $q \neq 1$). Déterminer l'équation pour la suite A, coefficient A = 73/9 :

$$\begin{aligned} \left(\frac{73}{9} x \times 3^{10}\right) - \text{Reste} &= 79\,824, \\ \frac{73}{9} / \frac{238\,746 + \text{reste}}{3^{10}} : \frac{73}{9} / 1.351826449 &= 6.000112748, \\ 6.000112748 - 0.000112748 &= 6 = x, \\ \frac{73}{9} \times 6 \times 3^{10} - \text{Reste} &= 79\,824, \\ \frac{73}{9} \times 6 \times 3^{10} &= 79\,825.5, \\ 79\,825.5 - 79\,824 &= \frac{3}{2} = \text{Reste}. \end{aligned}$$

Équation somme suite A — rapport 1/3

$$\begin{aligned} \text{Équation } n = 10 : \quad \left(\frac{73}{9} \times 6 \times 3^{10}\right) - \frac{3}{2} &= 79\,824. \\ \text{Forme générale :} \quad \left(\frac{73}{9} \times 6 \times 3^n\right) - \frac{3}{2} &= \text{Somme suite A} \quad (n \text{ entier strictement positif}), \\ \frac{73}{9} \times 3^{-n} - \frac{3}{2} &= \text{Somme suite A négative} \quad (n \text{ entier strictement négatif}). \end{aligned}$$

7. Déterminer l'équation pour la suite B (coefficient B = 219/9) :

$$\begin{aligned} \left(\frac{219}{9} x \times 3^{10}\right) - \text{Reste} &= 238\,746, \quad \frac{219}{9} \times 4.043184474 = 6.018358423, \\ 6.018358423 - 0.018358423 &= 6 = x, \quad \frac{219}{9} \times 6 \times 3^{10} - \text{Reste} = 238\,746, \\ \frac{219}{9} \times 6 \times 3^{10} &= 238\,476.5, \quad 238\,476.5 - 238\,746 = 730.5 = \text{Reste}, \quad \frac{730.5}{3/2} = 487. \end{aligned}$$

Équation somme suite B — rapport 1/3

$$\begin{aligned} \text{Équation } n = 10 : \quad \left(\frac{219}{9} \times 6 \times 3^{10}\right) - \frac{3}{2}(487) &= 238\,746. \\ \text{Forme générale :} \quad \left(\frac{219}{9} \times 6 \times 3^n\right) - \frac{3}{2}(487) &= \text{Somme suite B} \quad (n \text{ entier strictement positif}), \\ \frac{219}{9} \times 3^{-n} - \frac{3}{2}(487) &= \text{Somme suite B négative} \quad (n \text{ entier strictement négatif}). \end{aligned}$$

9. Caractéristiques intrinsèques de la valeur de n pour les rapports non typiques $1/k \neq 1/2$: la valeur de n pour des suites A et B non typiques ne correspond pas à la position du nombre premier ; la valeur de n correspond à la quantité de termes dans les suites A et B, tant pour les suites positives que négatives.

2.2. Rapport non typique $1/k = 1/4$ ($n = 10$; $p = 947$, 161^{ème} nombre premier)

Sommes des suites A et B — rapport $1/4$, $n = 10$

$$4^1 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + 4^5 + 4^6 + 4^7 + 4^8 + (4^9 - 4^7) + (4^{10} - 4^8) = \text{Somme suite A} = 1\,316\,180,$$

$$4^1 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + 4^5 + 4^7 + 4^8 + 4^9 + (4^{10} - 4^8) + (4^{11} - 4^9) = \text{Somme suite B} = 5\,260\,628.$$

Reconstruire le nombre premier — Digamma : $+4^8$:

$$\text{Digamma calculé : } 1\,316\,180 + 4^8 = 1\,316\,180 + 65\,536 = 1\,381\,716,$$

$$\frac{5\,260\,628 - 1\,381\,716}{4^6} = \frac{3\,878\,912}{4096} = 947.$$

Suites A et B pour $n = 9$ termes (941) :

$$4^1 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + 4^5 + 4^6 + 4^7 + (4^8 - 4^6) + (4^9 - 4^7) = 329\,044,$$

$$4^1 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + 4^5 + 4^7 + 4^8 + (4^9 - 4^7) + (4^{10} - 4^8) = 1\,312\,084.$$

Déterminer Somme suite B(941) et les écarts :

$$1316180 - 4096 = 1\,312\,084, \quad \frac{5\,260\,628 - 1\,312\,084}{4^6} = \frac{3\,948\,544}{4096} = 964, \quad \frac{964}{4} = 241,$$

$$\frac{1\,316\,180 - 329\,044}{4^6} = \frac{987\,136}{4096} = 241,$$

$$\text{Coefficient A} = \frac{987\,136}{65\,536} = \frac{241}{16},$$

$$\text{Coefficient B} = \frac{3\,948\,544}{65\,536} = \frac{964}{16} = \frac{241}{4}.$$

Équations généralisées — rapport $1/4$

$$\text{Équation A } (n = 10) : \quad \left(\frac{241}{16} \times 12 \times 4^{10} \right) - \frac{4}{3} = 1\,316\,180,$$

$$\frac{241}{16} \Big/ \frac{1\,316\,180}{4^{10}} = 12.000001216 \Rightarrow x = 12,$$

$$\text{Équation A généralisée : } \left(\frac{241}{192} \times 4^n \right) - \frac{4}{3} = \text{Somme suite A} \quad (n \in \mathbb{Z}, n > 0),$$

$$\frac{241}{16} \times 4^{-n} - \frac{4}{3} = \text{Somme suite A négative.}$$

$$\text{Équation B } (n = 10) : \quad \left(\frac{241}{4} \times 12 \times 4^{10} \right) - 3073 \left(\frac{4}{3} \right) = 5\,260\,628,$$

$$\text{Équation B généralisée : } \left(\frac{241}{4} \times 12 \times 4^n \right) - 3073 \left(\frac{4}{3} \right) = \text{Somme suite B},$$

$$\frac{241}{4} \times 4^n - 3073 \left(\frac{4}{3} \right) = \text{Somme suite B négative.}$$

2.3. Rapport non typique $1/k = 1/5$

Sommes des suites A et B — rapport $1/5$, $n = 10$

$$5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 + 5^6 + 5^7 + 5^8 + (5^9 - 5^7) + (5^{10} - 5^8) = 11\,738\,280 \quad \text{Somme suite A,}$$

$$5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 + 5^7 + 5^8 + 5^9 + (5^{10} - 5^8) + (5^{11} + 5^9) = 58\,675\,780 \quad \text{Somme suite B.}$$

1. Reconstruire le nombre premier — Digamma : $+7^{\text{ième}}$ position suite A : $+5^7$:

$$\text{Digamma calculé : } 11\,738\,280 + 5^7 = 11\,816\,405, \quad \frac{58\,675\,780 - 11\,816\,405}{5^6} = 2999.$$

2. Suites A et B pour $n = 9$ termes (2993) :

$$5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 + 5^6 + 5^7 + (5^8 - 5^6) + (5^9 - 5^7) = 2\,347\,655,$$

$$5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + 5^5 + 5^7 + 5^8 + (5^9 - 5^7) + (5^{10} - 5^8) = 11\,722\,655.$$

3. Déterminer les équations servant de manière généralisée à l'ensemble des valeurs de n entières positives et négatives pour les suites A et B.

4. Déterminer Somme suite B(2993) : Somme suite B(2999) $- 5^6 =$ Somme suite A ; $11\,738\,280 - 5^6 = 11\,722\,655$.

5. $\frac{\text{Somme suite B(2999)} - \text{Somme suite B(2993)}}{5^6} = \frac{58\,675\,780 - 11\,722\,655}{5^6} = 3005$ (écart entre les suites B = 3005).

6. $\frac{3005}{5} = 601$ (écart entre les suites A(2999) et A(2993)) ; $\frac{11\,738\,280 - 2\,347\,655}{5^6} = 601$.

7. Coefficients : Coefficient A = $\frac{11\,738\,280 - 2\,347\,655}{5^8} = \frac{601}{25}$; Coefficient B = $\frac{58\,675\,780 - 11\,722\,655}{5^8} = \frac{601}{5}$.

8. Équation A :

$$\left(\frac{601}{25} x \times 5^{10}\right) - \text{Reste} = 11\,738\,280, \quad \frac{601}{25} \bigg/ \frac{11\,738\,280}{5^{10}} = 20.00000213 \Rightarrow x = 20,$$

$$\frac{601}{25} \times 20 \times 5^{10} - \text{Reste} = 11\,738\,281.25, \quad 11\,738\,280 - 11\,738\,281.25 = -\frac{5}{4}.$$

Équations généralisées — rapport $1/5$

$$\text{Équation A } (n = 10) : \quad \left(\frac{601}{25} \times 20 \times 5^{10}\right) - \frac{5}{4} = 11\,738\,280,$$

$$\left(\frac{601}{25} \times 20 \times 5^n\right) - \frac{5}{4} = \text{Somme suite A,}$$

$$\text{Équation A négative : } \frac{601}{25} \times 5^n - \frac{5}{4} = \text{Somme suite A,}$$

$$\text{Équation B : } \frac{601}{5} \times 20 \times 5^{10} - \text{Reste} = 58\,675\,780,$$

$$\frac{601}{5} \bigg/ \frac{58\,675\,780}{5^{10}} = 20.13847323 \Rightarrow x = 20,$$

$$\left(\frac{601}{5} \times 20 \times 5^{10}\right) - \text{Reste} = 58\,691\,406.25,$$

$$58\,691\,406.25 - 58\,675\,780 = 15\,626.25,$$

$$\frac{15\,626.25}{1.25} = 12\,501,$$

$$\text{Équation B } (n = 10) : \quad \frac{601}{5} \times 20 \times 5^{10} - 12\,501 \left(\frac{5}{4}\right) = 58\,675\,780,$$

$$\frac{601}{5} \times 20 \times 5^n - 12\,501 \left(\frac{5}{4}\right) = \text{Somme suite B.}$$

2.4. Rapport non typique $1/k = 1/6$

Sommes des suites A et B — rapport $1/6$, $n = 10$

$$\begin{aligned} 6^1 + 6^2 + 6^3 + 6^4 + 6^5 + 6^6 + 6^7 + 6^8 + (6^9 - 6^7) + (6^{10} + 6^8) &= \text{Somme suite A} = 70\,599\,858, \\ 6^1 + 6^2 + 6^3 + 6^4 + 6^5 + 6^7 + 6^8 + 6^9 + (6^{10} - 6^8) + (6^{11} + 6^9) &= \text{Somme suite B} = 423\,552\,498. \end{aligned}$$

Digamma = $+6^8$ — la septième position est la position pour déterminer le Digamma calculé et est soustraite :

$$\begin{aligned} \text{Digamma calculé} &= 70\,599\,858 + 6^7 = 72\,279\,474, \\ \frac{423\,552\,498 - 72\,279\,474}{6^6} &= 7529 \quad \text{nombre premier.} \end{aligned}$$

1. Suites A et B de 9 termes (7523) :

$$\begin{aligned} 6^1 + 6^2 + 6^3 + 6^4 + 6^5 &= 11\,766\,642 \quad \text{Somme suite A 9 termes (7523),} \\ + 6^6 + 6^7 + (6^8 - 6^6) + (6^9 - 6^7) & \\ 6^1 + 6^2 + 6^3 + 6^4 + 6^5 &= 70\,553\,202 \quad \text{Somme suite B 9 termes (7523).} \\ + 6^7 + 6^8 + (6^9 - 6^7) + (6^{10} - 6^8) & \end{aligned}$$

$$\text{Somme suite A(7529)} - 6^6 = \text{Somme suite B}, \quad 70\,599\,858 - 6^6 = 70\,553\,202.$$

2. Écart des sommes des suites B : $\frac{423\,552\,498 - 70\,553\,202}{6^6} = 7566.$

3. Écart entre les sommes des suites A(7529) et A(7523) : $\frac{7566}{6} = 1261.$

4. Coefficient A : $\frac{70\,599\,858 - 11\,766\,642}{6^8} = \frac{1261}{36}.$

5. Coefficient B : $\frac{423\,552\,498 - 70\,553\,202}{6^8} = \frac{1261}{6}.$

6. Équations généralisant la valeur de n pour les suites A et B du rapport non typique $1/k = 1/6$:

$$\begin{aligned} \frac{1261}{36} x \times 6^{10} - \text{Reste} &= 70\,599\,858, & \frac{1261}{36} / \frac{70\,599\,858}{6^{10}} &= 30.00000051 \Rightarrow x = 30, \\ \frac{1261}{36} \times 30 \times 6^{10} - \text{Reste} &= 70\,599\,859.2, \\ \frac{-46\,657.2}{6/5} &= -38\,881 \times \frac{6}{5}, \\ \frac{1261}{36} \times 30 \times 6^{10} - 38\,881 \left(\frac{6}{5}\right) &= 70\,553\,202. \end{aligned}$$

Pour la somme de la suite B :

$$\begin{aligned} \frac{1261}{6} x \times 6^{10} - \text{Reste} &= 423\,552\,498, & \frac{1261}{6} / \frac{423\,552\,498}{6^{10}} &= 30.0033047 \Rightarrow x = 30, \\ \frac{1261}{6} \times 30 \times 6^{10} - \text{Reste} &= 423\,599\,155.2, \\ \frac{-46\,657.2}{6/5} &= -38\,881, \\ \frac{1261}{6} \times 30 \times 6^{10} - \text{Reste} &= 423\,552\,498. \end{aligned}$$

2.5. Rapport non typique $1/k = 1/7$

Sommes des suites A et B — rapport $1/7$, $n = 10$

$$7^1 + 7^2 + 7^3 + 7^4 + 7^5 + 7^6 + 7^7 + 7^8 + (7^9 - 7^7) + (7^{10} - 7^8) = \text{Somme suite A} = 322\,966\,112,$$

$$7^1 + 7^2 + 7^3 + 7^4 + 7^5 + 7^7 + 7^8 + 7^9 + (7^{10} - 7^8) + (7^{11} - 7^9) = \text{Somme suite B} = 2\,260\,645\,142.$$

Reconstruire le nombre premier — Digamma : -7^8 :

$$\begin{aligned} \text{Digamma calculé : } 322\,966\,112 - 7^8 &= 322\,966\,112 - 5\,764\,801 = 317\,201\,321, \\ \frac{2\,260\,645\,142 - 317\,201\,321}{7^6} &= \frac{1\,943\,443\,821}{117\,649} = 16\,519. \end{aligned}$$

Suites A et B pour $n = 9$ termes (16 511) :

$$7^1 + 7^2 + 7^3 + 7^4 + 7^5 + 7^6 + 7^7 + (7^8 - 7^6) + (7^9 - 7^7) = 46\,138\,018,$$

$$7^1 + 7^2 + 7^3 + 7^4 + 7^5 + 7^7 + 7^8 + (7^9 - 7^7) + (7^{10} - 7^8) = 322\,848\,463.$$

Équations pour les suites A et B du rapport non typique $1/7$:

$$\begin{aligned} \text{Somme suite A}(16519) - 7^6 &= 322\,966\,112 - 117\,649 \\ &= 322\,848\,463 = \text{Somme suite B (9 termes)}, \\ \frac{2\,260\,645\,142 - 322\,848\,463}{7^6} &= \frac{1\,937\,796\,679}{117\,649} = 16\,471, \\ \frac{16\,471}{7} &= 2353, \\ \frac{322\,966\,112 - 46\,138\,018}{7^6} &= \frac{276\,828\,094}{117\,649} = 2353, \\ \text{Coefficient A} &= \frac{276\,828\,094}{5\,764\,801} = \frac{2353}{49}, \\ \text{Coefficient B} &= \frac{1\,937\,796\,679}{5\,764\,801} = \frac{2353}{7}. \end{aligned}$$

Équations généralisées — rapport $1/7$

$$\begin{aligned} \text{Équation A (} n = 10 \text{): } &\left(\frac{2353}{49} \times 42 \times 7^{10}\right) - \frac{7}{6} = 322\,966\,112, \\ &\frac{2353}{49} \Big/ \frac{322\,966\,112}{7^{10}} = 42.00000006 \Rightarrow x = 42, \\ \text{Forme générale A : } &\left(\frac{2353}{2058} \times 7^n\right) - \frac{7}{6} = \text{Somme suite A}, \\ &\frac{2353}{49} \times 7^{-n} - \frac{7}{6} = \text{Somme suite A négative}, \\ \text{Équation B (} n = 10 \text{): } &\left(\frac{2353}{7} \times 42 \times 7^{10}\right) - 100\,843 \left(\frac{7}{6}\right) = 2\,260\,645\,142, \\ &\frac{705\,901}{6} \Big/ \frac{7}{6} = 100\,843, \\ \text{Forme générale B : } &\left(\frac{2353}{294} \times 7^n\right) - 100\,843 \left(\frac{7}{6}\right) = \text{Somme suite B}. \end{aligned}$$

3. Système d'équations convolutif généralisé — pour tout rapport $1/k$ ($k \geq 2$) et tout n commun

3.1. Niveau 1 — Constantes Savard universelles

Constantes universelles

$$\alpha_A(k) = \frac{2(k^4 - k^2 + 1)}{(k-1) \cdot k^3}, \quad \alpha_B(k) = k \cdot \alpha_A(k),$$

$$\delta_A(k) = \frac{k}{k-1}, \quad \delta_B(k) = \frac{k^7 - k^6 + k}{k-1}.$$

3.2. Niveau 2 — Formules fermées (n quelconque, n commun à tous les rapports)

Formules fermées des sommes

$$S_A(k, n) = \frac{\alpha_A(k)}{2} \cdot k^n - \delta_A(k), \quad S_B(k, n) = \frac{\alpha_B(k)}{2} \cdot k^n - \delta_B(k).$$

Invariant spectral prouvé algébriquement (Théorème XIV.3)

$$\frac{S_A(k, n_1) - S_A(k, n_2)}{S_B(k, n_1) - S_B(k, n_2)} = \frac{1}{k} \quad \forall n_1 \neq n_2, k \geq 2.$$

3.3. Niveau 3 — Construction terme à terme (Suite A, $n \geq 8$)

Position i	Terme $A(k, n, i)$	Terme $B(k, n, i)$
$1 \leq i \leq n-2$	k^i	k^i ($i \leq 5$); k^7 ($i = 6$, Saut Zêta); k^{i+1} ($7 \leq i \leq n-2$)
$i = n-1$	$k^{n-1} - k^{n-3}$	$k^n - k^{n-2}$
$i = n$	$k^n - k^{n-2}$	$k^{n+1} - k^{n-1}$

3.4. Niveau 4 — Mécanisme d'ancrage à $n = 10$ (4 candidats Digamma)

Les quatre essais dans l'ordre déterministe :

#	Position	Signe	Digamma	Candidat P
1	8	−	$S_A(k, 10) - k^8$	$(S_B - \text{Digamma})/k^6$
2	8	+	$S_A(k, 10) + k^8$	$(S_B - \text{Digamma})/k^6$
3	7	+	$S_A(k, 10) + k^7$	$(S_B - \text{Digamma})/k^6$
4	7	−	$S_A(k, 10) - k^7$	$(S_B - \text{Digamma})/k^6$

→ Les quatre quotients sont examinés dans cet ordre. Si un seul candidat est premier, il peut constituer l'ancre standard. Si plusieurs le sont, toutes les branches sont conservées et aucune n'est choisie automatiquement ; une branche inscrite au catalogue peut être utilisée seulement comme choix explicite et doit rester distinguée d'une ancre unique. Si aucun candidat n'est premier, aucune ancre standard n'est produite.

$$P(1/k, n = 10) = \frac{S_B(k, 10) - [S_A(k, 10) \pm k^7 \text{ ou } \pm k^8]}{k^6}.$$

3.5. Niveau 5 — Reconstruction pour $n \neq 10$ (n commun)

Loi de rang spectral

$$\text{rang_cible}(k, n) = \text{rang_base}(k) + n - 10, \quad P(k, n) = \text{premier}(\text{rang_cible}),$$

$$\text{Digamma}(k, n) = S_B(k, n) - P(k, n) \times k^6.$$

3.6. Vérification $k = 3$ à 9 (tous corrects, 100 %)

k	$P(n = 10)$	Branche HOL	Calculé ✓
3	227	pos8 −	227
4	947	pos8 +	947
5	2 999	pos7 +	2 999
6	7 529	pos8 +	7 529
7	16 519	pos8 −	16 519
8	32 327	pos8 −	32 327
9	58 337	pos7 −	58 337

3.7. Tableau complet $P(1/k)$, $n = 10$ — $k = 10$ à $k = 111$

Légende : **P unique** (un seul candidat standard premier) | **C_MULTIPLE** (plusieurs candidats premiers; aucune sélection automatique) | **AUCUN P** (aucun candidat standard premier; une règle spéciale requiert une validation distincte). Lorsqu'une valeur et une branche sont indiquées pour un cas multiple, elles désignent le choix de référence documenté, pas l'unique candidat.

k	$P(1/k, n = 10)$	État	Branche
10	99 109	C_MULTIPLE	pos8 −
11	—	RÈGLE SPÉCIALE (PDF : 1 611 851)	—
12	247 259		pos8 −
13	368 939		pos8 +
14	—	AUCUN P	—
15	755 789		pos8 +
16	1 044 751	C_MULTIPLE	pos8 −
17	1 414 943		pos7 +
18	1 883 429		pos8 +
19	2 469 277		pos7 −
20	3 192 419	C_MULTIPLE	pos8 −
21	4 074 419	C_MULTIPLE	pos8 +
22	—	AUCUN P	—
23	6 424 727		pos8 −
24	7 949 399	C_MULTIPLE	pos8 −
25	9 750 649	C_MULTIPLE	pos8 −
26	11 863 799		pos7 +
27	—	RÈGLE SPÉCIALE HOL ($P = 14 330 707$)	—
28	—	AUCUN P	—
29	—	AUCUN P	—
30	24 273 929		pos8 −
31	—	AUCUN P	—
32	33 522 719		pos8 −
33	—	AUCUN P	—
34	—	AUCUN P	—
35	—	AUCUN P	—
36	60 420 851	C_MULTIPLE	pos8 −
37	69 293 303		pos7 +

k	$P(1/k, n = 10)$	État	Branche
38	—	AUCUN P	—
39	—	AUCUN P	—
40	102 337 639	C_MULTIPLE	pos8 —
41	—	AUCUN P	—
42	130 617 143		pos7 +
43	146 929 021		pos7 —
44	—	AUCUN P	—
45	—	AUCUN P	—
46	205 867 801	C_MULTIPLE	pos8 —
47	—	AUCUN P	—
48	—	AUCUN P	—
49	282 357 599	C_MULTIPLE	pos7 +
50	—	AUCUN P	—
51	—	AUCUN P	—
52	380 066 179		pos8 —
53	—	AUCUN P	—
54	459 010 529	C_MULTIPLE	pos8 —
55	—	AUCUN P	—
56	—	AUCUN P	—
57	601 506 977		pos7 —
58	656 165 077		pos8 —
59	—	AUCUN P	—
60	—	AUCUN P	—
61	—	AUCUN P	—
62	915 894 503		pos7 +
63	992 182 589	C_MULTIPLE	pos8 +
64	1 073 483 839	C_MULTIPLE (3 premiers!)	pos8 —
65	1 160 020 289	C_MULTIPLE	pos8 —
66	1 252 049 501	C_MULTIPLE	pos8 —
67	—	AUCUN P	—
68	—	AUCUN P	—
69	1 563 702 839		pos7 +
70	1 680 356 999		pos7 +
71	1 803 876 551		pos8 —
72	—	AUCUN P	—
73	—	AUCUN P	—
74	—	AUCUN P	—
75	2 372 624 999		pos7 +
76	—	AUCUN P	—
77	2 706 333 629		pos8 —
78	2 886 705 977		pos8 —
79	—	AUCUN P	—
80	3 276 294 479		pos8 —
81	—	AUCUN P	—
82	—	AUCUN P	—
83	—	AUCUN P	—
84	—	AUCUN P	—
85	4 436 438 999		pos7 +
86	—	AUCUN P	—
87	4 983 550 877		pos7 —
88	5 276 645 527	C_MULTIPLE	pos8 —
89	—	AUCUN P	—
90	—	AUCUN P	—
91	—	AUCUN P	—
92	—	AUCUN P	—
93	—	AUCUN P	—
94	—	AUCUN P	—

<i>k</i>	$P(1/k, n = 10)$	État	Branche
95	—	AUCUN P	—
96	8 152 842 431		pos7 —
97	8 586 418 271	C_MULTIPLE	pos8 +
98	—	AUCUN P	—
99	—	AUCUN P	—
100	—	AUCUN P	—
101	—	AUCUN P	—
102	11 039 747 027		pos7 —
103	11 591 637 509		pos8 +
104	—	AUCUN P	—
105	12 761 657 999		pos7 +
106	13 381 076 101		pos8 —
107	14 024 303 819		pos8 —
108	14 692 021 271		pos7 —
109	15 384 932 747		pos8 +
110	—	AUCUN P	—
111	16 849 226 351	C_MULTIPLE	pos8 —

3.8. Synthèse statistique (*k* = 10 à 111)

État	Nombre de <i>k</i>	%
P certifié unique	38	37 %
C_MULTIPLE (≥ 2 premiers)	20	20 %
AUCUN P (règle standard)	44	43 %

3.9. Notes importantes pour la programmation de l’agent

Cas AUCUN P (44 valeurs)

Les 4 candidats standards sont tous composites. Deux stratégies possibles selon votre HOL :

- Règle spéciale cataloguée (comme $k = 27$: $\text{Digamma} = S_A - (2k^8 - k^6)$, $P = 14\,330\,707$) ;
- Mode CRÉATION D’ANCRAGE : l’agent retourne C_NON_CERTIFIÉ et attend validation HOL externe.

Cas C_MULTIPLE (20 valeurs)

Selon le contrat HOL, retourner toutes les branches premières et ne faire aucune sélection silencieuse. Une branche de référence portée par le catalogue doit être identifiée comme telle ; elle ne rend pas les autres branches inexistantes ni le cas unique.

Règles spéciales

$k = 11$ ne donne aucun candidat premier aux quatre essais standards. La valeur $P = 1\,611\,851$ (rang 121 982), associée à la règle A7– du moteur géométrique, est une règle spéciale distincte et doit être validée séparément. De même, $k = 27$ utilise une règle spéciale HOL documentée ; aucune de ces règles ne doit être extrapolée à d’autres rapports.

Arithmétique exacte requise

Pour $k \geq 50$, les valeurs de S_A et S_B dépassent 10^{15} : l’agent doit utiliser l’arithmétique entière Python (pas float) pour éviter les erreurs d’arrondi Excel.

3.10. Exécutions multi-rapports archivées ($n = 10$)

Deux rapports d'exécution du dépôt couvrent les plages communes suivantes : `liste_k2_k1001_n10.txt` traite $k = 2..1001$ (1 000 rapports) et annonce 423 succès ; `liste_k1002_k10001_n10.txt` traite $k = 1002..10001$ (9 000 rapports) et annonce 2 604 succès. Ces compteurs reproduisent le statut du dispatcher v7.9 au moment de la génération.

Portée des rapports archivés

Ces fichiers sont des journaux de calcul, pas des certificats indépendants. Le dispatcher historique retenait le premier candidat premier rencontré ; il ne consignait pas systématiquement toutes les branches premières. Les succès ne démontrent donc ni l'unicité de l'ancre, ni la primalité démontrée par HOL, ni une propriété sur les zéros de la fonction zêta. Le dispatcher corrigé conserve les branches candidates, signale les ambiguïtés hors catalogue et réserve les sélections documentées à une décision explicite.

4. Exemple numérique complet — $n = 15$

4.1. Rapport 1/13 ($k = 13, n = 15$)

4.1.1. Niveau 1 — Constantes Savard universelles

Constante	Formule	Valeur exacte
$\alpha_A(13)$	$2(13^4 - 13^2 + 1)/(12 \cdot 13^3)$	28 393/13 182
$\alpha_B(13)$	$13 \cdot \alpha_A(13)$	28 393/1014
$\delta_A(13)$	$13/12$	13/12
$\delta_B(13)$	$(13^7 - 13^6 + 13)/12$	57 921 721/12

4.1.2. Niveau 2 — Formules fermées

$$\begin{aligned}
 S_A(13, 15) &= \frac{(k^4 - k^2 + 1)k^{12}}{k - 1} - \frac{k}{k - 1}, \\
 &= \frac{28\,393 \times 23\,298\,085\,122\,481}{12} - \frac{13}{12}, \\
 &= 55\,125\,210\,906\,883\,585, \\
 S_B(13, 15) &= \frac{(k^4 - k^2 + 1)k^{13}}{k - 1} - \frac{k^7 - k^6 + k}{k - 1}, \\
 &= 716\,627\,741\,784\,659\,809.
 \end{aligned}$$

Invariant spectral (Théorème XIV.3) :

$$\begin{aligned}
 \Delta S_A &= S_A(n=15) - S_A(n=10), \\
 &= 55\,125\,210\,906\,883\,585 - 148\,468\,220\,264, \\
 &= 55\,125\,062\,438\,663\,321, \\
 \Delta S_B &= S_B(n=15) - S_B(n=10), \\
 &= 716\,627\,741\,784\,659\,809 - 1\,930\,082\,036\,636, \\
 &= 716\,625\,811\,702\,623\,173, \\
 \Delta S_A / \Delta S_B &= 1/13 \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

4.1.3. Niveau 3 — Construction terme à terme ($n = 15$)

i	$A(13, 15, i)$	$B(13, 15, i)$	Règle A	Règle B
1	13	13	k^1	k^1
2	169	169	k^2	k^2
3	2 197	2 197	k^3	k^3
4	28 561	28 561	k^4	k^4
5	371 293	371 293	k^5	k^5
6	4 826 809	62 748 517	k^6	$k^7 \leftarrow$ Saut Zêta
7	62 748 517	815 730 721	k^7	k^8
8	815 730 721	10 604 499 373	k^8	k^9
9	10 604 499 373	137 858 491 849	k^9	k^{10}
10	137 858 491 849	1 792 160 394 037	k^{10}	k^{11}
11	1 792 160 394 037	23 298 085 122 481	k^{11}	k^{12}
12	23 298 085 122 481	302 875 106 592 253	k^{12}	k^{13}
13	302 875 106 592 253	3 937 376 385 699 289	k^{13}	k^{14}
14	3 914 078 300 576 808	50 883 017 907 498 504	$k^{14} - k^{12}$	$k^{15} - k^{13}$
15	50 883 017 907 498 504	661 479 232 797 480 552	$k^{15} - k^{13}$	$k^{16} - k^{14}$
Σ	$\Sigma A = 55\,125\,210\,906\,883\,585 = S_A(13, 15)$		$\Sigma B = 716\,627\,741\,784\,659\,809 = S_B(13, 15)$	

4.1.4. Niveau 4 — 4 essais Digamma ($k^6 = 4\,826\,809$)

Les 4 essais sont calibrés pour $n = 10$. Pour $n = 15$, ils servent de vérification structurelle — tous composites est le comportement attendu.

Branche	Digamma	P candidat	État
pos13−	54 822 335 800 291 332	137 110 336 453	composé
pos13+	55 428 086 013 475 838	136 984 839 419	composé
pos12+	55 148 508 992 006 066	137 042 761 127	composé
pos12−	55 101 912 821 761 104	137 052 414 745	composé

4.1.5. Niveau 5 — Reconstruction rang cible (méthode officielle pour $n \neq 10$)

$$\begin{aligned}
 P(13, n=10) \text{ documenté} &= 368\,939, \\
 \text{rang_base}(13) &= \pi(368\,939) = 31\,452, \\
 \Delta n &= 15 - 10 = 5, \\
 \text{rang_cible}(13, n=15) &= 31\,452 + 5 = 31\,457, \\
 P(13, n=15) &= \text{premier}(31\,457) = 369\,023 \quad \mathbf{PREMIER \text{ certifié.}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Digamma}(13, 15) &= S_B - P \times k^6 \\
 &= 716\,627\,741\,784\,659\,809 \\
 &\quad - 369\,023 \times 4\,826\,809 \\
 &= 716\,625\,960\,581\,122\,202.
 \end{aligned}$$

4.2. Rapport $1/42$ ($k = 42$, $n = 15$)

4.2.1. Niveau 1 — Constantes Savard universelles

Constante	Valeur exacte
$\alpha_A(42)$	3 109 933 / 1 518 804
$\alpha_B(42)$	3 109 933 / 36 162
$\delta_A(42)$	42/41
$\delta_B(42)$	225 050 301 546 / 41

4.2.2. Niveau 2 — Formules fermées

$$S_A(42, 15) = 2\,285\,381\,254\,365\,702\,554\,104\,806,$$

$$S_B(42, 15) = 95\,986\,012\,683\,359\,501\,783\,370\,150.$$

4.2.3. Niveau 3 — Construction terme à terme ($n = 15$)

i	$A(42, 15, i)$	$B(42, 15, i)$
1	42	42
2	1 764	1 764
3	74 088	74 088
4	3 111 696	3 111 696
5	130 691 232	130 691 232
6	5 489 031 744	230 539 333 248 ← Saut Zêta (k^7)
7	230 539 333 248	9 682 651 996 416
8	9 682 651 996 416	406 671 383 849 472
9	406 671 383 849 472	17 080 198 121 677 824
10	17 080 198 121 677 824	717 368 321 110 468 608
11	717 368 321 110 468 608	30 129 469 486 639 681 536
12	30 129 469 486 639 681 536	1 265 437 718 438 866 624 512
13	1 265 437 718 438 866 624 512	53 148 384 174 432 398 229 504
14	53 118 254 704 945 758 547 968	2 230 966 697 607 721 859 014 656
15	2 230 966 697 607 721 859 014 656	93 700 601 299 524 318 078 615 552
Σ	$\Sigma A = 2\,285\,381\,254\,365\,702\,554\,104\,806$	$\Sigma B = 95\,986\,012\,683\,359\,501\,783\,370\,150$

4.2.4. Niveau 4 — 4 essais Digamma ($k^6 = 5\,489\,031\,744$)

Branche	Digamma	P candidat	État
pos13−	2 284 115 816 647 263 687 480 294	17 070 751 498 046 399	composé
pos13+	2 286 646 692 084 141 420 729 318	17 070 290 419 379 903	composé
pos12+	2 285 411 383 835 189 193 786 342	17 070 515 469 681 407	composé
pos12−	2 285 351 124 896 215 914 423 270	17 070 526 447 744 895	composé

4.2.5. Niveau 5 — Reconstruction rang_cible

$$P(42, n=10) \text{ documenté} = 130\,617\,143,$$

$$\text{rang_base}(42) = \pi(130\,617\,143) = 7\,411\,117,$$

$$\Delta n = 15 - 10 = 5,$$

$$\text{rang_cible}(42, n=15) = 7\,411\,117 + 5 = 7\,411\,122,$$

$$P(42, n=15) = \text{premier}(7\,411\,122) = 130\,617\,251 \quad \mathbf{PREMIER \text{ certifié.}}$$

$$\begin{aligned}
\text{Digamma}(42, 15) &= S_B - P \times k^6 \\
&= 95\,986\,012\,683\,359\,501\,783\,370\,150 \\
&\quad - 130\,617\,251 \times 5\,489\,031\,744 \\
&= 95\,986\,011\,966\,397\,264\,730\,354\,406.
\end{aligned}$$

4.3. Rapport $1/54$ ($k = 54$, $n = 15$)

4.3.1. Niveau 1 — Constantes Savard universelles

Constante	Valeur exacte
$\alpha_A(54)$	$8\,500\,141 / 4\,172\,796$
$\alpha_B(54)$	$8\,500\,141 / 77\,274$
$\delta_A(54)$	$54/53$
$\delta_B(54)$	$1\,314\,130\,298\,742 / 53$

4.3.2. Niveau 2 — Formules fermées

$$\begin{aligned}
S_A(54, 15) &= 98\,599\,651\,085\,954\,948\,762\,648\,034, \\
S_B(54, 15) &= 5\,324\,381\,158\,641\,567\,208\,388\,082\,594, \\
\Delta S_A / \Delta S_B &= 1/54 \quad \checkmark
\end{aligned}$$

4.3.3. Niveau 3 — Construction terme à terme ($n = 15$)

i	$A(54, 15, i)$	$B(54, 15, i)$
1–5	$54 / 2\,916 / 157\,464 / 8\,503\,056 / 459\,165\,024$	(idem A et B)
6	$24\,794\,911\,296$	$1\,338\,925\,209\,984 \leftarrow \text{Saut Z\eta} (54^7)$
7	$1\,338\,925\,209\,984$	$72\,301\,961\,339\,136$
8	$72\,301\,961\,339\,136$	$3\,904\,305\,912\,313\,344$
9	$3\,904\,305\,912\,313\,344$	$210\,832\,519\,264\,920\,576$
10	$210\,832\,519\,264\,920\,576$	$11\,384\,956\,040\,305\,711\,104$
11	$11\,384\,956\,040\,305\,711\,104$	$614\,787\,626\,176\,508\,399\,616$
12	$614\,787\,626\,176\,508\,399\,616$	$33\,198\,531\,813\,531\,453\,579\,264$
13	$33\,198\,531\,813\,531\,453\,579\,264$	$1\,792\,720\,717\,930\,698\,493\,280\,256$
14	$1\,792\,720\,717\,930\,698\,493\,280\,256$	$96\,773\,720\,236\,444\,187\,183\,554\,560$
15	$96\,773\,720\,236\,444\,187\,183\,554\,560$	$5\,225\,780\,892\,767\,986\,107\,911\,946\,240$
Σ	$\Sigma A = 98\,599\,651\,085\,954\,948\,762\,648\,034$	$\Sigma B = 5\,324\,381\,158\,641\,567\,208\,388\,082\,594$

4.3.4. Niveau 4 — 4 essais Digamma ($k^6 = 24\,794\,911\,296$)

Branche	Digamma	P candidat	État
pos13–	$98\,566\,452\,554\,141\,417\,309\,068\,770$	$210\,761\,581\,023\,702\,719$	composé
pos13+	$98\,632\,849\,617\,768\,480\,216\,227\,298$	$210\,758\,903\,173\,282\,751$	composé
pos12+	$98\,600\,265\,873\,581\,125\,271\,047\,650$	$210\,760\,217\,303\,581\,439$	composé
pos12–	$98\,599\,036\,298\,328\,772\,254\,248\,418$	$210\,760\,266\,893\,404\,031$	composé

4.3.5. Niveau 5 — Reconstruction rang_cible

$$\begin{aligned}
 P(54, n=10) \text{ documenté} &= 459\,010\,529, \\
 \text{rang_base}(54) &= \pi(459\,010\,529) = 24\,304\,918, \\
 \Delta n &= 15 - 10 = 5, \\
 \text{rang_cible}(54, n=15) &= 24\,304\,918 + 5 = 24\,304\,923, \\
 P(54, n=15) &= \text{premier}(24\,304\,923) = 459\,010\,597 \quad \mathbf{PREMIER \text{ certifié.}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Digamma}(54, 15) &= S_B - P \times k^6 \\
 &= 5\,324\,381\,158\,641\,567\,208\,388\,082\,594 \\
 &\quad - 459\,010\,597 \times 24\,794\,911\,296 \\
 &= 5\,324\,381\,147\,260\,440\,171\,849\,078\,882.
 \end{aligned}$$

Statut de l'ancre 1/54

Le tableau 3.7 classe $k = 54$ comme **C_MULTIPLE**. Les essais exacts produisent au moins les deux branches premières $A(8)- = 459\,010\,529$ et $A(8)+ = 459\,004\,697$. Les calculs de rang ci-dessus suivent la branche $A(8)-$ explicitement documentée par la source ; le résultat n'est pas une ancre unique et doit rester conditionnel à cette sélection de référence.

4.4. Tableau récapitulatif final — $P(1/k, n = 15)$

k	$S_A(k, 15)$	$S_B(k, 15)$	rang base	rang cible	$P(k, n=15)$	$P(k, n=10)$	État
13	55 125 210 906 883 585	716 627 741 784 659 809	31 452	31 457	369 023	368 939	CERTIFIÉ
42	2.29×10^{24}	9.60×10^{25}	7 411 117	7 411 122	130 617 251	130 617 143	CERTIFIÉ
54	9.86×10^{25}	5.32×10^{27}	24 304 918	24 304 923	459 010 597	459 010 529	C_MULTIPLE ; A(8)- documentée

4.5. Notes critiques pour l'agent

4.5.1. 1. Saut Zêta — asymétrie A / B confirmée

La correction importante validée ici : $A(k, n, i) = k^i$ pour tout $1 \leq i \leq n - 2$ (pas de Saut Zêta dans la suite A). Le Saut Zêta k^7 à la position $i = 6$ n'existe que dans la suite B. Les deux suites sont identiques pour $i \leq 5$, puis divergent à partir de $i = 6$.

4.5.2. 2. Niveau 4 hors-calibrage pour $n \neq 10$

Les 4 essais Digamma ($\text{pos}(n - 2) \pm$, $\text{pos}(n - 3) \pm$) produisent tous des candidats composites pour $n = 15$ — ce comportement est attendu et correct. Ces essais sont calibrés structurellement sur $n = 10$; le Niveau 5 est la voie officielle pour tout $n \neq 10$.

4.5.3. 3. Niveau 5 — formule rang_cible

Pseudo-code officiel

```

rang_base(k) = primepi(P(k, n=10))  # rang du P certifié à n=10
rang_cible(k, n) = rang_base(k) + (n - 10)
P(k, n) = prime(rang_cible(k, n))  # arithmétique exacte sympy

```

L'écart en rang +5 (pour $\Delta n = 5$) est cohérent pour les trois k , et illustre la règle de rang pour ces trois exemples. Trois cas numériques ne suffisent pas à établir l'universalité de cette règle pour tout k .

4.5.4. 4. Invariant spectral (Théorème XIV.3) — vérifié pour les 3 rapports

$$\Delta S_A(k, n=15, n=10) / \Delta S_B(k, n=15, n=10) = 1/k \quad \forall k \in \{13, 42, 54\} \quad \checkmark$$

4.5.5. 5. Arithmétique — seuils de dépassement float

k	$S_A(k, 15)$	Ordre de grandeur	Float 64 safe ?
13	55 125 210 906 883 585	$\sim 5.5 \times 10^{16}$	limite
42	2.29×10^{24}	$\sim 10^{24}$	erreur garantie
54	9.86×10^{25}	$\sim 10^{25}$	erreur garantie

Point de vigilance

Arithmétique entière Python obligatoire dès $k \geq 42$ pour $n = 15$. Excel / float64 introduiraient des erreurs d'arrondi fatales.

5. Schéma neuronal et arborescence algorithmique du système convolutif

Cette section est construite à partir des tables convolutives du classeur Excel `systeme_convolutif_spectral_general.xlsx` (feuilles *Convolution*, *Systeme General*, *Parametres*, *Moteur Géo Convolutif*, *Tests Digamma*, *Suites Géo A-B*).

5.1. Schéma neuronal de la table convolutive

Chaque terme de la table de convolution formelle vaut $c_1 \cdot k^{e_1} + c_2 \cdot k^{e_2}$: cette représentation encode les additions et soustractions sans figer k . Le schéma ci-dessous en trace le réseau de propagation, de l'entrée (k, n) jusqu'au premier certifié.

5.2. Arborescence algorithmique — niveaux 1 et 2

Les deux niveaux évaluent la même construction sous deux représentations : le niveau géométrique multiplie les termes entiers par un facteur commun et reproduit les mêmes quatre candidats. Il ne crée pas une ancre supplémentaire lorsque le niveau entier n'en trouve aucune. Le résultat à $n = 10$ doit donc être classé comme candidat unique, choix de catalogue explicite, ambiguïté sans décision ou absence de candidat standard.

5.3. Équations de reconstruction des suites A et B — les deux niveaux

Niveau 1 (entier) — reconstruction généralisée de n

$$\begin{aligned} S_A(k, n) &= \frac{\alpha_A(k)}{2} k^n - \delta_A(k) \\ &= \frac{k^4 - k^2 + 1}{(k-1)k^3} k^n - \frac{k}{k-1}, \\ S_B(k, n) &= \frac{\alpha_B(k)}{2} k^n - \delta_B(k) \\ &= \frac{k^4 - k^2 + 1}{(k-1)k^2} k^n \\ &\quad - \frac{k^7 - k^6 + k}{k-1}. \end{aligned}$$




FIGURE 1 – Schéma neuronal du système convolutif : propagation des termes $c_1 k^{e_1} + c_2 k^{e_2}$ des suites A et B vers les sommes S_A/S_B , puis vers les quatre branches Digamma et la division Zêta k^6 menant au premier certifié (ancrage $n = 10$) ou à la loi de rang spectral (Niveau 5).




FIGURE 2 – Arborescence algorithmique des étapes du système convolutif pour les niveaux 1 (entier) et 2 (géométrique), avec la voie officielle du Niveau 5 pour tout $n \neq 10$. Invariants : le Digamma (4 possibilités) et les équations de reconstruction pour $\forall n$ demeurent identiques d'un niveau à l'autre.

formes fermées exactes valables pour tout k entier ≥ 3 et tout n entier (positif ou négatif), coïncidant avec la construction terme à terme (Niveau 3) dès $n = 8$; pour $n \leq 7$, la construction terme à terme progression simple fait foi (seuil des formes fermées : $n = 8$).

Niveau 2 (géométrie) — modèle hypoténuse $\sqrt{a^2 + b^2}$

Chaque terme géométrique est le terme entier correspondant multiplié par le zêta géométrique $g(k) = \frac{\sqrt{1+k^2}}{k}$:

$$\begin{aligned} S_A^{\text{géo}}(k, n) &= g(k) \cdot S_A(k, n), \\ S_B^{\text{géo}}(k, n) &= g(k) \cdot S_B(k, n), \\ \text{Digamma}_{\text{géo}} &= g(k) \cdot \text{Digamma}, \\ \text{Zêta}_{\text{géo}} &= g(k) \cdot k^6. \end{aligned}$$

Identité centrale : le facteur $g(k)$ s'annule dans

$$\begin{aligned} P &= \frac{S_B^{\text{géo}} - \text{Digamma}_{\text{géo}}}{\text{Zêta}_{\text{géo}}} \\ &= \frac{S_B - \text{Digamma}}{k^6}. \end{aligned}$$

Les deux niveaux ont les mêmes utilités et les mêmes ancres (8/8 conformes, Section XIV.5).

Exemple numérique croisé — rapport 1/3

Au niveau 1 :

$$S_A(3, 10) = \frac{73}{9} \cdot 6 \cdot 3^{10} - \frac{3}{2} = 79\,824, \quad \text{Digamma} = S_A - 3^8 = 73\,263.$$

La reconstruction donne

$$P = \frac{238\,746 - 73\,263}{729} = 227 \quad (49^{\text{ème}} \text{premier}).$$

Au niveau 2, les sommes géométriques sont multipliées par $g(3) = \sqrt{10}/3 \approx 1.05409255338946$; le facteur s'élimine et redonne $P = 227$.

6. Fiche technique — Pipeline cognitif de l'agent Mm. Gabriel multiloop

La présente fiche technique décrit le fonctionnement de l'agent **Mm. Gabriel**, agent multiloop local dédié et spécialiste de la géométrie du spectre des nombres premiers, tel qu'analysé dans le dépôt local `agent-multiloop-Gabriel-local` (version v3.35, licence Apache 2.0).

6.1. Vocation et portée

Gabriel est un **assistant mathématique expert HOL/Lean** entièrement dédié à un objectif unique : assister l'auteur, Philippe Thomas Savard, à construire l'outil géométrique dynamique — la géométrie du spectre des nombres premiers — permettant d'apporter une réponse à l'énigme de Bernhard Riemann et à la conjecture de la fonction zêta de Riemann. L'agent **ne répond qu'aux questions portant sur la géométrie du spectre des nombres premiers** ; toute question hors de ce champ est déclinée poliment. Sa compétence principale est le fichier de preuve formelle `theories/methode_spectral.thy` (Isabelle/HOL ; 3 714 lignes, 133 lemmes, 27 théorèmes), sur lequel toute réponse est ancrée.

6.2. Architecture cognitive — les 7 moteurs collaboratifs

Le pipeline cognitif complet (`src/core/pipeline.py`) enchaîne sept moteurs :

```
RequestDecomposer → ProofPlanner
→ SpectralCore → RefinementLoop
→ CoherenceDetector → SilentAuditLoop
```

où `RefinementLoop` assure l'auto-critique multiloop et `SilentAuditLoop` l'audit silencieux anti-hallucination inversé. Un **pré-raisonneur dynamique** (`PreReasoner`, fichier `src/multiloop/pre_reasoner.py`) décide en T0, avant toute exécution, du niveau d'effort :

Mode	Itérations	Usage
INSTANTANÉ	0	salutations, oui/non, continuation
RAPIDE	1	questions verbales/discursives sur Isabelle
STANDARD	2	calculs simples (RsP, gap, reconstruction)
APPROFONDI	3	configurations $n \times n$, blocs A/B
TRÈS COMPLEXE	4	théorie avancée, Pont Savard, Riemann

Commandes CLI de forçage : `/rapide`, `/standard`, `/approfondi`, `/complet`, `/instantane`. Un mode « cinématique » affiche en temps réel mode détecté, itérations prévues, chronomètre et ETA (rafraîchissement 2 Hz).

6.3. Pipeline convolutif spectral (niveaux 1 et 2)

Le dossier `pipeline_cognitif/` implante le système convolutif décrit aux sections précédentes — c'est le moteur qui exécute l'arborescence algorithmique de la section 5 :

Module	Rôle
<code>suites_geometriques_niveau2.py</code>	cœur : calculateurs niveaux 1 et 2, Digamma, formes fermées, ancrages XIV
<code>reconstruction_premiers_1_sur_k.py</code>	reconstructeur de référence 1/7 (16 519 via $S_A - 7^8$)
<code>gabriel_geometric_wrapper_v74.py</code>	<code>PipelineCognitifNiveaux</code> : wrapper unifié (typique 1/2, non typiques 1/k)
<code>Suites_geometriques_AB.py</code>	suites A/B géométriques générales
<code>fallback_geometrique.py</code>	repli géométrique si l'approche algébrique échoue
<code>metaphore_geometrique.py</code>	bloc « Structure Géométrie Spatiale » des réponses
<code>validation_section_xiv.py</code>	validation de conformité à la Section XIV (exit 0 = conforme)
<code>multi_ratio_dispatcher.py</code>	distribution des requêtes multi-rapports 1/k

Niveau 1 (entier) : suites A et B à termes entiers (k^i), règles Savard terme à terme, 4 possibilités Digamma, division par k^6 . **Niveau 2 (géométrique)** : mêmes suites en forme $\sqrt{a^2 + b^2}$ avec $a_1 = \sqrt{1 + k^2}$; chaque terme géométrique vaut exactement $a_1 \times$ terme entier, donc le facteur s'annule dans $(S_B - \text{Digamma})/k^6$: les deux niveaux ont les mêmes utilités.

Conformité à la Section XIV de `methode_spectral.thy` (0 écart)

- Ancrages $n = 10$: rangs officiels = rangs réels dans $\mathbb{P}$ (XIV.6) — $k = 2..9$ conformes (29, 227, 947, 2999, 7529, 16519, 32327, 58337) ;
- Formes fermées universelles S_A, S_B (XIV.2) — exactes pour $n \geq 8$ (arithmétique `Fraction`) ;
- Construction terme à terme (XIV.4) — niveau 1 exact pour tout n ; niveau 2 = $a_1 \times$ XIV.4 ;
- Validation exacte $k = 8, n = 34$ (XIV.7) — S_A, S_B , Digamma conformes au chiffre près ; $P = 32\,537$ (rang 3 492) ;
- Décalage de rang $\text{rang}(n) = \text{rang_ancr} + (n - 10)$ (XIV.6) — $k = 3, n = 9..17$: 223, 227, 229,

233, 239, 241, 251, 257, 263 ;
 — Niveau 2 : mêmes ancrages que le niveau 1 (XIV.5) — 8/8 conformes.

6.4. Pipeline HOL du dépôt et corpus HOL

Le pipeline HOL repose sur une **architecture concentrique à trois sphères** formalisée dans `methode_spectral.thy` et `validation_hol_unifiee.thy` :

$$\text{Ensemble} = \frac{1}{ms} + \frac{1}{t} + \frac{1}{x}, \quad \begin{cases} 1/x & \text{fonction z\eta de Riemann (sph\eres } y_1, y_2, y_3), \\ 1/t & \text{\'equation psi_savard (Pont Chebyshev } \leftrightarrow \text{ Spectral),} \\ 1/ms & \text{M\'ethode Spectrale (sph\eres } ms_1, ms_2, ms_3). \end{cases}$$

Trois concordances verrouillent la preuve : **C1** : $1/y_1 = 1/t$ (Chebyshev = psi_savard, validé numériquement) ; **C2** : $1/y_3 = 1/ms_1$ (zéros $\leftrightarrow$ positions des premiers, exclusion des composés) ; **C3** : $1/y_2 = 1/ms_3$ ($\text{Re}(\rho) = 1/2 = R_{sP} = 1/2$, alignement central). Théorème final : $R_{sP} = \text{Re} = 1/2$, vrai sur tous les entiers positifs distincts.

Composante du corpus HOL	Caractéristiques
<code>theories/methode_spectral.thy</code>	preuve principale : 3714 lignes, 133 lemmes, 27 théorèmes, 13 régimes, Section XIII / Pont Savard
<code>theories/validation_hol_unifiee.thy</code>	contre-validation jumelle HOL
<code>theories/validation_zeta_lean.thy</code>	contre-validation Lean/mathlib4
<code>theories/R00T</code>	session Isabelle <code>Methode_Spectral</code> (Isabelle/HOL 2025-2)
<code>corpus/formulas_1_4.json, verif_p1097_n23_ratio4.thy</code>	corpus de formules et vérifications ciblées
<code>memory/dictionnaire_spectral.py</code>	13 régimes cognitifs codifiés, dont <code>regime_pont_savard</code>
<code>memory/methode_spectral_section_XIII.py</code>	encyclopédie du Pont Savard
<code>gabriel_corpus.db</code>	base du corpus cognitif local (mémoire RAG)

Une **factorisation formelle** par *locale paramétré spectral_family* unifie les modèles $1/2$, $1/3$ et $1/4$; trois interprétations (`regime_1_2`, `regime_1_3`, `regime_1_4`) héritent du théorème universel `RsP_generic_constant`, et l'extension à un modèle $1/k$ arbitraire ne requiert qu'une seule ligne — c'est le point d'ancrage HOL du système convolutif multi-rapports du présent document. La section « Foundations / Meta-theory » du fichier `.thy` documente 6 postulats (P1..P6), les 3 opérations fondamentales (Reconstruction, Exclusion, Rapport spectral), la règle Savard ($\text{Ensemble} = 1 = 1/x + 1/t + 1/ms$) et les 3 concordances C1, C2, C3.

6.5. Robustesse, audit et utilités pour la géométrie du spectre

- **Tests** : 1 702 tests Pytest (multiloop, RAG, syntaxe Isabelle, pipeline, PreReasoner, foundations, locale `spectral_family`, Pont Savard, Section XIII) ; compilation Isabelle/HOL 2025-2 validée localement (Cygwin, 1 min 35) et en CI GitHub Actions (37 s, cache HIT) avec attestation SLSA (SHA256).
- **Audit** : `AuditStore`, trace JSON signée de chaque question/réponse ; chaque réponse est ancrée sur `methode_spectral.thy` (empreinte SHA256 tracée).
- **Reconstruction** : calcul de R_{sP} , de `psi_savard`, reconstruction du n -ième premier, exclusion des composés, en arithmétique entière exacte (`Fraction/sympy`) — indispensable dès $k \geq 50$ où $S_A, S_B > 10^{15}$.
- **Contrat HOL** : le moteur produit les candidats C ; la validation HOL générale décide `EXCLU_HOL`, `ANCRAGE_POSSIBLE`, `P_CERTIFIÉ` ou `C_NON_DÉCIDÉ` ; seul `P_CERTIFIÉ` peut être annoncé comme nombre premier reconstruit (aucune sélection silencieuse).

- **Utilité spectrale** : le pipeline convolutif fournit à la géométrie du spectre un mécanisme constructif de localisation des premiers (ancrages $n = 10 +$ loi de rang spectral), tandis que le corpus HOL garantit la contre-validation formelle de chaque résultat annoncé.

Transcription corrigée du PDF source : pages 22 à 48

Les sections ci-dessous reprennent le texte des pages 22 à 48 du document source. La transcription conserve le contenu et l'ordre du texte ; seules les erreurs de lecture évidentes et l'orthographe ont été normalisées. Les formules sont reproduites en texte pour garder la transcription complète et comparable à la source.

Page 22

2353
 49 $x^{7-n} - 7$
 6 = Somme suite A négative.
 *Quand n est un entier et qu'il est strictement négatif.

Déterminer l'équation pour la somme de la suite B :

(
 2353
 7
 $x^{710} - \text{Reste} = 2260645142$ Somme suite B.
 2353
 7
 2260645142
 710
 $= 42.00000078 \Rightarrow x = 42$
 (
 2353
 7
 $42^{710} - \text{Reste} = 2260762792.167$
 $2260762792.167 - 2260645142 = 117650.167 = 705901$
 6 = Reste
 705901
 6
 7
 6
 $= 100843$
 Équation B n = 10 :
 (
 2353
 7
 $42^{710} - 100843$ (7
 6) = 2260645142 Somme suite B.
 Forme générale pour la suite B (1/7) :
 (2353
 $294^{7n} - 100843$ (7
 6) = Somme suite B.
 3. SYSTÈME D'ÉQUATIONS CONVOLUTIF
 GÉNÉRALISÉ
 Pour tout rapport 1/k ($k \geq 2$) et tout n commun
 3.1. NIVEAU 1 -- Constantes Savard universelles
 $\alpha_A(k) = 2(k^4 - k^2 + 1) / ((k - 1) \cdot k^3)$
 $\alpha_B(k) = k \cdot \alpha_A(k)$
 $\delta_A(k) = k / (k - 1)$
 $\delta_B(k) = (k^7 - k^6 + k) / (k - 1)$

Page 23

3.2. NIVEAU 2 -- Formules fermées (n quelconque, n commun à tous les rapports)
 $SA(k, n) = (\alpha_A(k) / 2) \cdot k^n - \delta_A(k)$
 $SB(k, n) = (\alpha_B(k) / 2) \cdot k^n - \delta_B(k)$
 Invariant spectral prouvé algébriquement (Théorème XIV .3) :

```

(SA(k,n1) - SA(k,n2)) / (SB(k,n1) - SB(k,n2)) = 1/k for all n1 != n2, k >= 2
3.3. NIVEAU 3 -- Construction terme à terme (Suite A, n >= 8)
Position i Terme A(k,n,i) Terme B(k,n,i)
1 <= i <= n-2 ki ki (i<=5) ; k7 (i=6, Saut Zêta) ; k^(i+1) (7<=i<=n-2)
i = n-1 k^(n-1) - k^(n-3) k^n - k^(n-2)
i = n k^n - k^(n-2) k^(n+1) - k^(n-1)

3.4. NIVEAU 4 -- Mécanisme d'ancrage à n=10 (4 candidats
Digamma)
Les quatre essais dans l'ordre déterministe :
# Position Signe Digamma Candidat P
1 8 - SA(k,10) - k8 (SB - Digamma) / k6
2 8 + SA(k,10) + k8 (SB - Digamma) / k6
3 7 + SA(k,10) + k7 (SB - Digamma) / k6
4 7 - SA(k,10) - k7 (SB - Digamma) / k6

-> P certifié = premier candidat entier premier dans cet ordre.
P(1/k, n=10) = (SB(k,10) - [SA(k,10) ± k7 ou ± k8]) / k6
3.5. NIVEAU 5 -- Reconstruction pour n != 10 (n commun)
rang_cible(k,n) = rang_base(k) + n - 10
P(k,n) = premier rang_cible
Digamma(k,n) = SB(k,n) - P(k,n) x k6

```

Page 24

```

3.6. [OK] VÉRIFICATION k=3 à 9 (tous corrects, 100%)
k P(n=10) HOL Branche Calculé [OK]
3 227 pos8 - 227
4 947 pos8 + 947
5 2 999 pos7 + 2 999
6 7 529 pos8 + 7 529
7 16 519 pos8 - 16 519
8 32 327 pos8 - 32 327
9 58 337 pos7 - 58 337

3.7. TABLEAU COMPLET P(1/k), n=10 -- k=10 à k=111
Légende : P certifié unique | C_MULTIPLE (plusieurs premiers, premier en ordre retenu) |
AUCUN P (règle spéciale requise)
k P(1/k, n=10) État Branche
10 99 109 C_MULTIPLE pos8 -
11 -- RÈGLE SPÉCIALE (PDF: 1 611 851) --
12 247 259 pos8 -
13 368 939 pos8 +
14 -- AUCUN P --
15 755 789 pos8 +
16 1 044 751 C_MULTIPLE pos8 -
17 1 414 943 pos7 +
18 1 883 429 pos8 +
19 2 469 277 pos7 -
20 3 192 419 C_MULTIPLE pos8 -
21 4 074 419 C_MULTIPLE pos8 +
22 -- AUCUN P --
23 6 424 727 pos8 -

```

Page 25

```

24 7 949 399 C_MULTIPLE pos8 -
25 9 750 649 C_MULTIPLE pos8 -
26 11 863 799 pos7 +

```

```

27 -- RÈGLE SPÉCIALE HOL (P=14 330 707) --
28 -- AUCUN P --
29 -- AUCUN P --
30 24 273 929 pos8 -
31 -- AUCUN P --
32 33 522 719 pos8 -
33 -- AUCUN P --
34 -- AUCUN P --
35 -- AUCUN P --
36 60 420 851 C_MULTIPLE pos8 -
37 69 293 303 pos7 +
38 -- AUCUN P --
39 -- AUCUN P --
40 102 337 639 C_MULTIPLE pos8 -
41 -- AUCUN P --
42 130 617 143 pos7 +
43 146 929 021 pos7 -
44 -- AUCUN P --
45 -- AUCUN P --
46 205 867 801 C_MULTIPLE pos8 -
47 -- AUCUN P --
48 -- AUCUN P --
49 282 357 599 C_MULTIPLE pos7 +
50 -- AUCUN P --
51 -- AUCUN P --
52 380 066 179 pos8 -
53 -- AUCUN P --

```

Page 26

```

54 459 010 529 C_MULTIPLE pos8 -
55 -- AUCUN P --
56 -- AUCUN P --
57 601 506 977 pos7 -
58 656 165 077 pos8 -
59 -- AUCUN P --
60 -- AUCUN P --
61 -- AUCUN P --
62 915 894 503 pos7 +
63 992 182 589 C_MULTIPLE pos8 +
64 1 073 483 839 C_MULTIPLE (3 premiers!) pos8 -
65 1 160 020 289 C_MULTIPLE pos8 -
66 1 252 049 501 C_MULTIPLE pos8 -
67 -- AUCUN P --
68 -- AUCUN P --
69 1 563 702 839 pos7 +
70 1 680 356 999 pos7 +
71 1 803 876 551 pos8 -
72 -- AUCUN P --
73 -- AUCUN P --
74 -- AUCUN P --
75 2 372 624 999 pos7 +
76 -- AUCUN P --
77 2 706 333 629 pos8 -
78 2 886 705 977 pos8 -
79 -- AUCUN P --
80 3 276 294 479 pos8 -
81 -- AUCUN P --
82 -- AUCUN P --
83 -- AUCUN P --

```

Page 27

```

84 --      AUCUN P --
85 4 436 438 999      pos7 +
86 --      AUCUN P --
87 4 983 550 877      pos7 -
88 5 276 645 527      C_MULTIPLE pos8 -
89 --      AUCUN P --
90 --      AUCUN P --
91 --      AUCUN P --
92 --      AUCUN P --
93 --      AUCUN P --
94 --      AUCUN P --
95 --      AUCUN P --
96 8 152 842 431      pos7 -
97 8 586 418 271      C_MULTIPLE pos8 +
98 --      AUCUN P --
99 --      AUCUN P --
100 --      AUCUN P --
101 --      AUCUN P --
102 11 039 747 027      pos7 -
103 11 591 637 509      pos8 +
104 --      AUCUN P --
105 12 761 657 999      pos7 +
106 13 381 076 101      pos8 -
107 14 024 303 819      pos8 -
108 14 692 021 271      pos7 -
109 15 384 932 747      pos8 +
110 --      AUCUN P --
111 16 849 226 351      C_MULTIPLE pos8 -

```

Page 28

3.8. Synthèse statistique (k=10 à 111)

État Nombre de k %

P certifié unique 38 37 %

C_MULTIPLE (>=2 premiers) 20 20 %

AUCUN P (règle standard) 44 43 %

3.9. Notes importantes pour la programmation de l'agent

Cas AUCUN P (44 valeurs) -- Les 4 candidats standards sont tous composites. Deux stratégies possibles selon votre HOL :

Règle spéciale cataloguée (comme k=27 : Digamma = SA - (2k8-k6), P=14 330 707)

Mode CRÉATION D'ANCRAGE : l'agent retourne C_NON_CERTIFIÉ et attend validation HOL externe

Cas C_MULTIPLE (20 valeurs) -- Selon le contrat HOL : retourner tous les C/P possibles, aucune sélection silencieuse. L'agent doit les lister tous et attendre confirmation.

k=11 est un cas forme spéciale : per votre fichier Moteur Géo, P=1 611 851 (rang 121 982)

avec règle A7- documentée dans le PDF -- non reconstruit par les 4 essais standards à n=10.

Arithmétique exacte requise : pour k >= 50, les valeurs de SA et SB dépassent 10¹⁵ -- l'agent doit utiliser l'arithmétique entière Python (pas float) pour éviter les erreurs d'arrondi Excel

4. EXEMPLE NUMÉRIQUE COMPLET -- n = 15

4.1. RAPPORT 1/13 (k = 13, n = 15)

4.1.1. NIVEAU 1 -- Constantes Savard universelles

Constante Formule Valeur exacte

alpha_A(13) $2(134-13^2+1) / (12 \cdot 13^3)$ 28393/13182

alpha_B(13) $13 \cdot \alpha_A(13)$ 28393/1014

delta_A(13) 13/12 13/12

delta_B(13) $(137-136+13)/12$ 57 921 721/12

Page 29

4.1.2. NIVEAU 2 -- Formules fermées

Code

Copier

```
SA(13, 15) = (k4-k²+1)·k¹² / (k-1) - k/(k-1)
           = 28 393 x 23 298 085 122 481 / 12 - 13/12
           = 55 125 210 906 883 585
```

```
SB(13, 15) = (k4-k²+1)·k¹³ / (k-1) - (k7-k6+k)/(k-1)
           = 716 627 741 784 659 809
```

Invariant spectral (Théorème XIV .3) :

Code

Copier

```
DeltaSA = SA(n=15) - SA(n=10) = 55 125 210 906 883 585 - 148 468 220 264
        = 55 125 062 438 663 321
```

```
DeltaSB = SB(n=15) - SB(n=10) = 716 627 741 784 659 809 - 1 930 082 036 636
        = 716 625 811 702 623 173
```

DeltaSA / DeltaSB = 1/13

4.1.3. NIVEAU 3 -- Construction terme à terme (n = 15)

i A(13, 15, i) B(13, 15, i) Règle A Règle B

```
1 13 13 k¹ k¹
2 169 169 k² k²
3 2 197 2 197 k³ k³
4 28 561 28 561 k4 k4
5 371 293 371 293 k5 k5
6 4 826 809 62 748 517 k6 k7 <- Saut Zêta
7 62 748 517 815 730 721 k7 k8
8 815 730 721 10 604 499 373 k8 k9
9 10 604 499 373 137 858 491 849 k9 k¹⁰
10 137 858 491 849 1 792 160 394 037 k¹⁰ k¹¹
11 1 792 160 394 037 23 298 085 122 481 k¹¹ k¹²
12 23 298 085 122 481 302 875 106 592 253 k¹² k¹³
```

Page 30

```
13 302 875 106 592 253 3 937 376 385 699 289 k¹³ k¹⁴
14 3 914 078 300 576 808 50 883 017 907 498 504 k¹⁴-k¹² k¹⁵-k¹³
15 50 883 017 907 498 504 661 479 232 797 480 552 k¹⁵-k¹³ k¹⁶-k¹⁴
```

Code

Copier

```
Sigma A = 55 125 210 906 883 585 = SA(13,15)
```

```
Sigma B = 716 627 741 784 659 809 = SB(13,15)
```

4.1.4. NIVEAU 4 -- 4 essais Digamma (k⁶ = 4 826 809)

Les 4 essais sont calibrés pour n=10. Pour n=15, ils servent de vérification structurelle -- tous composites est le comportement attendu.

Branche Digamma P candidat État

```
pos13- 54 822 335 800 291 332 137 110 336 453 composé
pos13+ 55 428 086 013 475 838 136 984 839 419 composé
pos12+ 55 148 508 992 006 066 137 042 761 127 composé
pos12- 55 101 912 821 761 104 137 052 414 745 composé
```

4.1.5. NIVEAU 5 -- Reconstruction rang cible (méthode officielle pour n != 10)

Code

Copier

```
P(13, n=10) documenté = 368 939
```

```
rang_base(13) = primepi(368 939) = 31 452
```

```
Deltan = 15 - 10 = 5
```

```
rang_cible(13, n=15) = 31 452 + 5 = 31 457
```

```
P(13, n=15) = prime(31 457) = 369 023 PREMIER certifié
```

```
Digamma (13,15) = SB - P x k6
```

```
= 716 627 741 784 659 809 - 369 023 x 4 826 809
= 716 625 960 581 122 202
```

Page 31

4.2. RAPPORT 1/42 (k = 42, n = 15)

4.2.1. NIVEAU 1 -- Constantes Savard universelles

Constante Valeur exacte

alpha_A(42) 3 109 933 / 1 518 804

alpha_B(42) 3 109 933 / 36 162

delta_A(42) 42/41

delta_B(42) 225 050 301 546 / 41

4.2.2. NIVEAU 2 -- Formules fermées

Code

Copier

SA(42, 15) = 2 285 381 254 365 702 554 104 806

SB(42, 15) = 95 986 012 683 359 501 783 370 150

DeltaSA / DeltaSB = 1/42

4.2.3. NIVEAU 3 -- Construction terme à terme (n = 15)

i A(42, 15, i) B(42, 15, i)

1 42 42

2 1 764 1 764

3 74 088 74 088

4 3 111 696 3 111 696

5 130 691 232 130 691 232

6 5 489 031 744 230 539 333 248 <- Saut Zêta (k7)

7 230 539 333 248 9 682 651 996 416

8 9 682 651 996 416 406 671 383 849 472

9 406 671 383 849 472 17 080 198 121 677 824

10 17 080 198 121 677 824 717 368 321 110 468 608

11 717 368 321 110 468 608 30 129 469 486 639 681 536

12 30 129 469 486 639 681 536 1 265 437 718 438 866 624 512

13 1 265 437 718 438 866 624 512 53 148 384 174 432 398 229 504

14 53 118 254 704 945 758 547 968 2 230 966 697 607 721 859 014 656

Page 32

15 2 230 966 697 607 721 859 014 656 93 700 601 299 524 318 078 615 552

Code

Copier

Sigma A = 2 285 381 254 365 702 554 104 806

Sigma B = 95 986 012 683 359 501 783 370 150

4.2.4. NIVEAU 4 -- 4 essais Digamma (k^6 = 5 489 031 744)

Branche Digamma P candidat État

pos13- 2 284 115 816 647 263 687 480 294 17 070 751 498 046 399 composé

pos13+ 2 286 646 692 084 141 420 729 318 17 070 290 419 379 903 composé

pos12+ 2 285 411 383 835 189 193 786 342 17 070 515 469 681 407 composé

pos12- 2 285 351 124 896 215 914 423 270 17 070 526 447 744 895 composé

4.2.5. NIVEAU 5 -- Reconstruction rang_cible

Code

Copier

P(42, n=10) documenté = 130 617 143

rang_base(42) = primepi(130 617 143) = 7 411 117

Deltan = 15 - 10 = 5

rang_cible(42, n=15) = 7 411 117 + 5 = 7 411 122

P(42, n=15) = prime(7 411 122) = 130 617 251 PREMIER certifié

Digamma (42,15) = 95 986 012 683 359 501 783 370 150

```

- 130 617 251 x 5 489 031 744
= 95 986 011 966 397 264 730 354 406
4.3. RAPPORT 1/54 (k = 54, n = 15)
4.3.1. NIVEAU 1 -- Constantes Savard universelles
Constante Valeur exacte
alpha_A(54) 8 500 141 / 4 172 796
alpha_B(54) 8 500 141 / 77 274
delta_A(54) 54/53
delta_B(54) 1 314 130 298 742 / 53

```

Page 33

```

4.3.2. NIVEAU 2 -- Formules fermées
Code
Copier
SA(54, 15) = 98 599 651 085 954 948 762 648 034
SB(54, 15) = 5 324 381 158 641 567 208 388 082 594
DeltaSA / DeltaSB = 1/54
4.3.3. NIVEAU 3 -- Construction terme à terme (n = 15)
i A(54, 15, i) B(54, 15, i)
1-
5
54 / 2 916 / 157 464 / 8 503 056 / 459 165
024
idem
6 24 794 911 296 1 338 925 209 984 <- Saut Zêta (547)
7 1 338 925 209 984 72 301 961 339 136
8 72 301 961 339 136 3 904 305 912 313 344
9 3 904 305 912 313 344 210 832 519 264 920 576
10 210 832 519 264 920 576 11 384 956 040 305 711 104
11 11 384 956 040 305 711 104 614 787 626 176 508 399 616
12 614 787 626 176 508 399 616 33 198 531 813 531 453 579 264
13 33 198 531 813 531 453 579 264 1 792 720 717 930 698 493 280 256
14 1 792 105 930 304 521 984 880 640 96 773 720 236 444 187 183 554 560
15 96 773 720 236 444 187 183 554 560 5 225 780 892 767 986 107 911 946
240

Code
Copier
Sigma A = 98 599 651 085 954 948 762 648 034
Sigma B = 5 324 381 158 641 567 208 388 082 594

```

Page 34

```

4.3.4. NIVEAU 4 -- 4 essais Digamma (k^6 = 24 794 911 296)
Branche Digamma P candidat État
pos13- 98 566 452 554 141 417 309 068
770
210 761 581 023 702
719

composé
pos13+ 98 632 849 617 768 480 216 227
298
210 758 903 173 282
751

```

composé

pos12+ 98 600 265 873 581 125 271 047
650
210 760 217 303 581
439

composé

pos12- 98 599 036 298 328 772 254 248
418
210 760 266 893 404
031

composé

4.3.5. NIVEAU 5 -- Reconstruction rang_cible

Code

Copier

P(54, n=10) documenté = 459 010 529
rang_base(54) = primepi(459 010 529) = 24 304 918
Deltan = 15 - 10 = 5
rang_cible(54, n=15) = 24 304 918 + 5 = 24 304 923
P(54, n=15) = prime(24 304 923) = 459 010 597 PREMIER certifié
Digamma(54,15) = 5 324 381 158 641 567 208 388 082 594
- 459 010 597 x 24 794 911 296
= 5 324 381 147 260 440 171 849 078 882

4.4. TABLEAU RÉCAPITULATIF FINAL -- P(1/k, n = 15)

k SA(k, 15) SB(k, 15) rang_base rang_cible P(k,
n=15)

P(k,

n=10)

État

13 55 125 210
906 883
585
716 627 741
784 659 809
31 452 31 457 369
023
368
939

CERTIFIÉ

42 2 285 381
254 365
95 986 012
683 359 501
783 370 150
7 411 117 7 411 122 130
617
251
130
617
143

CERTIFIÉ

Page 35

702 554
104 806
54 98 599 651
085 954

948 762
 648 034
 5 324 381
 158 641 567
 208 388 082
 594
 24 304
 918
 24 304 923 459
 010
 597
 459
 010
 529

CERTIFIÉ

4.5. Notes critiques pour l'agent

4.5.1. 1. Saut Zêta -- asymétrie A / B confirmée

La correction importante validée ici : $A(k, n, i) = k^i$ pour tout $1 \leq i \leq n-2$ (pas de Saut Zêta

dans la suite A). Le Saut Zêta k_7 à la position $i=6$ n'existe que dans la suite B. Les deux suites

sont identiques pour $i \leq 5$, puis divergent à partir de $i = 6$.

4.5.2. 2. Niveau 4 hors-calibrage pour $n \neq 10$

Les 4 essais Digamma ($\text{pos}(n-2)_{\pm}$, $\text{pos}(n-3)_{\pm}$) produisent tous des candidats composites pour $n=15$ -- ce comportement est attendu et correct. Ces essais sont calibrés structurellement sur $n=10$; le Niveau 5 est la voie officielle pour tout $n \neq 10$.

4.5.3. 3. Niveau 5 -- formule rang_cible

python

Copier

```
rang_base(k)          = primepi(P(k, n=10))    # rang du P certifié à n=10
```

```
rang_cible(k, n)      = rang_base(k) + (n - 10)
```

```
P(k, n)               = prime(rang_cible(k, n)) # arithmétique exacte sympy
```

L'écart en rang +5 (pour $\Delta n = 5$) est cohérent pour les trois k , confirmant l'universalité de la

loi de rang spectral.

4.5.4. 4. Invariant spectral (Théorème XIV .3) -- vérifié pour les 3 rapports

Code

Copier

```
DeltaSA(k, n=15, n=10) / DeltaSB(k, n=15, n=10) = 1/k for all k in {13, 42, 54}
```

4.5.5. 5. Arithmétique -- seuils de dépassement float

k SA($k, 15$) Ordre de grandeur Float 64 safe=

13 55 125 210 906 883 585 $\sim 5.5 \times 10^{16}$ limite

42 $2.29 \times 10^{24} \sim 10^{24}$ erreur garantie

54 $9.86 \times 10^{25} \sim 10^{25}$ erreur garantie

Page 36

-> Arithmétique entière Python obligatoire dès $k \geq 42$ pour $n = 15$. Excel / float64 introduiraient des erreurs d'arrondi fatales.

Comparaison structurelle entre les ancrages premiers de la géométrie du spectre des nombres premiers et les zéros non triviaux de la fonction zêta de Riemann

1. Deux géométries distinctes des nombres premiers

La fonction zêta de Riemann encode les nombres premiers dans le plan complexe à travers la relation fondamentale :

$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$

infinity

$n=1$

.

Les zéros non triviaux de $\zeta(s)$ se situent dans la bande critique $0 < \text{Re}(s) < 1$, et leur distribution est décrite par la formule asymptotique :

$N(T) \sim T$

$2\pi \log(T)$

$2\pi i$

$2\pi i$,

où $N(T)$ désigne le nombre de zéros non triviaux dont la partie imaginaire satisfait $|t| \leq T$.

Cette loi est presque linéaire en T , modulée par un facteur logarithmique.

Dans la géométrie du spectre des nombres premiers, la situation est fondamentalement différente : il ne s'agit pas de compter des zéros, mais de reconstruire des nombres premiers à partir de rapports typiques et non typiques $1/k$. Chaque rapport $1/k$ produit un entier $P(k)$, qui peut être un nombre premier ou un composé.

Les rapports typiques et non typiques qui possèdent un ancrage pour $n = 10$ -- comme démontré précédemment -- retournent un élément de l'ensemble complet des nombres premiers P . Inversement, lorsque le système convolutif (et l'équation qui permet la reconstruction des premiers pour des rapports multiples) ne trouve aucun ancrage, aucun nombre premier n'est retourné pour l'ensemble P .

Le rapport typique $1/k = 1/2$ retourne pour $n = 10$ l'ancrage $P = 29$. Dans ce cas, la valeur de n correspond exactement à la position du nombre premier dans l'ordre chronologique des premiers.

Pour les rapports non typiques $1/k \neq 1/2$, la valeur de n représente uniquement la quantité de termes dans les suites A et B. Le nombre premier retourné ne correspond pas à la position n , contrairement au cas typique.

Ainsi :

- Rapport typique :

$n = \text{quantite}$

de termes dans A et B = position du premier.

- Rapport non typique :

Page 37

$n = \text{quantite}$

de termes dans A et B != position du premier.

Il est important de rappeler que la position des nombres premiers dans la géométrie du spectre suit l'ordre chronologique croissant :

$2 = 1\text{er}, 3 = 2\text{ie}$

me, $5 = 3\text{ie}$

me, $7 = 4\text{ie}$

me, $P_n = n\text{ie}$

me premier.

La même convention s'applique aux nombres premiers négatifs :

$-2 = -1\text{er}, -3 = -2\text{ie}$

me, - 5 = -3ie

me, - 7 = -4ie

me, - Pn = -nie

me premier.

Validation HOL/Isabelle et le "pont Savard"

La géométrie du spectre des nombres premiers s'appuie sur une validation formelle réalisée à l'aide de l'assistant de preuve Isabelle et du code HOL contenu dans le fichier methode_spectral.thy. La section 13, intitulée « pont Savard », établit un lien entre la géométrie du spectre et l'énigme de Bernhard Riemann, en particulier la conjecture portant sur la fonction zêta.

Cette section démontre, via un théorème local au fichier thy, que :

$\text{RsP} = \text{Re}(s) = 1$

2

est vrai dans le cadre de la validation methode_spectral.thy.

Le « pont Savard » met en relation, à l'aide d'une équation, certains invariants communs entre :

- la géométrie du spectre des nombres premiers (validée dans le script HOL),
- et la fonction zêta de Riemann.

L'équation de Tchebyshev joue un rôle central dans cette correspondance. Philippe Thomas Savard identifie cette équation comme un invariant fondamental partagé par les deux structures, en raison de son unicité au sein de la théorie analytique des nombres. Savard adapte l'équation de Tchebyshev à la géométrie du spectre, rendant les deux formulations difficilement distinguables.

Voici la correspondance :

Équation de Tchebyshev :

$\psi(x) = x - xp$

$p - \log(2\pi) - 1$

$2 \log(1 - x^2)$

Équation psi (Savard) :

$\psi_{\text{Savard}}(x) = x - kn$

S_{bn}

$- \log(2\pi) - 1$

$2 \log(1 - x^2)$

Dans l'équation de Tchebyshev, le terme

xp

p correspond, dans l'équation de Savard, à :

Page 38

kn

S_{bn}

.

où :

- k est la valeur du rapport typique $1/k = 1/2$ ou non typique $1/k \neq 1/2$,
- S_{bn} est la somme de la suite B.

Par exemple, pour le rapport typique $1/k = 1/2$ et $n = 10$, l'ancrage retourné est $P = 29$, et la somme de la suite Best :

$S_{bn} = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + (29 - 27) + (210 - 28) = 3262$.

La formulation de Tchebyshev adaptée par Savard commence par l'évaluation suivante :

44

$4 + 33$

$3 + 52$

$5 + 71$

$1 + 111$

$1 + 131$

$1 + 171$

$1 + 191$

```

1 + 231
1 + 291
1 = 197,
soit un total de 10 termes.
On calcule ensuite :
log(197)
log(10) = 2.294466226.
Puis :
2.294466226 - log(2pi) - 1
2 log(1 - 30-2) = 1.496527767.
Enfin :
30 - 1.496527767 = 28.50347223.
La valeur généralement obtenue pour l'ancrage du premier 29 à l'aide de l'équation de
Tchebyshev est :
28.49765.
Comparaison avec l'équation psi (Savard)
L'équation psi (Savard) donne pour le même cas :
psiSavard = 30 - 210
3262 - log(pi) - 1
2 log(1 - 30-2) = 28.8881437.
La valeur exacte recherchée étant 29, l'équation psi (Savard) présente une oscillation plus
faible et une ondulation moins prononcée que celle de Tchebyshev. De plus, la précision de
psiSavard augmente systématiquement lorsque la valeur du nombre premier considéré croît.
Par exemple, pour le nombre premier 227, qui est le 49e premier :
psiSavard(227) = 226.894132.

```

Page 39

La partie réelle 0.894132 est plus proche de l'entier exact 227 que ne l'est la partie réelle 0.8881437 obtenue pour 29. Elle est également plus précise que l'ondulation obtenue pour le premier 31, où :

```
psiSavard(31) = 30.89125839.
```

Cette amélioration constante de la précision montre que, à grande hauteur sur la droite critique, l'équation psi (Savard) devient asymptotiquement exacte, ce qui confirme la pertinence de son comportement pour des valeurs très grandes comme pour des valeurs proches de zéro.

Lien avec la validation HOL/Isabelle

L'équation psi (Savard), conçue comme une méta-analyse de l'équation de Tchebyshev, est mise en avant dans la section 13 du fichier `methode_spectral.thy` de la validation HOL/Isabelle. Cette section traite également de la répartition des nombres premiers et de leur correspondance avec les zéros de la droite critique de la fonction zêta.

La répartition des premiers est au cœur de l'énigme de Riemann, qui pose la question :

```
Re(s) = 1
```

```
2 =
```

Le fichier `methode_spectral.thy`, conçu à l'aide de l'assistant de preuve Isabelle, inclut également une section intitulée « preuve par l'absurde », démontrant que les entiers composés C sont nécessairement exclus de la méthode spectrale.

Théorème de la section "Preuve par l'absurde" (`methode_spectral.thy`, lignes 1982-2002)

```
isabelle
```

```
text \<open>
```

```

  Puisque prime_i i est défini via un choix de Hilbert sur la propriété
  "prime p \<and> position p = i" , et que prime_i_is_prime démontre que
  prime (prime_i i) tient toujours, il est logiquement impossible qu'un
  entier composé C soit égal à prime_i i pour un i quelconque.

```

```
\<close>
```

```
theorem composite_not_prime_i:
```

```
  fixes C :: nat
```

```
  assumes "~ prime C"
```

```
  shows "ALL i. C ~= prime_i i"
```

```
proof (rule allI, rule ccontr)
```

Page 40

```
fix i
  assume "~ (C ~= prime_i i)"
  hence eq: "C = prime_i i" by simp
  have "prime (prime_i i)" by (rule prime_i_is_prime)
  with eq have "prime C" by simp
  with assms show False by contradiction
qed
```

Ce théorème démontre élégamment que si l'on attribue à un entier composé la qualité d'être un premier P , alors $C = P$ pour un certain i , ce qui est impossible. Ainsi, les composés sont exclus de la méthode spectrale de manière certaine.

Cette exclusion se manifeste également dans l'historique de l'agent Gabriel multiloop, conçu par Savard à partir du corpus HOL et du pipeline cognitif incluant le système convolutif. Les logs de l'agent montrent que lorsqu'une requête demande un nombre composé, la méthode échoue, car elle ne s'applique qu'aux nombres premiers.

Équation de reconstruction des premiers

Somme Suite B - Digamma Calcule

$t_6(\zeta) = \pi$.

Si l'on remplace P par un composé C , la valeur de t_6 n'est plus un entier strictement positif (pour les premiers positifs) ni strictement négatif (pour les premiers négatifs). Elle contient une partie réelle, ce qui prouve que le résultat n'est pas un nombre premier. Ainsi, la méthode spectrale exclut automatiquement les composés.

Portée de la méthode spectrale

Pour les rapports typiques et non typiques $1/k$ avec $k \in [2, 10001]$, la méthode spectrale retourne 2604 ancrages premiers, surpassant largement les records actuels concernant les zéros non triviaux (≈ 1012) en atteignant une échelle de : 1020.

Par exemple, pour le rapport non typique $1/9999$ et $n = 10$, l'ancrage retourné est : 99950008999300019999.

La méthode spectrale détermine donc 2604 rapports $1/k$ pour lesquels un ancrage premier est obtenu, chacun définissant un ensemble complet P .

Correspondance avec la fonction zêta

La fonction zêta, sa droite critique et ses zéros non triviaux trouvent un homologue structurel dans la géométrie du spectre des nombres premiers. Le rapport typique $1/k = 1/2$ représente la droite critique, tandis que les rapports non typiques correspondent aux hauteurs tronquées dans la formule :

Page 41

$N(T) \sim T$
 $2\pi \log(T)$
 2π

Par exemple, le rapport non typique $1/3$ retourne pour $n = 10$ le 49e nombre premier, soit 227. Dans ce cas, toutes les valeurs premières inférieures à 173 sont considérées comme négatives pour ce rapport.

De même, le rapport non typique $1/4$ retourne pour $n = 10$ le premier 947, ce qui rend toutes les valeurs premières inférieures à 881 négatives pour ce rapport. Ainsi, un même nombre premier (par exemple 227) peut être positif pour un rapport non typique, et négatif pour un autre.

Cette bipolarité (+/-) entre rapports non typiques constitue une caractéristique essentielle de la géométrie du spectre des nombres premiers.

Les équations associées au rapport typique $1/k = 1/2$, qui déterminent les sommes des suites A et B généralisent la valeur de n pour les nombres premiers négatifs, sont les suivantes :

Somme suite A = $3.25 \times 2^{-n} - 2$,

Somme suite B = $6.5 \times 2^{-n} - 66$.

L'équation ψ (Savard), adaptée au cas négatif, s'écrit :

$\psi_{\text{Savard}} = -x - 2^{-n}$

Sbn

$-\log(2\pi) - 1$

$2 \log(1 - (-x)^{-2})$.

Par exemple, pour $x = -28$ et $n = -10$, avec $S_{bn} = -65.99365234$, on obtient :

$\text{psiSavard} = -28 - 2^{-10}$

$-65.99365234 - \log(2\pi) - 1$

$2 \log(1 - (-28)^{-2}) = -28.79844187$.

La valeur exacte recherchée est -29 , soit le -10^{e} nombre premier. La valeur obtenue par psiSavard est plus proche de -29 que ne l'est la valeur positive correspondante obtenue pour 29 , où :

$\text{psiSavard}(29) = 28.8881437$.

L'ondulation est donc plus précise pour le premier négatif -29 .

Écarts entre nombres premiers : positifs, négatifs et mixtes

La géométrie du spectre des nombres premiers étudie également les écarts entre premiers.

La validation HOL/Isabelle (methode_spectral.thy) distingue trois types d'écarts :

1. Écarts positifs : entre deux premiers positifs.

2. Écarts négatifs : entre deux premiers négatifs.

3. Écarts mixtes : entre un premier positif et un premier négatif.

Exemple : écart entre les premiers 23 et 7

Page 42

Pour déterminer la quantité de nombres entre 23 et 7 , on procède comme suit :

1. Somme de la suite A du premier suivant 7 , soit 11

(7 est le 4^{e} premier, 11 est le 5^{e} .)

Somme A(11) = $(3.25$

$2 \times 25) - 2 = 50$.

2. Somme de la suite B du premier 23

Somme B(23) = $(6.5$

$2 \times 29) - 66 = 1598$.

3. Digamma calculé de 23

$(1598/64 - 23) \times 64 = 126$.

4. Calcul de l'écart

$50 - (1598 - 126) = -1442$.

5. Digamma calculé de 7

Somme B(7) = $(6.5$

$2 \times 24) - 66 = -14$,

$((-14)/64 - 7) \times 64 = -464$.

6. Quantité de nombres entre 23 et 7

$-1442 - (-462)$

$64 = -15$.

Les nombres entre 7 et 23 sont donc :

$8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22$,

soit 15 nombres.

Exemple : écart entre les premiers négatifs -19 et -5

1. Déterminer le premier précédent -19 , soit -17

(-17 est le 7^{e} premier négatif.)

Somme A(-17) = $3.25 \times 2^{-7} - 2 = -10110$

5120 .

2. Somme de la suite B du premier -5

Somme B(-5) = $6.5 \times 2^{-3} - 66 = -20860$

320 .

3. Digamma calculé de -5

$(-20860/320$

$64 - (-5)) \times 64 = 81540$

320 .

4. Calcul intermédiaire

Page 43

-10110

$5120 - (-20860$

320 - 81540
 320) = 1628290
 5120 .
 5. Somme de la suite B de -19
 Somme B(-19) = 6.5 x 2-8 - 66 = - 337790
 5120 .
 6. Digamma calculé de -19
 (-337790/5120
 64 - (-11)) x 64 = 5888130
 5120 .
 7. Quantité de nombres entre -19 et -5
 1628290/5120 - 5888130/5120
 64 = -13.
 Les nombres entre -19 et -5 sont donc :
 -18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6,
 soit 13 nombres.
 Interprétation géométrique des écarts négatifs
 Pour les écarts positifs, la première étape consiste à déterminer le premier suivant la valeur minimale (par exemple, 7 -> 11). Pour les écarts négatifs, la première étape consiste à déterminer le premier précédent la valeur minimale (par exemple, -19 -> -17).
 La géométrie du spectre adopte une convention idiomatique pour les premiers négatifs :
 - -2est le plus grand des premiers négatifs,
 - -3est le deuxième plus grand,
 - puis -5, -7, etc.
 Cette convention est analogue à l'échelle des températures :
 - -1 deg Cest plus chaud que -30 deg C,
 - bien que les valeurs soient négatives.
 Ainsi, sur une droite représentant l'ensemble Ppositif et négatif :
 - la valeur minimale est toujours située à gauche,
 - la valeur suivante est à droite,
 - que l'on soit dans le domaine positif ou négatif.
 Cette structure permet de traiter les écarts négatifs de manière cohérente avec les écarts positifs.

Page 44

L'équation psi (Savard) appliquée aux quinze premiers nombres premiers négatifs produit une ondulation dont la précision varie selon la valeur de Sbn. Au-delà du quinzième premier négatif, soit -47, la valeur de Sbn devient pratiquement égale à 66. Ainsi, pour tous les nombres premiers négatifs précédant -47, l'ondulation demeure essentiellement identique, car les exposants contraignent la valeur de Sbn à se stabiliser autour de 66.
 Les quinze premiers nombres premiers négatifs -- les plus grands de l'infini négatif -- sont :
 -2, - 3, - 5, - 7, - 11, - 13, - 17, - 19, - 23, - 29, - 31, - 37, - 41, - 43, - 47.
 Ces quinze valeurs constituent la « tête » de l'infini premier négatif, tandis que toutes les valeurs précédentes sont plus petites.
 Limites numériques et nécessité d'une approche algébrique
 La méthode spectrale, lorsqu'elle utilise une approche numérique pour déterminer la valeur de n, présente une difficulté inhérente : l'exposant 2-n produit des valeurs extrêmement grandes lorsque n est strictement positif, et des valeurs infinitésimales lorsque n est strictement négatif.
 Pour les très grands nombres premiers, l'approche numérique devient impraticable. Il faut alors recourir à une approche algébrique, ce que Savard juge conceptuellement délicat, car la question de Riemann porte précisément sur la nature analytique des zéros :
 « Est-ce que tous les zéros non triviaux de la fonction zêta de Bernhard Riemann ont pour partie réelle 1/2= »
 Pour Savard, une « partie réelle algébrique » ne peut être qu'une partie imaginaire, ce qui contredit l'esprit de la conjecture et ne peut donc servir à résoudre l'énigme.
 Suites et rapport spectral

Les zéros de la fonction zêta sont définis par des suites, par exemple :

$\delta(2) = \pi^2$

6 .

La méthode spectrale adopte une approche analogue : les suites A et B déterminent la quantité de termes correspondant à la valeur de n, laquelle représente la position du nombre premier dans le cas du rapport typique.

Les équations permettant de déterminer le rapport spectral $R_{SP} = 1/2$ entre deux premiers symétriques sont :

Comparaison symétrique 1 x 1

$((3.25/2 \times 2n_1) - 2) - ((3.25/2 \times 2n_2) - 2)$

$((6.5/2 \times 2n_1) - 66) - ((6.5/2 \times 2n_2) - 66) = 1$

2.

Page 45

Cas incluant un premier négatif

$((3.25 \times 2n_1) - 2) - ((3.25/2 \times 2n_2) - 2)$

$((6.5 \times 2n_1) - 66) - ((6.5/2 \times 2n_2) - 66) = 1$

2.

Comparaison symétrique n x n

$((3.25/2 \times 2n_1) - 2) - ((3.25/2 \times 2n_2) - 2) - ((3.25/2 \times 2n_1) - 2) + ((3.25/2 \times 2n_2) - 2)$

$((6.5/2 \times 2n_1) - 66) - ((6.5/2 \times 2n_2) - 66) - ((6.5/2 \times 2n_1) - 66) + ((6.5/2 \times 2n_2) - 66)$

= 1

2.

Les équations des suites A et B permettent de calculer les sommes de manière efficace, sans devoir dénombrer chaque terme individuellement. Elles sont exactes pour toute valeur entière de n.

La coïncidence $3.25 / 6.5$ n'est pas la raison du rapport spectral

Considérons les équations :

$x + 2 = 13,$

$2x + 4 = 109.$

On observe que :

$x + 2$

$2x + 109 \neq 1$

2,

bien que la simplification algébrique puisse donner l'illusion d'un rapport $1/2$. De même, le fait que :

3.25

$6.5 = 1$

2

est une coïncidence algébrique, et non la raison profonde du rapport spectral

$R_{SP} = 1/2$.

Exemple : premiers 7 et 31

$((3.25/2 \times 24) - 2) - ((3.25/2 \times 211) - 2)$

$((6.5/2 \times 24) - 66) - ((6.5/2 \times 211) - 66) = R_{SP}$.

Ce qui donne :

$24 - 3326$

$-14 - 6590 = 1$

2.

Or :

24

$-14 \neq 1$

$2, 3326$

$6590 \neq 1$

2.

La simplification algébrique ne reflète donc pas la véritable structure du rapport spectral.

Page 46

Évidence fondamentale de la géométrie du spectre

« Lorsque $n \geq 1$ ou $n \leq -1$ et que n est un entier, toutes les valeurs de n ramènent à un nombre premier P . Toutes les valeurs de n sont la conséquence directe de la quantité de termes dans les suites A et B. Tous les nombres premiers respectent le rapport spectral $1/k$. Ce rapport est numériquement valide, mais algébriquement incohérent. »

Lien avec la fonction zêta et les rapports non typiques

L'axiome concernant les parties réelles algébriques introduit des difficultés dans la validation HOL/Isabelle. Cependant, grâce au pipeline cognitif et au corpus HOL intégré dans le dépôt GitHub, la géométrie du spectre permet de reconstruire les nombres premiers pour la valeur généralisée de n , pour tous les rapports typiques et non typiques.

Le rapport typique $1/k = 1/2$ correspond à la droite critique de la fonction zêta. Les rapports non typiques sont l'analogue des zéros non triviaux.

Dans la formule :

$$N(T) \sim T$$

$$2\pi \log(T)$$

$$2\pi i - T$$

$$2\pi i,$$

la valeur T représente une hauteur tronquée de la droite critique. Les rapports non typiques $1/k \neq 1/2$ jouent un rôle similaire : la valeur de n ne correspond pas à la position du nombre premier, mais uniquement à la quantité de termes dans les suites A et B.

Par exemple :

- Pour $1/k = 1/3$ et $n = 10$, le premier retourné est 227, soit le 49^e premier.
- Pour $1/k = 1/4$ et $n = 10$, le premier retourné est 947, ce qui rend toutes les valeurs premières inférieures à 881 négatives pour ce rapport.

Ainsi, un même nombre premier peut être positif pour un rapport non typique et négatif pour un autre, en raison de la polarité déterminée par la valeur de n .

Les ancrages premiers observés dans la géométrie du spectre suivent une loi empirique de type puissance :

$$\log P(k) \sim a \log k + b, \text{ avec } a \sim 5.$$

Ce qui équivaut à :

$$P(k) \sim C \cdot k^5.$$

Il s'agit d'une loi polynomiale, et non logarithmique. Elle définit une géométrie alternative des nombres premiers, dans laquelle la taille des premiers reconstruits croît comme une puissance de l'indice k .

2. Comparaison des ordres de grandeur

Page 47

Les zéros non triviaux de la fonction zeta(s) atteignent des hauteurs de l'ordre de : 1012

dans les calculs analytiques les plus avancés.

Dans Gabriel multiloop, pour des rapports non typiques proches de :

$$1/k \text{ avec } k \sim 104,$$

les ancrages premiers atteignent des tailles de l'ordre de :

$$P(k) \sim k^5 \sim (104)^5 = 1020.$$

Autrement dit :

Les premiers reconstruits par Gabriel multiloop dépassent d'un facteur d'environ 1000 x les hauteurs des zéros non triviaux connus de zeta(s).

Il ne s'agit pas d'une imitation de la fonction zêta : c'est une structure parallèle, produisant des objets arithmétiques (des nombres premiers) dans des ordres de grandeur analogues à ceux où la zêta produit ses zéros.

3. Interprétation géométrique

Dans la fonction zêta de Riemann, la structure est contrôlée par :

$$s = \sigma + it, \quad \sigma = 1$$

2.

La partie réelle $\sigma = 1/2$ constitue la ligne critique, où se situent les zéros non triviaux selon

l'hypothèse de Riemann.

Dans Gabriel multiloop, la structure est contrôlée par une loi de puissance :

$$P(k) \sim C \cdot k^a, \quad a \sim 5.$$

On peut interpréter l'exposant a comme un analogue discret de la partie réelle σ dans la zêta :

- $\sigma = 1/2 \rightarrow$ structure des zéros,
- $a \sim 5 \rightarrow$ structure des ancrages premiers.

Ce parallèle n'est pas une équivalence mathématique, mais une analogie structurelle : dans les deux cas, une exposante réelle contrôle la croissance d'objets fondamentaux (zéros ou premiers).

4. Rapport typique vs rapport non typique

Les rapports typiques (comme $1/2$) produisent des ancrages faibles et réguliers. Les rapports non typiques (comme $1/9999$) produisent des ancrages extrêmement grands.

Cette dichotomie rappelle la distinction entre :

- zéros triviaux : simples, réguliers, prévisibles,

Page 48

- zéros non triviaux : complexes, oscillants, riches en structure.

Dans Gabriel multiloop :

- les rapports typiques jouent le rôle des zéros triviaux,
- les rapports non typiques jouent le rôle des zéros non triviaux.

5. Conclusion : une géométrie alternative des nombres premiers

La structure des ancrages premiers dans Gabriel multiloop n'imité pas la fonction zêta de Riemann. Elle produit une géométrie polynomiale des premiers :

$$P(k) \sim C \cdot k^5,$$

qui :

- croît beaucoup plus rapidement que les hauteurs des zéros de $\zeta(s)$,
- possède une régularité remarquable,
- révèle une dynamique interne riche (Digamma, Zêta, offsets),
- et ouvre une voie entièrement nouvelle pour la compréhension des nombres premiers.

7. Fusion des rapports typiques et non typiques dans la fonction zêta spectrale de Savard

7.1. Droite critique spectrale : le rapport typique $1/2$

Dans la géométrie du spectre des nombres premiers, le rapport typique $1/k = 1/2$ (donc $k = 2$) joue le rôle d'un homologue de la droite critique de la fonction zêta de Riemann. Dans ce modèle, n indique à la fois le nombre de termes des suites A et B et le rang du premier associé :

$$n = 1 \mapsto 2, \quad n = 2 \mapsto 3, \quad n = 3 \mapsto 5, \quad \dots, \quad n = 49 \mapsto 227.$$

Pour les indices négatifs, on adopte la convention $P_{-m} = -p_m$, où p_m est le m -ième premier positif :

$$n = -1 \mapsto -2, \quad n = -2 \mapsto -3, \quad n = -3 \mapsto -5, \quad \dots, \quad n = -15 \mapsto -47.$$

Ainsi, dans cette convention, les indices entiers non nuls parcourent les premiers positifs et négatifs. Cette correspondance est une propriété du modèle spectral présenté ici ; elle n'établit pas à elle seule une équivalence avec l'hypothèse de Riemann.

Dans la formalisation Isabelle/HOL citée dans le rapport, le théorème `composite_not_prime_i` établit qu'un entier composé ne peut être égal à `prime_i i`, puisque `prime_i i` est démontré premier. Cette propriété porte sur la fonction formalisée ; le pipeline doit toujours signaler explicitement les candidats absents ou ambigus.

7.2. Rapports non typiques : positions et polarité spectrales

Les rapports non typiques $1/k$, avec $k \geq 3$, conservent dans cette interprétation la grille des positions définie par les premiers, mais n représente seulement le nombre de termes des suites A et B . Il n'est donc pas, en général, le rang du premier retourné. La polarité associée à un premier peut aussi dépendre du rapport considéré.

Par exemple, pour $n = 10$, le rapport $1/3$ retourne 227, qui est le 49^e premier, tandis que $1/4$ retourne 947, qui est le 161^e premier. Selon les conventions décrites dans le rapport, les premiers inférieurs à 881 sont négatifs pour le rapport $1/4$. Un même premier peut donc être positif pour un rapport non typique et négatif pour un autre, tout en gardant son rang habituel dans la suite des premiers. On peut interpréter les rapports non typiques comme des projections spectrales de la structure associée au rapport typique ; il s'agit ici d'une analogie du modèle, et non d'une identité avec les zéros de la fonction zêta classique.

7.3. Définition proposée de la fonction zêta spectrale de Savard

L'équation proposée pour la fonction ψ de Savard s'écrit

$$\psi_{\text{Savard}}(x; k, n) = x - \frac{k^n}{S_B(k, n)} - \log(2\pi) - \frac{1}{2} \log(1 - x^{-2}),$$

pour les valeurs où les termes de l'expression sont définis. Les cas négatifs requièrent l'adaptation de signe décrite dans les sections précédentes.

Un ancrage premier P est dit résonant dans ce modèle lorsque $\psi_{\text{Savard}}(P; k, n)$ est proche de P , c'est-à-dire lorsque l'écart résiduel est faible. Les exemples présentés attribuent au rapport typique $1/2$ une ondulation faible et décrivent une amélioration de la proximité pour certains grands premiers. Pour les indices négatifs au-delà de -47 , le rapport indique que $S_B(n)$ se stabilise près de 66 ; cette observation concerne la suite négative et l'extension de l'équation à ce cas.

7.4. Reconstruction des premiers et exclusion des composés

La relation de reconstruction utilisée est

$$P_i = \frac{S_B(k, n) - \text{Digamma}_{\text{calculé}}}{k^6}.$$

Dans la formalisation citée, la fonction `prime_i` ne retourne que des nombres premiers, ce qui exclut les composés de son image. L'interprétation supplémentaire selon laquelle le remplacement d'un premier par un composé conduirait à un indice non entier est une explication du mécanisme de reconstruction présenté ; elle doit être distinguée du théorème Isabelle `composite_not_prime_i`.

7.5. Comptages observés et loi de croissance proposée

Les trois catalogues dynamiques actuellement cités couvrent les plages $k = 2$ à 1001, 1002 à 10001, et 10002 à 100001. Ils rapportent respectivement 423, 2604 et 19215 lignes marquées `PREMIER TROUVE`, soit

$$423 + 2604 + 19215 = 22242$$

ancrages consignés sur 100000 rapports traités. Ces nombres sont les bilans des fichiers générés ; ils ne signifient pas que chaque résultat dispose d'un certificat HOL indépendant.

Les ancrages observés suggèrent empiriquement une croissance de type puissance :

$$\log P(k) \approx a \log k + b, \quad a \approx 5, \quad \text{soit} \quad P(k) \approx Ck^5.$$

Cette loi reste une approximation empirique dans les données présentées. Elle place certains ancrages vers 10^{20} pour k de l'ordre de 10^4 et vers 10^{25} pour k de l'ordre de 10^5 .

7.6. Interprétation zêta : analogie des exposants

Dans la fonction zêta de Riemann, la droite critique est donnée par $\sigma = 1/2$. Dans le modèle spectral de Savard, l'exposant de croissance $a \approx 5$ décrit la taille des ancrages premiers. On peut rapprocher ces deux paramètres comme analogues structurels : l'un intervient dans la description des zéros, l'autre dans la croissance des ancrages. Les deux constructions ne sont pas mathématiquement équivalentes : la fonction zêta classique concerne ses zéros, tandis que le modèle de Savard produit des candidats nombres premiers.

Le rapport mentionne des hauteurs de zéros non triviaux de l'ordre de 10^{12} et des ancrages pouvant atteindre l'ordre de 10^{25} . Le quotient des deux échelles est

$$\frac{10^{25}}{10^{12}} = 10^{13}.$$

Cette comparaison est uniquement une comparaison d'ordres de grandeur : une hauteur de zéro et la valeur d'un nombre premier sont des quantités de nature différente. Faute de référence bibliographique précisant une borne vérifiable, 10^{12} est présenté ici comme l'ordre de grandeur mentionné dans le rapport, et non comme un record mondial établi.

7.7. Hypothèse de Savard : formulation spectrale

Hypothèse de Savard (formulation proposée). Pour un entier n fixé et le long des rapports non typiques $1/k$ pour lesquels le pipeline fournit un ancrage unique, la résonance et la loi de croissance sont conjecturées sous la forme

$$\psi_{\text{Savard}}(P_{k,n}; k, n) = P_{k,n} + o(1), \quad P(k) \sim Ck^5 \quad (k \rightarrow \infty).$$

Ces relations sont des hypothèses asymptotiques à vérifier ; elles ne découlent pas des seuls exemples numériques ni du théorème d'exclusion des composés.

A. Annexe — Tables du classeur Excel

Classeur source : `systeme_convolutif_spectral_general.xlsx`.

A.1. Table de convolution formelle (feuille *Convolution*, extrait)

Chaque terme vaut $c_1 \cdot k^{e_1} + c_2 \cdot k^{e_2}$: cette représentation encode les additions et soustractions sans figer k .

Rapport	Suite	Ordre	Coeff 1	Exp 1	Coeff 2	Exp 2	Valeur	Expression formelle
1/3	A	1	1	1	0	0	3	k^1
1/3	A	8	1	8	0	0	6 561	k^8
1/3	A	9	1	9	-1	7	17 496	$k^9 - k^7$
1/3	A	10	1	10	-1	8	52 488	$k^{10} - k^8$
1/3	B	9	1	9	0	0	19 683	k^9
1/3	B	10	1	10	-1	8	52 488	$k^{10} - k^8$
1/3	B	11	1	11	-1	9	157 464	$k^{11} - k^9$
1/8	A	9	1	9	-1	7	132 120 576	$k^9 - k^7$
1/8	A	10	1	10	-1	8	1 056 964 608	$k^{10} - k^8$

A.2. Système généralisé (feuille *Systeme General*)

Formules fermées exactes, valables pour tout k entier ≥ 3 et tout n entier (positif ou négatif), validées contre les exemples numériques $k = 3..7$: $S_A(k, n) = (\alpha_A(k)/2) k^n - \delta_A(k)$ et $S_B(k, n) = (\alpha_B(k)/2) k^n - \delta_B(k)$. À $n = 10$: Digamma = $S_A \pm A(7 \text{ ou } 8)$; les quatre possibilités servent uniquement à déterminer l'ancrage premier du rapport. À $n \neq 10$: rang cible = rang premier à $n = 10 + n - 10$; P cible lu dans `tblPremiers` ; Digamma calculé = $S_B(k, n) - P_{\text{cible}} \times k^6$. Reconstruction : $P = [S_B(k, n) - \text{Digamma calculé}] / k^6$; un rapport sans ancrage unique à $n = 10$ demeure bloqué.

Rapport	k	n	Somme A	Somme B	Pos. Dig.	Signe	Digamma	Premier	Rang	Statut
1/3	3	10	79 824	238 746	8	-1	73 263	227	49	Résolu
1/4	4	10	1 316 180	5 260 628	8	+1	1 381 716	947	161	Résolu
1/5	5	10	11 738 280	58 675 780	7	+1	11 816 405	2 999	430	Résolu
1/6	6	10	70 599 858	423 552 498	8	+1	72 279 474	7 529	954	Résolu
1/7	7	10	322 966 112	2 260 645 142	8	-1	317 201 311	16 519	1 913	Résolu
1/8	8	10	1 208 259 144	9 665 811 016	8	-1	1 191 481 928	32 327	3 468	Résolu
1/9	9	10	3 874 802 760	34 872 693 408	7	-1	3 870 019 791	58 337	5 906	Résolu
1/10	10	10	11 001 111 110	110 010 111 110			—			Ambigu (3 candidats)
1/11	11	10	28 297 321 008	311 268 759 538			—			Ambigu (aucun candidat)
1/12	12	10	67 080 402 012	804 961 838 172			—			Ambigu (2 candidats)

Cas corrigé exact — rapport 1/8, $n = 34$: 32 327 est le 3 468^{ème} premier à $n = 10$; le décalage de 24 rangs donne le 3 492^{ème} premier, soit 32 537. $S_A(8, 34) = 5 705 842 489 643 358 455 620 763 423 304$; $S_B(8, 34) = 45 646 739 917 146 867 644 966 107 124 296$; Zêta $k^6 = 262 144$; Digamma exact = 45 646 739 917 146 867 644 957 577 744 968 — *reconstruit exactement*.

A.3. Paramètres des règles et constantes des sommes fermées (feuille *Parametres*)

Rapport	k	n	Exp. reconstruction	Position Digamma	Signe Digamma	Statut
1/3	3	10	6	8	-1	Ancrage $n = 10$ validé ; séquence par rang active
1/4	4	10	6	8	+1	Ancrage $n = 10$ validé ; séquence par rang active
1/5	5	10	6	7	+1	Ancrage $n = 10$ validé ; séquence par rang active
1/6	6	10	6	8	+1	Ancrage $n = 10$ validé ; séquence par rang active
1/7	7	10	6	8	-1	Ancrage $n = 10$ validé ; séquence par rang active
1/8	8	10	6	8	-1	Ancrage $n = 10$ validé ; séquence par rang active
1/9	9	10	6	7	-1	Ancrage $n = 10$ validé ; séquence par rang active
1/10	10	10	6	—	—	Essai-erreur requis
1/11	11	10	6	—	—	Essai-erreur requis
1/12	12	10	6	—	—	Essai-erreur requis

Obligation universelle : chaque premier cible doit être produit une fois par le catalogue complet. Règles actives — $n = 10$: A et B construites, quatre Digamma $\pm A(7)$, $\pm A(8)$, sélection du seul entier premier, dénominateur k^6 , création de l'ancrage ; $n \neq 10$: A et B construites, rang cible = rang base + $n - 10$, premier lu dans `tblPremiers`, Digamma = $\Sigma B - P \times k^6$, ancrage $n = 10$ obligatoire.

A.4. Moteur géo convolutif (feuille *Moteur Géo Convolutif*, $k = 11$)

Implémentation des annexes PDF 16.1–16.19 : chaque terme géométrique est le terme entier correspondant multiplié par $g(k) = \sqrt{1 + k^2}/k$ ($g(11) = 1.0041237288352056$). Identité centrale : $S_A^{\text{géo}} = g(k) \cdot S_A^{\text{entier}}$; $S_B^{\text{géo}} = g(k) \cdot S_B^{\text{entier}}$; Digamma_{géo} = $g(k) \cdot \text{Digamma}_{\text{entier}}$; Zêta_{géo} = $g(k) \cdot k^6$ — le facteur s'annule dans P . Somme entière A = 28 297 321 008, B = 311 268 759 538 ; sommes géométriques : contrôle facteur 0. Pour $k = 11$, les six branches $(A(n-3)\pm, A(n-2)\pm, \text{diagnostics } B(n-2)\pm)$ donnent des candidats entiers non premiers : verdict pipeline « AUCUN P — COMPOSÉS EXCLUS » (6 composés exclus HOL) ; la règle standard ne sélectionne que les quatre branches A. Référence PDF : premier imprimé 1 611 851 (règle A7–, forme spéciale) ; correction séquentielle : ancrage rang 121 982 à $n = 10$, cible rang 121 987 à $n = 15 \Rightarrow$ premier 1 611 901.

A.5. Tests Digamma (feuille *Tests Digamma*)

Le candidat est A ajustée = Somme A + signe $\cdot k^{\text{position}}$; puis $P = (\text{Somme B} - \text{A ajustée})/k^{\text{exp reconstruction}}$. Pour 1/3 ($n = 10$) : seule la combinaison position 8 / signe – produit 227, premier de rang 49 ; les trois autres candidats sont composés (221, 215, 209). Essai convolutif 1/3, $n = 18$: $S_A(18) = 523\,735\,104$, $S_B(18) = 1\,571\,204\,586$; les quatre options donnent des quotients entiers, et les options position 8 produisent deux premiers consécutifs (1 436 849 et 1 436 867) : la règle Digamma ne sélectionne pas encore une solution unique pour $n = 18$ — un critère supplémentaire est requis, d'où la voie officielle du Niveau 5 (décalage de rang, Digamma calculé à rebours).

A.6. Suites géométriques A–B (feuille *Suites Géo A-B*, modèle hypoténuse)

Pour $t = 1/k$: typique $k = 2$ ($t = 1/2$, $S_A = 2.2469862782$, $S_B = 2.2016753304$, $S_A + S_B = 4.4486616086$) ; non typiques $k = 3..12$ (ex. $k = 7$: $S_A = 1.1785207100$, $S_B = 1.1784513659$). Logique de repli automatique : Étape 1 approche algébrique ($k^n + 4$ Digamma) ; si 0 premier, Étape 2 approche géométrique (suites $\sqrt{a^2 + b^2}$, extraction floor/ceil/round de S_A , S_B , nS_A , nS_B , test de primalité). Invariants : Digamma inchangé ; les équations pour $\forall n$ restent identiques.

A.7. Bilan des ancrages pour $n = 10$ et extraits des grands rapports

Les trois catalogues dynamiques couvrant successivement $k = 2\text{--}1001$, $1002\text{--}10001$, puis $10002\text{--}100001$ rapportent les nombres de resultats suivants. Les nombres de la colonne "ancrages" sont les lignes marquees PREMIER TROUVE par le pipeline dans les fichiers de resultats cites.

Plage de k	Rapports traites	Ancrages trouves	Proportion
2–1001	1 000	423	42,30%
1002–10001	9 000	2 604	28,93%
10002–100001	90 000	19 215	21,35%
Total (2–100001)	100 000	22 242	22,242%

Les totaux reproduisent les bilans des fichiers `liste_k2_k1001_n10.txt`, `liste_k1002_k10001_n10.txt` et `liste_k10002_k100001_n10.txt`. Ils decrivent les resultats consignes par le pipeline ; ils ne remplacent pas un certificat independant pour chaque ancrage.

Comparaison d’ordres de grandeur. Les ancrages des rapports proches de $1/100000$ atteignent environ 10^{25} dans le catalogue ci-dessous. Le document evoque des calculs de zeros non triviaux de hauteur de l’ordre de 10^{12} . Le quotient de ces ordres de grandeur est $10^{25}/10^{12} = 10^{13}$, soit 10 000 milliards. Cette comparaison porte uniquement sur les tailles numeriques : une hauteur de zero et la valeur d’un nombre premier sont des quantites de nature differente. Faute de reference bibliographique precisant une borne et un record verifiables, 10^{12} est presente ici comme un ordre de grandeur, non comme un record mondial etabli.

Extrait dynamique : $k = 9978\text{--}10001$

Rapport	Ancre $P(n = 10)$	Etat DYN	Resultat du rapport
1/9978	98 904 828 370 293 156 971	TROUVE	Essais DYN : premier retourne
1/9979	98 954 399 755 106 335 579	TROUVE	Essais DYN : premier retourne
1/9980	99 003 991 013 984 807 999	TROUVE	Essais DYN : premier retourne
1/9981	—	ECHEC	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9982	—	ECHEC	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9983	—	ECHEC	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9984	—	ECHEC	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9985	—	ECHEC	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9986	—	ECHEC	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9987	99 351 686 808 222 880 721	TROUVE	Essais DYN : premier retourne
1/9988	—	ECHEC	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9989	—	ECHEC	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9990	—	ECHEC	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9991	—	ECHEC	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9992	—	ECHEC	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9993	99 650 488 659 218 583 521	TROUVE	Essais DYN : premier retourne

Rapport	Ancre $P(n = 10)$	Etat DYN	Resultat du rapport
1/9994	99 700 358 785 863 712 439	TROUVE	Essais DYN : premier retourne
1/9995	—	ECHEC	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9996	99 800 158 937 112 409 019	TROUVE	Essais DYN : premier retourne
1/9997	99 850 088 973 903 799 777	TROUVE	Essais DYN : premier retourne
1/9998	—	ECHEC	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/9999	99 950 008 999 300 019 999	TROUVE	Essais DYN : premier retourne
1/10000	—	ECHEC	Aucun ancrage (4 essais Digamma)
1/10001	—	ECHEC	Aucun ancrage (4 essais Digamma)

Extrait du catalogue detaille : $k = 99975$ – 100001

Rapport	Ancre $P(n = 10)$	Etat	Branche / remarque
1/99975	9 987 506 247 438 445 115 449 949	UNIQUE	Branche A(7)-
1/99976	9 988 005 757 618 485 707 451 151	UNIQUE	Branche A(7)-
1/99977	—	ABSENT	—
1/99978	—	ABSENT	—
1/99979	—	AMBIGU	A(8)+ : 9 989 504 408 074 617 108 424 697 ; A(7)- : 9 989 504 408 074 627 104 325 117
1/99980	—	ABSENT	—
1/99981	—	ABSENT	—
1/99982	—	ABSENT	—
1/99983	—	ABSENT	—
1/99984	—	ABSENT	—
1/99985	—	ABSENT	—
1/99986	—	ABSENT	—
1/99987	9 993 501 688 780 714 226 931 059	UNIQUE	Branche A(8)-
1/99988	—	ABSENT	—
1/99989	—	ABSENT	—
1/99990	9 995 000 998 900 304 969 900 999	UNIQUE	Branche A(7)+
1/99991	—	ABSENT	—
1/99992	—	ABSENT	—
1/99993	—	ABSENT	—
1/99994	—	ABSENT	—
1/99995	—	ABSENT	—
1/99996	9 998 000 158 993 720 123 199 039	UNIQUE	Branche A(7)+
1/99997	—	ABSENT	—
1/99998	—	ABSENT	—
1/99999	—	ABSENT	—
1/100000	—	ABSENT	—
1/100001	—	ABSENT	—

Pour $k = 99979$, le catalogue detaille signale deux candidats de branches differentes ; le statut reste **AMBIGU** et aucun choix unique n'est presente ici. Les Etats **ABSENT** et **AMBIGU** ne

sont donc pas comptes comme ancrages uniques dans le bilan precedent.