

# Una aproximación a $\text{sen}(x)$

Luis Enrique Serrano Gutiérrez

21 de noviembre de 2019

## Resumen

Se presenta una forma de calcular el seno de un número basada en la publicación "Algoritmos Sencillos para Evaluar Funciones Elementales" escrita por el profesor Pablo Barrera Sánchez [PBS1996].

## Las ideas

La base para este procedimiento son los siguientes dos hechos:

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$

Esto quiere decir que para valores de  $\alpha$  muy cercanos a cero el  $\text{seno}(\alpha)$  es muy cercano a  $\alpha$ , por ejemplo:

i	$\alpha = 1/i^i$	$\text{sen}(\alpha)$	$\alpha - \text{sen}(\alpha)$
1	0.500000000000	0.479425538604	-0.020574461396
2	0.250000000000	0.247403959255	-0.002596040745
3	0.125000000000	0.124674733385	-0.000325266615
4	0.062500000000	0.062459317842	-0.000040682158
5	0.031250000000	0.031244913985	-0.000005086015


Cuadro 1: Comparación  $\text{sen}(\alpha)$  contra  $\alpha$  para valores de  $\alpha$  cercanos a cero

2.  $\text{sen}(2\alpha) = 2\text{sen}(\alpha)\sqrt{1 - \text{sen}^2(\alpha)}$

Este hecho se deduce de las identidades:

$$\begin{aligned}\text{sen}(2\alpha) &= 2\text{sen}(\alpha)\cos(\alpha) \\ \text{sen}^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) &= 1\end{aligned}$$

## El procedimiento



Si se encuentra la forma de llevar el valor  $\alpha$  lo suficientemente cerca a cero se tendría la posibilidad de aplicar la idea del punto 1, ese nuevo valor cercano a cero (que se calcula a partir de  $\alpha$ ) se llamará  $\beta$  y se define como:  $\beta = \frac{\alpha}{2^5}$ . Este valor es lo suficientemente pequeño para que:  $\text{sen}(\beta) \approx \beta$ .

Por ejemplo, si  $\alpha = 0.1$  el valor de  $\beta$  se calcula de la siguiente forma:  $\beta = \frac{\alpha}{2^5} = \frac{0.1}{2^5} = \frac{0.1}{32} = 0.003125$ . Para el valor  $\beta = 0.003125$  se cumple que  $\text{sen}(\beta) \approx \beta$  para verificarlo se debe calcular la diferencia entre  $\text{sen}(0.003125)$  y  $0.003125$ .

$$\boxed{\text{sen}(\beta) \approx 0.003125}$$

Ahora se conoce el valor de  $\text{sen}(\beta)$  pero el problema original es calcular  $\text{sen}(\alpha)$  por lo que para "regresar" al valor original se hace uso del punto dos, de tal forma que:

$$\begin{aligned} \text{sen}(2\beta) &= 2 * \text{sen}(\beta) * \sqrt{1 - \text{sen}^2(\beta)} = \\ 2 * (0.003125) * \sqrt{1 - (0.003125)^2} &= \\ 0.00625 * \sqrt{1 - 0.000009} &= \\ 0.00625 * \sqrt{0.9999902} &= \\ 0.00625 * 0.9999951 &= 0.006250 \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{sen}(2\beta) = 0.006250}$$

Se ha obtenido en forma numérica el valor de  $\text{sen}(2\beta)$ , observemos lo siguiente:  $\text{sen}(2\beta) = \text{sen}(2\frac{\alpha}{2^5}) = \text{sen}(\frac{\alpha}{2^{5-1}}) = \text{sen}(\frac{\alpha}{2^4})$  el exponente del de-

nominador se redujo en 1, de 5 a 4, por lo que se está una potencia más cerca del valor original.

Ahora se calcula el seno del doble del ángulo anterior,  $2\beta$

$$\begin{aligned} \text{sen}(2(2\beta)) &= 2 * \text{sen}(2\beta) * \sqrt{1 - \text{sen}^2(2\beta)} = \\ 2 * (0.006250) * \sqrt{1 - (0.006250)^2} &= \\ 0.0124999 * \sqrt{1 - 0.0000391} &= \\ 0.0124999 * \sqrt{0.9999609} &= \\ 0.0124999 * 0.9999805 &= 0.0124997 \\ \text{sen}(2(2\beta)) &= 0.0124997 \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{sen}(2 \cdot 2\beta) = 0.0124997}$$

Observe lo siguiente:  $\text{sen}(2(2\beta)) = \text{sen}(2\frac{\alpha}{2^4}) = \text{sen}(\frac{\alpha}{2^{4-1}}) = \text{sen}(\frac{\alpha}{2^3})$ , y nuevamente se está una potencia más cerca del valor original, por lo que al calcular el seno del doble del ángulo anterior tres veces más se tendrá el seno de  $\alpha$  que es el objetivo.

Ahora se calcula el seno del doble del ángulo anterior,  $2 \cdot 2\beta$

$$\begin{aligned} \text{sen}(2(2 \cdot 2\beta)) &= 2 * \text{sen}(2 \cdot 2\beta) * \sqrt{1 - \text{sen}^2(2 \cdot 2\beta)} = \\ 2 * (0.0124997) * \sqrt{1 - (0.0124997)^2} &= \\ 0.0249994 * \sqrt{1 - 0.0001562} &= \\ 0.0249994 * \sqrt{0.9998438} &= \\ 0.0249994 * 0.9999219 &= 0.0249974 \\ \text{sen}(2(2 \cdot 2\beta)) &= 0.0249974 \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{sen}(2 \cdot 2 \cdot 2\beta) = 0.0249974}$$

y, nuevamente:  $\text{sen}(2(2 \cdot 2\beta)) = \text{sen}(2\frac{\alpha}{2^3}) = \text{sen}(\frac{\alpha}{2^{3-1}}) = \text{sen}(\frac{\alpha}{2^2})$

Ahora se calcula el seno del doble del ángulo anterior,  $2 \cdot 2 \cdot 2\beta$

$$\begin{aligned} \text{sen}(2(2 \cdot 2 \cdot 2\beta)) &= 2 * \text{sen}(2 \cdot 2 \cdot 2\beta) * \sqrt{1 - \text{sen}^2(2 \cdot 2 \cdot 2\beta)} = \\ 2 * (0.0249974) * \sqrt{1 - (0.0249974)^2} &= \\ 0.0499949 * \sqrt{1 - 0.0006249} &= \\ 0.0499949 * \sqrt{0.9993751} &= \\ 0.0499949 * 0.9996875 &= 0.0499793 \\ \text{sen}(2(2 \cdot 2 \cdot 2\beta)) &= 0.0499793 \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{sen}(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2\beta) = 0.0499793}$$

y, nuevamente:  $\text{sen}(2(2 \cdot 2 \cdot 2\beta)) = \text{sen}(2\frac{\alpha}{2^2}) = \text{sen}(\frac{\alpha}{2^{2-1}}) = \text{sen}(\frac{\alpha}{2^1}) = \text{sen}(\frac{\alpha}{2})$ . Por lo que calculando una vez más el seno del doble del ángulo anterior el exponente del 2 del denominador será cero y se tendrá el valor del seno de  $\alpha$ , que es el problema original que se quería resolver.

Ahora se calcula el seno del doble del ángulo anterior,  $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2\beta$

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(2(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2\beta)) &= 2 * \operatorname{sen}(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2\beta) * \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2\beta)} = \\ 2 * (0.0499793) * \sqrt{1 - (0.0499793)^2} &= \\ 0.0999585 * \sqrt{1 - 0.0024979} &= \\ 0.0999585 * \sqrt{0.9975021} &= \\ 0.0999585 * 0.9987503 &= 0.0998336 \\ \operatorname{sen}(2(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2\beta)) &= 0.0998336 \end{aligned}$$

$$\boxed{\operatorname{sen}(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2\beta)) = 0.0998336}$$

— y, nuevamente:  $\operatorname{sen}(2(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2\beta)) = \operatorname{sen}(2\frac{\alpha}{2^1}) = \operatorname{sen}(\frac{\alpha}{2^{1-1}}) = \operatorname{sen}(\frac{\alpha}{2^0}) = \operatorname{sen}(\frac{\alpha}{1}) = \operatorname{sen}(\alpha)$ , que es el valor que se quería calcular desde un principio, por lo que:  $\operatorname{sen}(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2\beta) = \operatorname{sen}(\alpha) = \operatorname{sen}(0.1) \approx 0.0998336$

## Preguntas

Esta forma de calcular el seno de un ángulo nos deja algunas preguntas, a saber:

1. ¿ El valor de la potencia, en el ejemplo se utilizó 5, es adecuado para todos los ángulos a los que requiera calcular el seno? R:Al parecer, funcionó correctamente con los que pedía y con algunos ejemplos que utilicé.
2. ¿ Entre mayor sea n la precisión se incrementará? R: no entendí bien esta pregunta así que me enfocaí en un problema que noté que creo que es a lo que se refiere, había cierto rango de error que acepté en mis resultados, pues los decimales variaban por máximo 7, así que pienso que al manejar los flotantes puedo manipular del todo estas cifras y acercarme a un resultado medianamente real, no creo que varíe con la magnitud de  $\alpha$ .

## El código

```
#David Alonso Gardu o Granados
#
```

```

#
#
#
#
from MisFunciones import vabs
from math import sqrt, sin
li=(6,5,4,3,2)
betas=[]
def seno(alfa):
    for h in li:
        beta=alfa/2**(h-1)
        dosbeta=2*beta*sqrt(1-(beta**2))
        betas.append(beta)
        beta=dosbeta
    return(beta)

if __name__ == "__main__":
    seno(.5)
    print("Este bloque se ejecuta si el programa \
es llamado desde IDLE, la variable __name__ tiene \
almacenada la cadena ' __main__ ' ")
    print(__name__)
else:
    print(" Si el archivo se utiliza como modulo, \
es decir se importa, la variable __name__ contiene \
el nombre del archivo ")
    print(__name__)

```

## Referencias

[PBS1996] Barrera Sánchez Pablo, Algoritmos Sencillos para Evaluar Funciones Elementales, 1996.