Table des matières

1 Suites numériques **2**
1.1 Rappels . . . 2
1.2 Suites extraites, valeurs d'adhérence . . . 2
1.3 Théorème de Bolzano-Weierstrass . . . 4

2 Séries numériques **5**
2.1 Suites et séries . . . 5
2.2 Séries à terme général positif . . . 7
2.3 Convergence absolue . . . 7

3 Étude de convergence de séries **8**
3.1 Théorèmes de comparaison . . . 8
3.2 Séries de référence . . . 8
3.3 Règle de d'Alembert . . . 9
3.4 Règle de Raabe-Duhamel (HP) . . . 9
3.5 Technique de comparaison série-intégrale . . . 10

4 Sommation des relations de comparaison **12**
4.1 Cas convergent . . . 12
4.2 Cas divergent . . . 13
4.3 Application à l'étude asymptotique de suites récurrentes . . . 14

5 Étude de convergence de séries à termes quelconques **14**
5.1 Séries alternées . . . 14
5.2 Utilisation d'un développement asymptotique du terme général (HP) . . . 15
5.3 Sommation par tranches (HP) . . . 15
5.4 Transformation d'Abel (HP) . . . 16
5.5 Utilisation d'une primitive (HP) . . . 16

Suites et séries numériques

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne le corps des réels ou le corps des complexes.

1 Suites numériques

1.1 Rappels

Revoir dans le cours de première année :

- la définition d'une suite convergente, d'une suite tendant vers $+\infty$ ou $-\infty$;
- les suites monotones ;
- les suites adjacentes ;
- la comparaison des suites.

Exemple.
1. $\ln(\cos(1/n)) \sim \cos(1/n) - 1 \sim -1/2n^2$, et pas le contraire.
2. Équivalent de $\cos(1/n) - 1 + 1/n$ puis de $\cos(1/n) - 1 + 1/n^2$.
3. $\exp(a_n) \sim \exp(b_n) \iff b_n - a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

Théorème 1 : (HP)

Si (a_n) et (b_n) sont deux suites à termes strictement positifs équivalentes qui tendent vers $+\infty$ ou qui tendent vers 0, alors $\ln(a_n) \sim \ln(b_n)$.

Exemple. Existence, limite et équivalent de $(x_n) \in [0,1]^{\mathbb{N}}$ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N},\ x_n = (1 - x_n)^n$.

Exercice Moulin.SSN.05

1.2 Suites extraites, valeurs d'adhérence

Définition 1

- On appelle **extraction** toute application φ strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.
- Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. On appelle **suite extraite** ou **sous-suite** tout suite de la forme $(u_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ où φ est une extraction.

Théorème 2 :

Si φ est une extraction, alors $\forall n \in \mathbb{N},\ \varphi(n) \geqslant n$.

Théorème 3 :

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{K}$ convergeant vers $l \in \mathbb{K}$. Alors toute sous-suite de u converge également vers l.

Remarque. De la même façon, si (u_n) est une suite réelle tendant vers $+\infty$, toutes ses sous-suites tendent également vers $= \infty$. Il en est de même pour $-\infty$.

Définition 2

On appelle **valeur d'adhérence** d'une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tout élément de $\mathbb{K}$ qui est limite d'une sous-suite convergente de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Remarque. D'après la proposition précédente, une suite convergente ne possède que sa limite comme valeur d'adhérence.

Point méthode. Pour montrer qu'une suite est divergente, on peut utiliser la contraposée de la remarque précédente : il suffit de montrer que la suite considérée possède au moins deux valeurs d'adhérence.

Exemple. La suite réelle de terme général $(-1)^n$ est divergente, car elle possède 1 et -1 comme valeurs d'adhérence.

Exercice 1. On considère la suite de terme général $a_n = n(1 + (-1)^n)$.

1. Montrer que 0 est la seule valeur d'adhérence de la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
2. La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est-elle convergente ?

Attention Comme le montre l'exercice précédent, ce n'est pas parce qu'une suite ne possède qu'une seule valeur d'adhérence qu'elle converge !

Rappel La convergence des deux suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) vers la même limite l entraîne la convergence de (u_n) vers l.

Exercice 2. Soit φ et ψ deux applications strictement croissantes de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. On suppose que les deux sous-suites $(u_{\varphi(n)})$ et $(u_{\psi(n)})$ convergent vers un même élément l. Donner une condition nécessaire et suffisante sur φ et ψ pour que l'on puisse en déduire que (u_n) converge vers l.

Théorème 4 : Caractérisation ensembliste des valeurs d'adhérence

Pour une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et un élément $l \in \mathbb{K}$, il est équivalent de dire :

(i) l est une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$;

(ii) $\forall \varepsilon > 0,\ \{n \in \mathbb{N}\ :\ |u_n - l| \leqslant \varepsilon\}$ est infini ;

(iii) $\forall \varepsilon > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ \exists p \geqslant n,\ |u_p - l| \leqslant \varepsilon$.

Exercice Moulin.SSN.02

1.3 Théorème de Bolzano-Weierstrass

Théorème 5 : Théorème de Bolzano-Weierstrass

Toute suite bornée de $\mathbb{K}$ admet une valeur d'adhérence.

Définition 3

Limites inférieure et supérieure (HP) Soit u une suite réelle.

- Si u est minorée, la suite $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$y_n = \inf\{u_p \ \mid \ p \geqslant n\}$$

  est croissante. Sa limite (éventuellement $+\infty$) est appelée **limite inférieure** de u et est notée $\underline{\lim} u$.
  Si u est non minorée, on pose $\underline{\lim} u = -\infty$.
- Si u est majorée, la suite $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$y_n = \sup\{u_p \ \mid \ p \geqslant n\}$$

  est décroissante. Sa limite (éventuellement $-\infty$) est appelée **limite supérieure** de u et est notée $\overline{\lim} u$.
  Si u est non majorée, on pose $\overline{\lim} u = +\infty$.

Théorème 6 : (HP)

On a $\underline{\lim} u \leqslant \overline{\lim} u$, avec égalité si, et seulement si, u admet une limite.

Exercice 3. Montrer qu'il existe une sous-suite de u qui admet $\underline{\lim} u$ pour limite, et qu'il existe une sous-suite de u qui admet $\overline{\lim} u$ pour limite.
En déduire une autre démonstration du théorème de Bolzano-Weierstrass pour les suites réelles.
Montrer que tout valeur d'adhérence de u est comprise entre $\underline{\lim} u$ et $\overline{\lim} u$.

Théorème 7 : Critère de Cauchy (HP)

Une suite complexe u converge si, et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall p \geqslant n_0,\ \forall q \geqslant n_0,\ |u_p - u_q| \leqslant \varepsilon$$

2 Séries numériques

2.1 Suites et séries

A toute suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, on associe la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$$

L'application $u \mapsto S$ est un isomorphisme d'espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. Sa réciproque est l'application $S \mapsto u$, où u est définie par :

$$u_0 = S_0 \ \text{ et } \ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = S_n - S_{n-1}$$

Pour chaque élément de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, on peut donc considérer au choix la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ou la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ associée.

Définition 4

Si $u \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, et $S_n = \sum_{p=0}^{n} u_p$, on appelle série de terme général CENSURE.

On la note $\sum u_n$.
Le **terme général** est donc le scalaire u_n ; les **sommes partielles** sont les S_n.

Définition 5

On dit que la série $\sum u_n$ **converge** si la suite (S_n) admet une limite dans $\mathbb{K}$, appelée **somme de la série** et notée $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$. Dans le cas contraire, on dit que la série **diverge**. On parle de la nature d'une série pour parler de sa convergence ou sa divergence.

Notation On note $S_n(u)$ la n-ième somme partielle de la série de terme général u_n. Lorsque la série converge, on note aussi $S(u)$ sa somme.

Remarque.

- Lorsque la suite u est définie seulement à partir d'un certain rang n_0, la série de terme général u_n est notée $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$; il s'agit de la suite des sommes partielles définie par :

$$\forall n \geqslant n_0,\ S_n = \sum_{p=n_0}^{n} u_p$$

- Le caractère asymptotique de la notion de limite permet de voir que pour $n_0 \in \mathbb{N}$, une série $\sum u_n$ converge si, et seulement si, la série $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$.

Suites vs séries

- L'étude d'une série n'est donc autre chose que l'étude d'une suite.
- MAIS une série est donnée par son terme général et non par ses sommes partielles, et son étude, spécifique, consiste justement à travailler sur le terme général.
- On n'étudie donc pas (sauf rares exceptions) une série par considérations sur la suite de ses sommes partielles. Mieux, pour étudier une suite, on peut considérer une série :

Point méthode. Pour étudier la convergence d'une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, il faut penser à étudier éventuellement la convergence de la série $\sum_{n\geqslant 1}(u_{n+1}-u_n)$.

Théorème 8 :

Si une série converge, alors son terme général converge vers 0.

Attention La convergence vers 0 du terme général est une condition nécessaire mais non suffisante de convergence. On pourra par exemple considérer la série dont le terme général est donné par : $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$.

Théorème 9 :

L'ensemble des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ telles que la série $\sum u_n$ converge est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ sur lequel l'application somme est linéaire.

Théorème 10 :

On ne change pas la nature d'une série en ajoutant à son terme général le terme général d'une série convergente.

Remarque. Cette proposition sert pratiquement à "découper" le terme général d'une série en bouts plus simples à étudier, par exemple en faisant un développement asymptotique du terme général.

Exemple.

1. Une série géométrique $\sum a^n$ converge si, et seulement si, $|a| < 1$. Sa somme (si elle commence au rang $n = 0$) est alors $1/(1-a)$.
2. La série $\dfrac{1}{n}$ diverge : minoration de $S_{2n} - S_n$.
3. Une série télescopique est une série dont le terme général est naturellement sous la forme $u_{n+1} - u_n$. Ses sommes partielles sont donc les $u_{n+1} - u_n$. Elle converge donc si, et seulement si, la suite u admet une limite finie. Sa somme est alors $\lim u - u_0$.

Exercice 4. Convergence et somme des séries :

$$\sum \frac{1}{n(n+1)} \quad \text{et} \quad \sum \arctan\left(\frac{1}{1+n+n^2}\right)$$

Définition 6

Lorsque la série $\sum u_n$, on note $R_n(u) = \sum_{p=n+1}^{+\infty} u_p$, qu'on appelle **reste** au rang p.

Remarque. Dans ce cas, la suite $(R_n(u))$ converge vers 0 comme le prouve la relation :

$$R_n(u) = S(u) - S_n(u)$$

Exercice 5. Que penser de l'affirmation "la suite $(R_n(u))$ converge vers 0 puisque $\sum u_n$ converge" ?

2.2 Séries à terme général positif

Théorème 11 :

Soit $\sum u_n$ une série à terme général réel positif ou nul. Alors les sommes partielles convergent ou tendent vers $+\infty$.

Théorème 12 : Comparaison de séries à termes généraux positifs

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries vérifiant :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_0,\ 0 \leqslant u_n \leqslant v_n$$

- Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
- Si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge.

2.3 Convergence absolue

Définition 7

On dit que la série $\sum u_n$ est **absolument convergente**, ou **converge absolument**, si la série réelle positive $\sum |u_n|$ est convergente. Cela équivaut à la sommabilité de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Théorème 13 :

Toute série réelle ou complexe absolument convergente est convergente.

Définition 8

Une série qui converge mais qui n'est pas absolument convergente est dite **semi-convergente**.

Exemple. La suite $(-1)^n/n$ converge vers 0. C'est la suite des sommes partielles dont le terme général u_n vérifie $|u_n| \geqslant 1/n$ donc qui n'est pas absolument convergente.

3 Étude de convergence de séries

3.1 Théorèmes de comparaison

Théorème 14 :

Soit (u_n) et (v_n) deux séries telles que $u_n = O(v_n)$. Si (v_n) est sommable, alors (u_n) est sommable.

Remarque. Évidemment, le résultat subsiste si l'on a $u_n = o(v_n)$.

Exemple. Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à terme général réel. Si $u_n \sim v_n$ et si (v_n) est positive, alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Exercice Moulin.SSN.22

3.2 Séries de référence

Remarque. Pour démontrer la convergence (ou la divergence) d'une série à terme général positif à l'aide des théorèmes de comparaison ci-dessus, on utilise des séries de référence : séries géométriques, ou séries de Riemann.

Théorème 15 : Séries de Riemann

La suite $\left(\dfrac{1}{n^\alpha}\right)_{n\geqslant 1}$ est sommable si, et seulement si, $\alpha > 1$.

Démonstration. Trouver un équivalent $(n+1)^\beta - n^\beta$. □

Point méthode. On a les différents cas.

- Si $\exists \alpha > 1 \ : \ n^\alpha u_n \to 0$, alors $\sum u_n$ converge absolument.
- Si $\exists \alpha \leqslant 1 \ : \ n^\alpha u_n \to +\infty$, alors $\sum u_n$ diverge.
- Si $\exists M \geqslant m > 0 \ : \ m \leqslant n^\alpha u_n \leqslant M$, alors $\sum u_n$ est de même nature que $\sum n^{-\alpha}$.

Exemple. $\sum \dfrac{\ln(n)^\beta}{n^\alpha}$, $\sum e^{-n^\alpha}$ et $\sum \left(\cos\left(\dfrac{1}{n}\right)\right)^{n^\alpha}$

3.3 Règle de d'Alembert

Théorème 16 : Comparaison logarithmique

Si, à partir d'un certain rang, u_n et v_n sont strictement positifs et si $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant \dfrac{v_{n+1}}{v_n}$, alors $u_n = O(v_n)$, et donc :

- la convergence de $\sum v_n$ entraîne la convergence de $\sum u_n$;
- la divergence de $\sum u_n$ entraîne la divergence.

Théorème 17 :

Soit (u_n) une suite à valeurs strictement positives. Si à partir d'un certain rang :

1. $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant k < 1$, alors $\sum u_n$ converge.
2. $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant 1$, alors $\sum u_n$ diverge.

Théorème 18 :

Soit (u_n) une suite à valeurs strictement positives. Si :

1. $\lim\limits_{+\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} < 1$, alors $\sum u_n$ converge.
2. $\lim\limits_{+\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, alors $\sum u_n$ diverge.

Exemple. $\sum \dfrac{x^n}{n!}$, $\sum \dbinom{2n}{n} x^n$

Exercice Moulin.SSN.11

3.4 Règle de Raabe-Duhamel (HP)

Attention Si $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \to 1$, on ne peut rien conclure directement. La règle suivante généralise la règle de d'Alembert par comparaison logarithmique avec des séries de Riemann.

Théorème 19 : Règle de Raabe-Duhamel (HP)

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite à valeurs strictement positives vérifiant :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Alors :

- si $\alpha > 1$, alors $\sum u_n$ converge.

- si $\alpha < 1$, alors $\sum u_n$ diverge.

Lorsque $\alpha = 1$, on ne peut rien conclure. Les séries de Bertrand $\sum u_n$ avec :

$$u_n = \frac{1}{n\ln(n)^\alpha}$$

vérifient : $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \dfrac{1}{n} + \dfrac{\alpha}{n\ln(n)} + o\left(\dfrac{1}{n\ln(n)}\right)$ alors que, suivant les valeurs de α, la série $\sum u_n$ peut converger ou diverger.

Néanmoins :

Exemple.

1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite à valeurs strictement positives vérifiant :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 + \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

   Alors il existe $K > 0$ telle que $u_n \sim Kn^\alpha$.
2. Cas $\alpha = 1$: si $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \dfrac{1}{n} + O\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$, alors $\sum u_n$ diverge.
3. Formule de Stirling.

Exercice 6. Soit $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos^n(t)dt$.

1. Montrer que la suite (I_n) est croissante.
2. Trouver une relation de récurrence entre I_n et I_{n+2}.
3. En déduire $(n+1)I_nI_{n+1} = \pi/2$.
4. Donner un équivalent de I_n.
5. Donner une expression de I_{2n} ou I_{2n+1} à l'aide de factorielles et en déduire la formule de Stirling.

3.5 Technique de comparaison série-intégrale

La technique de comparaison série-intégrale a déjà été vue en première année. Nous donnons ici des approfondissements.

Utilisation de la monotonie

Théorème 20 :

Soit $f \in \mathcal{CM}([0,+\infty[,\mathbb{R}_+)$ une fonction décroissante et intégrable.
Alors la série $\sum f(n)$ est convergente et, en posant $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)dt$, on a :

$$I \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} f(n) \leqslant I + f(0) \quad \text{et donc} \quad \left| I - \sum_{n=0}^{+\infty} f(n) \right| \leqslant f(0)$$

Démonstration. Faire une comparaison série-intégrale pour les sommes partielles et passer à la limite. □

Remarque. On peut sans difficulté adapter le résultat précédent pour encadrer les restes de certaines séries convergentes. En effet, si $f \in \mathcal{CM}([n_0,+\infty[,\mathbb{R}_+)$ est une fonction décroissante et intégrable, alors la série $\sum f(n)$ est convergente et :

$$\forall n \geqslant n_0, \ \int_n^{+\infty} f(t)dt \leqslant \sum_{k=n}^{+\infty} f(k) \leqslant f(n) + \int_n^{+\infty} f(t)dt$$

Interprétation géométrique

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la quantité $\left| f(n) - \displaystyle\int_n^{n+1} f(t)dt \right|$ représente l'aire géométrique de la portion de graphe située entre la droite d'équation $y = f(n)$ et la courbe d'équation $y = f(x)$ pour des abscisses x décrivant $[n, n+1]$.

La quantité positive $\left| \displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)dt - \sum_{n=0}^{+\infty} f(n) \right|$ est la somme de ces aires, que l'on majore par $f(0)$, aire d'un rectangle de largeur 1 et de hauteur $f(0)$ dans lequel on peut déplacer les hypographes qui correspondent aux aires précédentes.

Exemple. $\displaystyle\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$

La propriété suivante traite le cas d'une fonction continue par morceaux, positive, décroissante et intégrable sur l'intervalle ouvert $]0,+\infty[$. On se donne donc une telle fonction f.

Théorème 21 :

La série $\sum f(n)$ est convergente et l'on a :

$$\left| \int_0^{+\infty} f(t)dt - \sum_{n=1}^{+\infty} f(n) \right| \leqslant \int_0^1 f(t)dt$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la quantité $\left| f(n) - \int_{n-1}^{n} f(t)dt \right|$ représente l'aire géométrique de la portion de graphe située entre la droite d'équation $y = f(n)$ et la courbe d'équation $y = f(x)$ pour des abscisses x décrivant $[n-1, n]$.

La quantité positive $\left| \int_0^{+\infty} f(t)dt - \sum_{n=0}^{+\infty} f(n) \right|$ est la somme de ces aires, que l'on majore par $\int_0^1 f(t)dt$.

Approfondissement : comparaison série-intégrale sans monotonie

Dans l'exemple qui suit, on traite le cas d'une fonction positive croissante puis décroissante. Cette situation peut se généraliser.

Exemple. Pour $x > 0$, on pose $u_n(x) = \sqrt{n}e^{-x\sqrt{n}}$. Équivalent en 0^+ de $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$.

Exercice 7. Pour tout $n \geqslant 2$, on pose $u_n = \int_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}}$.
En effectuant une comparaison avec l'intégrale $\int_0^n \frac{dt}{\sqrt{t(n-t)}}$, montrer que la suite (u_n) est convergente et préciser sa limite.

4 Sommation des relations de comparaison

4.1 Cas convergent

Théorème 22 :

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries numériques, la série $\sum v_n$ étant convergente et à terme général **réel positif**.

- Si $u_n = O(v_n)$, alors $R_n(u) = O(R_n(v))$.
- Si $u_n = o(v_n)$, alors $R_n(u) = o(R_n(v))$.
- Si $u_n \sim v_n$, alors $R_n(u) \sim R_n(v)$.

Exemple. Équivalent de $\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$.

Attention Ne pas oublier de vérifier le caractère positif (au moins à partir d'un certain rang) de la série de référence $\sum v_n$.

Exemple. Équivalent puis développement asymptotique à deux termes de $\displaystyle\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{\ln(k+1)-\ln(k)}{k}$.

Point méthode. Lorsque u_{n+1}/u_n admet une limite non nulle différente de 1, pour trouver un équivalent du reste, on peut sommer l'équivalent $u_{n+1} \sim l u_n$. Si (u_n) et positive sommable et vérifie ces conditions, on peut montrer alors que

$$R_n \sim \frac{u_n}{1-l}$$

Exercice 8. Équivalent, développement asymptotique à 2 termes, puis développement asymptotique à 2026 termes de $\displaystyle\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k!}$.

4.2 Cas divergent

Théorème 23 :

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries numériques, la série $\sum v_n$ étant divergente et à terme général **réel positif**.

- Si $u_n = O(v_n)$, alors $S_n(u) = O(S_n(v))$.
- Si $u_n = o(v_n)$, alors $S_n(u) = (S_n(v))$.
- Si $u_n \sim v_n$, alors $S_n(u) \sim S_n(v)$.

Exemple.

1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite telle que $u_n \sim \dfrac{1}{n^\alpha}$ avec $\alpha < 1$. Alors : $S_n(u) \sim \dfrac{1}{1-\alpha} n^{1-\alpha}$.
2. Développement asymptotique de $H_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ (utiliser plutôt H_{n-1}).

   On trouve : $H_n = \ln(n) + \gamma + \dfrac{1}{2n} - \dfrac{1}{12n^2} + O\left(\dfrac{1}{n^3}\right)$.

Attention Ne pas oublier de vérifier le caractère positif (au moins à partir d'un certain rang) de la série de référence $\sum v_n$.

Théorème 24 : Théorème de Cesàro - cas fini

Soit $u \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ une suite convergente, de limite l. Alors on a :

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} u_k \xrightarrow[n\to+\infty]{} l$$

Théorème 25 : Théorème de Cesàro - cas infini

Soit $u \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ une suite convergente, de limite $+\infty$. Alors on a :

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} u_k \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$$

Remarque. En remplaçant u_n par $-u_n$, on obtient un résultat similaire pour une suite qui diverge vers $-\infty$.

4.3 Application à l'étude asymptotique de suites récurrentes

Exemple. Convergence et développement asymptotique d'une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sin(u_n)$$

Exemple. Même étude avec $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}\arctan(u_n)$.

5 Étude de convergence de séries à termes quelconques

Lorsque la série n'est pas à terme général réel positif ou qu'elle ne converge pas absolument, les résultats précédents ne peuvent pas être utilisées. On dispose néanmoins des techniques suivantes pour en étudier la convergence.
Hormis le théorème des séries alternées, aucun des résultats ci-dessous n'est au programme. En revanche, les techniques sont à connaître et à savoir mettre en œuvre pour résoudre les exercices.

5.1 Séries alternées

Définition 9

On dit que la série réelle $\sum u_n$ est **alternée** si $(-1)^n u_n$ est un réel de signe constant (au sens large).

Théorème 26 : Théorème des séries alternées

Une série alternée dont le terme général décroît en module et tend vers 0 est convergente. De plus, $R_n(u)$ est du signe de son premier terme u_{n+1}, et l'on a :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ |R_n(u)| \leqslant |u_{n+1}|$$

Attention Si le terme général ne décroît pas en module, la série peut très bien diverger. par exemple pour :

$$u_{2n} = \frac{1}{2^n} \quad \text{et} \quad u_{2n+1} = -\frac{1}{2n+1}$$

Exemple. Sous les mêmes hypothèses, les sommes partielles sont du signe du premier terme.

5.2 Utilisation d'un développement asymptotique du terme général (HP)

Remarque. Si le terme général d'une série alternée tend vers 0 mais ne décroît pas en module, on peut faire un développement limité du terme général.

Exemple. Comportement de $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n^\alpha + (-1)^n}$ en fonction de $\alpha \in \mathbb{R}$.

5.3 Sommation par tranches (HP)

Exemple. $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n + (-1)^n}$ en regroupant par tranches de 2.

Soit φ une extraction telle que $\varphi(0) = 0$ et $\sum u_n$ une série. On définit :

$$v_n = \sum_{p=\varphi(n)}^{\varphi(n+1)-1} u_p$$

La série $\sum v_n$ s'appelle série regroupée de la série $\sum u_n$. On a $S_n(v) = S_{\varphi(n+1)-1}(u)$.
Les sommes partielles de la série regroupée forment donc une sous-suite de la suite des sommes partielles de la série de départ. La convergence de la série $\sum u_n$ entraîne ainsi la convergence de $\sum c_n$, avec égalité des sommes, mais al réciproque est évidemment fausse puisque cela signifierait que la convergence d'une sous-suite suffirait à prouver la convergence de la suite.

Exemple. $u_n = (-1)^n$

La réciproque devient vraie dans les deux cas suivants.

Théorème 27 :

La convergence d'une série regroupée à terme général **positif** entraîne la convergence de la série.

Dans le cas général, on a besoin d'une hypothèse supplémentaire.

Théorème 28 :

Avec les notations précédentes, si $\sum_{p=\varphi(n)}^{\varphi(n+1)-1} |u_p|$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$, alors la convergence de $\sum v_n$ entraîne celle de $\sum v_n$ et on a : $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.

Cette hypothèse est réalisée en particulier dans chacun des cas suivants :

- $u_n \to 0$ et $\varphi(n+1) - \varphi(n)$ est bornée ;
- la suite est réelle et le termes de chaque tranche sont du même signe.

Exemple. $\displaystyle\sum \frac{e^{2in\pi/3}}{n}$

Exercice Moulin.SSN.32 (on pourra remarquer que $1 = -1/2 + 3/2$)

5.4 Transformation d'Abel (HP)

La transformation d'Abel est l'équivalent discret de l'intégration par parties et, de même que celle-ci permet de montrer une semi-convergence d'intégrales, celle-là est utile pour montrer une semi-convergence de séries.

- La **dérivée** d'une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite $(u_{n+1}-u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, ou alternativement $(u_n-u_{n-1})_{n\in\mathbb{N}}$ avec la convention $u_{-1}=0$.
- Une **primitive** d'une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite dont la dérivée est $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, par exemple la suite des sommes partielles de $\sum u_n$ ou, en cas de convergence, l'opposée de la suite des restes.

Exercice 9. Soit (a_n) et (b_n) deux suites à valeurs dans $\mathbb{K}$ et (A_n) une suite vérifiant $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = A_n - A_{n-1}$ (en définissant A_{-1} pour que la relation soit vérifiée pour $n=0$). Montrer :

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = A_n b_n - A_{-1} b_0 - \sum_{k=0}^{n-1} A_k (b_{k+1} - b_k)$$

Théorème 29 :

Si les sommes partielles de $\sum a_n$ sont bornées et si la série $\sum (b_{n+1} - b_n)$ converge absolument (par exemple si (b_n) tend vers 0 en décroissant), alors la série $\sum a_n b_n$ converge.

Exercice 10. Donner une majoration du module du reste.

Exemple. Série de terme général $\dfrac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$ avec $\theta \neq 0[2\pi]$ et $0 < \alpha \leqslant 1$.

5.5 Utilisation d'une primitive (HP)

Pour étudier une série $\sum f(n)$ semi-convergente, on peut considérer une primitive F de f et montrer que la série de terme général $f(n) - (F(n+1) - F(n))$ converge (absolument). la série $\sum f(n)$ converger alors si, et seulement si, $F(n)$ admet une limite finie.

Exemple. $\sum n^z$ pour $z \in \mathbb{C}$.

Lorsque f est un produit, on peut calculer une primitive de f à l'aide d'une intégration par parties (dans le bons sens !). On conserve le terme tout intégré en s'assurant que le deuxième est bien négligeable devant celui-ci.

Exemple. $\sum \dfrac{e^{i\sqrt{n}}}{n}$

Exercice Moulin.SSN.36