Table des matières

1 Généralités **2**
1.1 Définition . . . 2
1.2 Inégalités triangulaires . . . 3
1.3 Distance associée à une norme . . . 4
1.4 Espaces métriques (HP) . . . 5
1.5 Boule fermée, boule ouverte . . . 6
1.6 Convexité dans un espace vectoriel normé . . . 7
1.7 Exemples d'espaces vectoriels normés . . . 8
1.8 Obtention de nouveaux espaces vectoriels normés . . . 10
1.9 Distance à une partie . . . 12
1.10 Partie bornée, application bornée . . . 13

2 Suites d'éléments d'un espace vectoriel normé **15**
2.1 Suite convergente . . . 15
2.2 Suite à valeurs dans un espace produit . . . 17
2.3 Suite extraite, valeur d'adhérence . . . 18

3 Séries à valeurs dans un espace vectoriel normé **19**
3.1 Suites et séries . . . 19
3.2 Convergence absolue . . . 21

4 Topologie d'un espace métrique **21**
4.1 Parties ouvertes . . . 21
4.2 Parties fermées . . . 23
4.3 Voisinage d'un point . . . 24
4.4 Extension (HP) aux voisinages de l'infini . . . 25
4.5 Point intérieur, intérieur d'une partie . . . 26
4.6 Point adhérent, adhérence d'une partie . . . 27
4.7 Densité . . . 29
4.8 Frontière . . . 29
4.9 Ouvert relatif, fermé relatif, voisinage relatif . . . 30
4.10 Espaces topologiques (HP) . . . 31

5 Comparaison de normes **32**
5.1 Norme dominée par une autre . . . 33
5.2 Normes équivalentes . . . 34

Topologie des espaces vectoriels normés

Dans tout le chapitre, la lettre $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou le corps $\mathbb{C}$. Tous les espaces vectoriels considérés sont des espaces vectoriels réels ou complexes.

1 Généralités

1.1 Définition

Définition 1

Étant donné un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E, on appelle **norme sur** E toute application N de E dans $\mathbb{R}_+$ vérifiant les trois propriétés suivantes :

- **homogénéité** : $\forall(\lambda, x) \in \mathbb{K} \times E,\ N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$;
- **inégalité triangulaire** : $\forall(x, y) \in E^2,\ N(x + y) \leqslant N(x) + N(y)$;
- **séparation** : $\forall x \in E,\ N(x) = 0 \implies x = 0$.

Tout espace vectoriel muni d'une norme est appelé **espace vectoriel normé**.

Notations

- On note (E, N) pour désigner l'espace vectoriel E muni d'une norme N. Lorsqu'il n'y a pas de risque d'ambiguïté quant à la norme utilisée, on peut ne pas la préciser et se contenter de noter E.
- La plupart du temps, il est d'usage de noter $\|\cdot\|$ la norme utilisée, et donc $\|x\|$ la norme d'un vecteur x.

Remarque.
- Si N est une norme, alors la propriété d'homogénéité implique que $N(0) = 0$. Dans la définition précédente, l'implication utilisée pour formuler la propriété de séparation est donc une équivalence.
- Une application de E dans $\mathbb{R}_+$ qui vérifie l'inégalité triangulaire et l'homogénéité est appelée une **semi-norme** (HP).

Exemple.
1. L'application $x \mapsto |x|$ est une norme sur $\mathbb{K}$ (où $|\cdot|$ désigne la valeur absolue sir $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et le module sir $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).
2. Les applications :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K} & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ (x, y) & \longmapsto & \max(|x|, |y|) \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{K} & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ (x, y) & \longmapsto & |x| + |y| \end{array}$$

sont des normes sur $\mathbb{K}^2$, appelées respectivement **norme infinie** et **norme un**, et notées $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$.

Théorème 1 :

Soit E un espace préhilbertien réel, c'est-à-dire un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'un produit scalaire $(\cdot \mid \cdot)$. L'application $x \mapsto \sqrt{(x \mid x)}$ est une norme sur E, appelée **norme euclidienne** associée au produit scalaire $(\cdot \mid \cdot)$.

Exemple. De la proposition précédente, on déduit que les espaces préhilbertiens réels sont naturellement munis d'une structure d'espace vectoriel normé :

1. l'espace $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique
$$((x_1, \dots, x_n) \mid (y_1, \dots, y_n)) = \sum_{k=1}^{n} x_k y_k$$
dont la norme associée est donnée par $\|(x_1, \dots, x_n)\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$;
2. l'espace $\mathcal{C}^0([a,b], \mathbb{R})$ (avec $a < b$) muni du produit scalaire $(f \mid g) = \displaystyle\int_a^b fg$ dont la norme associée est donnée par $\|f\| = \sqrt{\displaystyle\int_a^b f^2}$.

Terminologie Dans chacun des deux exemples précédents, la norme euclidienne considérée est appelée **norme deux**. Tout cela sera précisé dans la section "Exemples d'espaces vectoriels normés".

Vecteur unitaire

Définition 2

On dit qu'un vecteur x d'un espace vectoriel normé E est **unitaire** lorsque $\|x\| = 1$.

Exercice 1. On suppose que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Soit x un vecteur non nul d'un espace vectoriel normé E. Montrer qu'il existe un unique vecteur unitaire colinéaire à x et de même sens que lui.

Terminologie Étant donné un vecteur x non nul de E, le vecteur $\dfrac{x}{\|x\|}$ est appelé **vecteur unitaire associé à** x.

Exercice 2. Donner une condition nécessaire et suffisante sur E pour qu'il existe dans E des vecteurs unitaires.

1.2 Inégalités triangulaires

Nous avons défini l'inégalité triangulaire (propriété vérifiée par toute norme par définition) de la manière suivante :
$$\forall (x,y) \in E^2,\ \|x+y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$$

De manière plus complète, nous regroupons sous le nom d'*inégalités triangulaires* les inégalités du résultat suivant :

Théorème 2 : Inégalités triangulaires

Soit x et y deux vecteurs d'un espace vectoriel normée E. Alors on a :

$$|\|x\| - \|y\|| \leqslant \|x \pm y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$$

Terminologie L'inégalité $|\|x\| - \|y\|| \leqslant \|x \pm y\|$ est parfois appelée *seconde inégalité triangulaire*.

Exercice 3.
1. Montrer que si x et y sont positivement colinéaires, alors $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$.
2. On se place dans $\mathbb{R}^2$ muni de la norme un. Exhiber deux vecteurs u_1 et u_2 non colinéaires tels que $\|u_1 + u_2\| = \|u_1\| + \|u_2\|$.

Attention

- Contrairement à l'intuition géométrique, et comme le montre l'exercice précédent, dans le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire, on ne peut, *a priori*, rien en déduire.
- En revanche, si la norme considérée est euclidienne, c'est-à-dire si elle est associée à un produit scalaire, alors le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire est celui où les deux vecteurs sont positivement colinéaires.

Exercice 4. Démontrer l'affirmation précédente.

Inégalité triangulaire généralisée La propriété d'homogénéité combinée à l'inégalité triangulaire permet, par récurrence, de montrer que si $x_1, \ldots, x_n$ sont des éléments de E et $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ sont des scalaires, alors on a :

$$\left\| \sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k \right\| \leqslant \sum_{k=1}^{n} |\lambda_k| \|x_k\|$$

Dorénavant, nous utiliserons librement ce résultat.

Exercice 5. Montrer réciproquement qu'une application $N : E \to \mathbb{R}_+$ qui vérifie :

$$\forall (x, y) \in E^2,\ \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2,\ \|\lambda x + \mu y\| \leqslant |\lambda| \|x\| + |\mu| \|y\|$$

est une semi-norme.

1.3 Distance associée à une norme

Définition 3

On appelle **distance associée à la norme** $\|\cdot\|$ l'application :

$$d : \begin{array}{ccc} E^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto & \|x - y\| \end{array}$$

Exercice 6. Montrer que la distance d associée à la norme $\|\cdot\|$ vérifié les propriétés suivantes :

- **séparation** : $\forall (M,N) \in E^2,\ d(M,N) = 0 \iff M = N$;
- **symétrie** : $\forall (M,N) \in E^2,\ d(M,N) = d(N,M)$;
- **inégalité triangulaire** : $\forall (M,N,P) \in E^3,\ d(M,P) \leqslant d(M,N) + d(N,P)$;
- **invariance par translation** : $\forall (M,N,u) \in E^3,\ d(M+u, N+u) = d(M,N)$.

Formulation des inégalités triangulaires en termes de distance

Théorème 3 :

Si M, N et P désignent trois points de E, alors on a :

$$|d(M,N) - d(N,P)| \leqslant d(M,P) \leqslant d(M,N) + d(N,P)$$

De manière moins formelle, l'inégalité $d(M,P) \leqslant d(M,N) + d(N,P)$ signifie que dans un espace vectoriel normé, les propriétés "géométriquement intuitives" suivantes sont vraies :

- dans un triangle, la longueur d'un côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres ;
- *un* plus court chemin entre deux points est la ligne droite.

Attention Bien comprendre la raison d'un choix de l'article indéfini *un* dans la phrase "*un* plus court chemin entre deux points" : la ligne droite est un plus court chemin entre deux points, mais ce n'est pas nécessairement le seul (du moins si la norme n'est pas euclidienne ; produit un exemple).

1.4 Espaces métriques (HP)

Définition 4

Soit A un ensemble. Une application $d : A^2 \to \mathbb{R}_+$ est une **distance** sur A si elle vérifie les trois axiomes :

(1) **séparation** : $\forall (x,y) \in A^2,\ d(x,y) = 0 \iff x = y$;

(2) **symétrie** : $\forall (,y) \in A^2,\ d(x,y) = d(y,x)$;

(3) **inégalité triangulaire** : $\forall (x,y,z) \in A^3,\ d(x,z) \leqslant d(x,y) + d(y,z)$.

Un ensemble A muni d'une distance est appelé un **espace métrique**.

Remarque.

- Si on remplace (1) par $d(x,x) = 0$ (suppression de la séparation), d est alors appelé une **semi-distance** sur A.
- Des axiomes (2) et (3) on tire l'inégalité :

$$d(x,z) \geqslant |d(x,y) - d(y,z)|$$

d'où la propriété : "dans un triangle, la longueur de tout côté est comprise entre la somme et la différence des longueurs des deux autres".

Exemple. Sur $\mathbb{K}$, la distance usuelle $(x, y) \mapsto |x - y|$ associée à la norme $|\cdot|$.

Plus généralement :

Exemple. Si (E, N) est un espace vectoriel normé, et si A est une partie de E, l'application $(x, y) \mapsto \|x - y\|$ définit une distance sur A.
En particulier, E muni de la distance associée à N est un espace métrique.

Mais il existe des espaces métriques plus exotiques dont la distance n'est pas directement associée à une norme.

Exemple. Sur n'importe quel ensemble A, la **distance discrète** définie par :

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{si } x \neq y \end{cases}$$

fait de A un espace métrique.

Exemple. Soit d une distance sur un ensemble A. Montrer que $\delta : (x, y) \mapsto \min(1, d(x, y))$ définit également une distance sur A.

Exemple. Dans $\mathbb{C}$, on définit $d(a, b) = |b - a|$ sir a et b sont positivement colinéaires, et $d(a, b) = |a| + |b|$ sinon. d est une distance sur $\mathbb{C}$, appelée **distance SNCF**.

Remarque. Toutes les définitions et propriétés qui vont suivre seront formulées dans le cas d'un espace métrique non vide (E, d). Pour rester dans le programme, il suffit de considérer un espace vectoriel normé E et sa distance d associée.

1.5 Boule fermée, boule ouverte

Définition 5

Soit a un élément de E et r un réel strictement positif.

- On appelle **boule ouverte de centre a et de rayon r**, et l'on note $B_o(a, r)$ la partie :

$$B_o(a, r) = \{x \in E \ : \ d(a, x) < r\}$$

- On appelle **boule fermée de centre a et de rayon r**, et l'on note $B_f(a, r)$ la partie :

$$B_f(a, r) = \{x \in E \ : \ d(a, x) \leqslant r\}$$

- On appelle **sphère de centre a et de rayon r**, et l'on note $S(a, r)$ la partie :

$$S(a, r) = \{x \in E \ : \ d(a, x) = r\} = B_f(a, r) \setminus B_o(a, r)$$

Notation Dans $\mathbb{C}$, on parle plutôt de *disque*, et l'on utilise alors les notations $D_o(a, r)$ et $D_f(a, r)$ au lieu de $B_o(a, r)$ et $B_f(a, r)$ respectivement.

Remarque. Il est clair, d'après la définition, que les boules dépendant de la distance considérée sur E : une partie de E peut être une boule pour une distance et ne pas l'être pour une autre distance.

Exemple. Boules et sphères pour la distance discrète.

Exercice 7. Quelles sont les boules fermés pour la distance SNCF ? Expliquer cette appellation.

1.6 Convexité dans un espace vectoriel normé

Dans cette section, E est un espace vectoriel réel ou complexe.

Parties convexes

Définition 6

Une partie A de E est dite **convexe** si :

$$\forall (x,y) \in A^2,\ \forall \lambda \in [0,1],\ (1-\lambda)x + \lambda y \in A$$

Exemple.
1. L'ensemble vide est convexe.
2. Tout singleton est convexe.
3. Tout sous-espace affine de E est convexe.
4. Les parties convexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.

Terminologie Étant donnés deux points x et y, l'ensemble des points de la forme

$$(1-\lambda)x + \lambda y \quad \text{avec} \quad \lambda \in [0,1]$$

est appelé **segment** $[x,y]$.

Interprétation géométrique Dire qu'une partie A est convexe signifie qu'étant donnés deux points de A, le segment reliant ces deux points est inclus dans A.

Théorème 4 : Stabilité par passage au barycentre à coefficients positifs (HP)

Si A est une partie convexe d'un espace vectoriel réel E, alors on a :

$$\forall p \in \mathbb{N}^*,\ \forall (x_1,\dots,x_p) \in A^p,\ \forall (\lambda_1,\dots,\lambda_p) \in \mathbb{R}_+^p,\ \sum_{k=1}^{p} \lambda_k = 1 \implies \sum_{k=1}^{p} \lambda_k x_k \in A$$

Démonstration. Procéder par récurrence. □

Exemple. Soit C un convexe de $\mathbb{C}$. Si X est une variable aléatoire finie à valeurs dans C, son espérance est également dans C.

Boules d'un espace vectoriel normé

Théorème 5 :

Toute boule (ouvert ou fermée) d'un espace vectoriel normé est une partie convexe.

Remarque. Dans un espace vectoriel normé, la connaissance de la boule unité fermée $B_f(0,1)$ suffit pour connaître toutes les boules fermées. En effet, si a est un élément de E et r un réel strictement positif, la boule $B_f(a,r)$ est l'image de $B_f(0,1)$ par...
Toutes les boules ont donc "la même forme".

Exemple. Sur un même plan, dessin des boules unité de $\mathbb{R}^2$ pour les normes infinie, un et deux.

Exercice Moulin.EVN.13

1.7 Exemples d'espaces vectoriels normés

Le résultat suivant sera utile pour prouver l'homogénéité d'une normé définie par une borne supérieure.

Théorème 6 :

Étant donnée A une partie non vide de $\mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{R}_+$, on a :

$$\sup(kA) = k \sup(A)$$

Remarque. Ce résultat s'applique en particulier si la partie A admet un plus grand élément, et l'on a dans ce cas $\max(kA) = k \max(A)$.

L'espace $\mathbb{K}^n$

Soit x un vecteur de $\mathbb{K}^n$ dont on note $(x_1, \ldots, x_n)$ les composantes.
L'espace $\mathbb{K}^n$ peut être peut être muni d'une structure d'espace vectoriel normé à l'aide de différentes normes, dont les trois normes classiques suivantes :

- la **norme infinie**, définie par :

$$\|x\|_\infty = \max(|x_1|, \ldots, |x_n|)$$

- la **norme un**, définie par :

$$\|x\|_1 = |x_1| + \cdots + |x_n|$$

- la **norme deux**, ou **norme euclidienne canonique**, définie par :

$$\|x\|_2 = \sqrt{|x_1|^2 + \cdots + |x_n|^2}$$

Théorème 7 :

Les trois applications :

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{K}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & \|x\|_\infty \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} \mathbb{K}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & \|x\|_1 \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} \mathbb{K}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & \|x\|_2 \end{array}$$

sont des normes. Chacune d'entre elles munit donc $\mathbb{K}^n$ d'une structure d'espace vectoriel normé.

Remarque. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, alors on peut aussi écrire $\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$.

Approfondissement : norme p Pour $p \geqslant 1$, il arrive parfois de munir $\mathbb{K}^n$ de la norme suivante, appelée **norme p**, définie ainsi :

$$\|x\|_p = (|x_1|^p + \cdots + |x_n|^p)^{1/p}$$

Pour plus de détails, voir l'exercice Moulin.EVN.6.

Généralisation à tout espace vectoriel muni d'une base

Plus généralement, si E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé non nul muni d'une base $\mathcal{B} = (u_i)_{i \in I}$, alors on dispose sur E des trois normes classiques suivantes, appelées respectivement, **norme infinie**, **norme un** et **norme deux** :

$$\|x\| = \max_{i \in I} |x_i| \ ; \ \|x\|_1 = \sum_{i \in I} |x_i| \text{ et } \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i \in I} |x_i|^2}$$

où, étant donné un élément x de E, la famille $(x_i)_{i \in I}$ désigne les composantes de x dans la base $\mathcal{B}$.

Remarque. Les définitions ci-dessus des normes un, deux et infinie sont licites car, par définition, la famille $(x_i)_{i \in I}$ des composantes de x dans la base $\mathcal{B}$ est à support fini (c'est-à-dire ne comporte qu'un nombre fini de termes non nuls).

Espace des fonctions bornées

L'ensemble $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ des fonctions bornées d'un ensemble X non vide à valeurs dans $\mathbb{K}$ est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{K}$-espace vectoriel $\mathcal{F}(X, \mathbb{K})$ des applications de X dans $\mathbb{K}$.

Théorème 8 :

L'application :

$$\mathcal{N}_\infty \quad \begin{array}{rcl} \mathcal{B}(X, \mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ f & \longmapsto & \sup\limits_X |f| \end{array}$$

est une norme sur $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$. On l'appelle **norme infinie**.

La norme infinie munit donc $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ d'une structure d'espace vectoriel normé.

Exemple. Cela s'applique en particulier à l'espace vectoriel $\mathcal{B}(\mathbb{N},\mathbb{K})$ des suites bornées à valeurs dans $\mathbb{K}$. Pour $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, on a :

$$\mathcal{N}_\infty(u) = \sup_{\mathbb{N}} |u_n|$$

Espace des fonctions continues sur un segment

Soit a et b deux réels tels que $a < b$. On note $\mathcal{C}([a,b],\mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues du segment $[a,b]$ dans $\mathbb{K}$. On sait que $\mathcal{C}([a,b],\mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}([a,b],\mathbb{K})$, et même de $\mathcal{B}([a,b],\mathbb{K})$.
Cet espace peut être muni d'une structure d'espace vectoriel normé, en particulier à l'aide des deux normes classiques suivantes :

- la **norme un**, définie par : $\mathcal{N}_1(f) = \displaystyle\int_a^b |f|$;
- la **norme deux**, définie par : $\mathcal{N}_2(f) = \sqrt{\displaystyle\int_a^b |f|^2}$

Exercice 8. Montrer que ces applications sont des normes sur $\mathcal{C}([a,b],\mathbb{K})$. Sont-elles des normes sur $\mathcal{CM}([a,b],\mathbb{K})$?

Approfondissement : norme p Pour $p \geqslant 1$, on munit parfois l'espace $\mathcal{C}([a,b],\mathbb{K})$ de la norme suivante, appelée **norme p**, définie ainsi :

$$\mathcal{N}_p(f) = \left(\int_a^b |f|^p\right)^{1/p}$$

Pour plus de détails, voir l'exercice Moulin.EVN.07.

1.8 Obtention de nouveaux espaces vectoriels normés

Norme induite

Si F est un sous-espace vectoriel de E, alors la norme $\|\cdot\|$ dont on dispose sur E induit naturellement une structure d'espace vectoriel normé sur F, par sa restriction à F :

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & \|x\|. \end{array}$$

Cette restriction est appelé **norme induite** sur F par la norme $\|\cdot\|$.

Exemple.

1. La valeur absolue sur $\mathbb{R}$ est induite par le module sur $\mathbb{C}$.
2. Soit a et b deux réels tels que $a < b$. Il est clair que $\mathcal{C}([a,b],\mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{B}([a,b],\mathbb{K})$, dont on a vu que la norme infinie le munissait d'une structure d'espace vectoriel normé. La norme induit associée :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}([a,b],\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ f & \longmapsto & \mathcal{N}_\infty(f) \end{array}$$

constitue alors, en plus des normes un et deux, une autre norme sur $\mathcal{C}([a,b],\mathbb{K})$.

Application à $\mathbb{K}[X]$

En considérant $\mathbb{K}[X]$ comme l'espace vectoriel des suites presque nulles, on peut le munir des trois normes usuelles définies à l'aide des coordonnées dans la base canonique par :

$$\|P\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| \quad \|P\| = \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2} \quad \text{et} \quad \|P\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n|$$

où $P = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n$, la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ étant nulle à partir d'un certain rang. En effet, ces trois normes sont naturellement définies sur des espaces de suites plus grands.
Mais on peut aussi considérer un polynôme comme une fonction continue sur un segment $[a, b]$ avec $a < b$, ce qui permet également de munir $\mathbb{K}[X]$ des trois normes usuelles :

$$\mathcal{N}_1(P) = \int_a^b |P| \quad \mathcal{N}_2(P) = \sqrt{\int_a^b |P|^2} \quad \text{et} \quad \mathcal{N}_\infty(P) = \max_{[a,b]} |P|$$

Exercice 9. Pourquoi s'agit-il effectivement de normes ?

Utilisation d'une application linéaire injective

Soit E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels. Si l'on dispose d'une norme $\|\cdot\|$ sur E, et si u est une application linéaire injective de F dans E, alors l'application :

$$\begin{array}{rccc} N: & F & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ & x & \longmapsto & \|u(x)\| \end{array}$$

est une norme sur F.

Exemple.

1. On retrouve ainsi les résultats de l'exercice précédent.
2. Si F est un sous-espace vectoriel de E, alors la norme induite sur F par celle de E n'est rien d'autre que la norme obtenue en utilisant l'injection canonique de F dans E comme application linéaire injective.
3. Soi $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. Notons $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$.
   Si $\omega : [a, b] \to \mathbb{K}$ est une fonction continue et à valeurs strictement positives, alors l'application :
   $$\begin{array}{rccc} N: & E & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_a^b \omega(x)|f(x)|dx \end{array}$$
   est une norme sur E. En effet, c'est la norme que l'on obtient avec la norme 1 et l'application linéaire injective :
   $$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ f & \longmapsto & (x \mapsto \omega(x)f(x)) \end{array}$$

Produit fini d'espaces vectoriels normés

Théorème 9 :

Soit $p \in \mathbb{N}^*$ ainsi que p espaces vectoriels normés $(E_1, \|\cdot\|_1), \ldots, (E_p, \|\cdot\|_p)$. Alors, l'application :

$$\begin{array}{rcl} E_1 \times \cdots \times E_p & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ (x_1, \ldots, x_p) & \longmapsto & \max(\|x_1\|_1, \ldots, \|x_p\|_p) \end{array}$$

est une norme, et munit donc l'espace produit $E_1 \times \cdots \times E_p$ d'une structure d'espace vectoriel normé. Cette norme est appelée **norme produit**.

Exemple. La norme infinie sur $\mathbb{K}^n$ est la norme produit obtenue en considérant, sur $\mathbb{K}$, la norme $x \mapsto |x|$.

Remarque. En plus de la norme produit présentée dans la proposition précédente, d'autres normes peuvent être considérées sur un espace produit, comme le montre l'exercice suivant.

Exercice 10. Avec les notations de la proposition précédente, montrer que les applications N_1 et N_2 définies par :

$$N_1 : \begin{array}{rcl} E_1 \times \cdots \times E_p & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ (x_1, \ldots, x_p) & \longmapsto & \displaystyle\sum_{k=1}^{p} \|x_k\|_k \end{array} \quad \text{et} \quad N_2 : \begin{array}{rcl} E_1 \times \cdots \times E_p & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ (x_1, \ldots, x_p) & \longmapsto & \sqrt{\displaystyle\sum_{k=1}^{p} \|x_k\|_k^2} \end{array}$$

sont des normes sur l'espace produit $E_1 \times \cdots \times E_p$.

Remarque. Plus généralement, si $(E_1, d_1), \ldots, (E_p, d_p)$ sont des espaces métriques, on peut définie la **distance produit** sur $E_1 \times \cdots \times E_p$ en posant :

$$d((x_1, \ldots, x_p), (y_1, \ldots, y_p)) = \max(d_1(x_1, y_1), \ldots, d_p(x_p, y_p))$$

Exercice 11. Dans l'espace produit $E \times F$:

1. Quelle est la boule fermée (respectivement ouverte) centrée en $(a, b) \in E \times F$ et de rayon $r > 0$?
2. Quelle est la sphère centrée en $(a, b) \in E \times F$ et de rayon $r > 0$?

1.9 Distance à une partie

Définition 7

Étant donnée une partie A non vide de E ainsi qu'un élément x de E, on appelle la **distance de x à A**, et on note $d(x, A)$, la quantité :

$$d(x, A) = \inf \{d(x, a) \mid a \in A\}$$

Remarque. Avec les notations de la définition précédente :

1. Le caractère non vide de A implique que $\{d(x, a) \mid a \in A\}$ est une partie non vide de $\mathbb{R}$ minorée par 0, ce qui assure l'existence de sa borne inférieure et le fait que celle-ci soit positive ;

2. Dans le cas d'un espace vectoriel normé, par définition de la distance d associée à la norme, on a aussi :
$$d(x, A) = \inf\{\|x - a\| \ \mid \ a \in A\}$$

Théorème 10 :

Soit A une partie non vide de E ainsi que x et y deux éléments de E. On a :
$$|d(x, A) - d(y, A)| \leqslant d(x, y)$$

Démonstration. Commencer par démontrer l'inégalité $d(x, A) - d(y, A) \leqslant d(x, y)$ puis utiliser la symétrie en x et y. □

Remarque. Le résultat précédente se reformule ainsi : l'application
$$\begin{array}{rcl} (E, \|\cdot\|) & \longrightarrow & (\mathbb{R}, |\cdot|) \\ x & \longmapsto & d(x, A) \end{array}$$
est 1-lipschitzienne.

Attention

- Si x appartient à A, alors il est clair que $d(x, A) = 0$. En revanche, la réciproque est fausse. Par exemple, dans $\mathbb{R}$ muni de la valeur absolue, on a $d(0, \mathbb{R}_+^*) = 0$ et pourtant $0 \notin \mathbb{R}_+^*$.
- Comme le prouve le cas de la distance de à à $\mathbb{R}_+^*$, il n'existe pas toujours d'élément $a \in A$ tel que $d(x, A) = d(x, a)$. Lorsqu'un tel élément existe, on dit que la distance de x à A est atteinte.

Exercice 12. Soit B une boule de centre a et de rayon $r > 0$ d'un espace vectoriel normé E, et x un élément de E. Exprimer, en fonction de a, r et x, la distance de x à B.

Remarque. Il est clair, d'après la définition, que la notion de distance à une partie dépend de la distance (ou de la norme) utilisée. L'exercice suivant permet de bien s'en rendre compte.

Exercice 13. Dans $\mathbb{R}^2$, soit x le point $(-1, 1)$ et A la droite d'équation $y = 2x$. pour chacune des normes un, deux et infinie, déterminer la distance de x à A, et donner les points où cette distance est atteinte.

Exercice 14. Étant données deux parties A et B de E non vides, on pose :
$$d(A, B) = \inf\{d(a, b) \ \mid \ (a, b) \in A \times B\}$$
Quels sont les axiomes d'une distance qui sont vérifiés par une telle application ?

1.10 Partie bornée, application bornée

Partie bornée

Définition 8

Le **diamètre** d'une partie A de E est défini dans $\overline{\mathbb{R}}_+$ par :

$$\operatorname{diam}(A) = \sup\{d(x,y) \ \mid \ (x,y) \in A^2\}$$

si A est non vide, et vaut 0 sinon.
On dit qu'une partie A est **bornée** si son diamètre est fini.

Propriétés

1. Le diamètre est une fonction croissante pour l'inclusion :

$$A \subset B \implies \operatorname{diam}(A) \leqslant \operatorname{diam}(B)$$

   (ce qui justifie $\operatorname{diam}(\emptyset) = 0$, s'il en était besoin...).
2. Pour A et B non vides, on a $\operatorname{diam}(A \cup B) \leqslant \operatorname{diam}(A) + \operatorname{diam}(B) + d(A,B)$.
3. La réunion de deux (et donc par récurrence d'un nombre fini de) parties bornées est bornée.

Exemple.
1. Pour la distance discrète, toute partie est bornée.
2. Tout segment d'un espace vectoriel normé est borné. Quel est son diamètre ?

Exercice 15.
1. Montrer que toute boule de rayon $r > 0$ d'un espace métrique est bornée de diamètre inférieur à $2r$.
2. Donner un exemple de boule de rayon $r > 0$ de diamètre strictement inférieur à $2r$.
3. Montrer que dans un espace vectoriel normé non réduit à $\{0\}$, les boules de rayon $r > 0$ sont toutes de diamètre $2r$.

Théorème 11 : Caractérisation des parties bornées

Soit A une partie de E et $a \in E$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) A est bornée ;

(ii) il existe un réel $r > 0$ tel que $A \subset B_f(a,r)$.

Exemple. On retrouve que la réunion d'un nombre fini de parties bornées est une partie bornée.

Théorème 12 :

Soit E un espace vectoriel normé. Une partie A de E est bornée si, et seulement si :

$$\exists R \in \mathbb{R}_+ \ : \forall x \in A, \ \|x\| \leqslant R$$

Application bornée, suite bornée

Définition 9

On dit qu'une application f d'un ensemble X dans un espace métrique E est **bornée** si $f(X)$ est une partie bornée de E. Dans le cas d'un espace vectoriel normé, cela revient à dire qu'il existe $R \in \mathbb{R}_+$ tel que :

$$\forall x \in X,\ \|f(x)\| \leqslant R$$

Remarque.

- Une suite d'éléments $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de E n'étant rien d'autre qu'une application de $\mathbb{N}$ dans E, la définition précédente s'applique.
- Si E est un espace vectoriel normé, il est facile de vérifier que l'ensemble des applications bornées de X dans E est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{K}$-espace vectoriel $\mathcal{F}(X, E)$. des fonctions de X dans E.
- Il est clair, d'après la définition, que la notion de partie bornée (et donc de fonction ou suite bornée) dépend de la distance ou de la norme utilisée. Nous verrons :
  - ¤ qu'il est possible qu'une partie soit bornée pour une norme mais ne le soit pas pour une autre ;
  - ¤ que, néanmoins, deux normes équivalentes définissent les mêmes parties bornées ;
  - ¤ en particulier, en dimension finie, on peut choisir la norme que l'on veut pour vérifier qu'une partie est bornée.

2 Suites d'éléments d'un espace vectoriel normé

On rappelle qu'une suite a à valeurs dans un ensemble X est une application de $\mathbb{N}$ dans X. Une telle suite est souvent notée $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, voire plus simplement (a_n).
L'élément a_n, quant à lui, est appelé **terme général** de la suite a.

2.1 Suite convergente

Définition 10

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E. On dit que la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $l \in E$ si la suite réelle $(d(a_n, l))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0.

La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge donc vers $l \in E$ si, et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ : \forall n \in \mathbb{N},\ n \geqslant n_0 \implies d(a_n, l) \leqslant \varepsilon$$

ou encore :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ : \forall n \in \mathbb{N},\ n \geqslant n_0 \implies a_n \in B_f(l, \varepsilon)$$

Dans le cadre d'un espace vectoriel normé, cela s'écrit aussi :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ : \forall n \in \mathbb{N},\ n \geqslant n_0 \implies \|a_n - l\| \leqslant \varepsilon$$

Notation Pour signifier qu'une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers l, on écrit $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} l$ ou plus simplement $a_n \to l$.

Théorème 13 : Unicité de la limite

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E ainsi que l_1 et l_2 deux éléments de E. Si $a_n \to l_1$ et $a_n \to l_2$, alors $l_1 = l_2$.

Démonstration. Supposons que (a_n) tende vers l_1 et vers l_2. Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leqslant d(l_1, l_2) \leqslant d(a_n, l_1) + d(a_n, l_2)$$

En passant, à la limite, $d(l_1, l_2) = 0$ et on conclut par séparation de la distance d. □

Définition 11

Une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite **convergente** s'il existe un élément $l \in E$ tel que $a_n \to l$. Cet élément l est alors appelé **limite** de la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, et on le note $\lim a_n$.
Une suite qui n'est pas convergente est dite **divergente**.

Notation Pour dire qu'une suite est convergente (respectivement divergente), on dit souvent simplement qu'elle converge (respectivement diverge).

Attention La convergence d'une suite à valeurs dans un espace métrique dépend par définition de la distance avec laquelle on travaille. Une suite peut en effet converger pour une distance et diverger pour une autre.
En cas d'ambiguïté, il est donc important de préciser la distance (ou norme) utilisée.

Exemple. Dans l'espace $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$, on considère la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $f_n(x) = x^n$.

1. La suite (f_n) converge vers la fonction nulle au sens de la norme un mais pas au sens de la norme infinie.
2. Supposons que (f_n) converge au sens de la norme infinie et notons f sa limite. Alors, (f_n) converge vers f au sens de la norme un, d'où une contradiction.

Exercice 16. Montrer que la convergence vers l dans un espace métrique (E, d) est équivalente à la convergence vers l dans l'espace métrique (E, δ) où $\delta = \min(1, d)$ est une distance.

Exercice Moulin.EVN.37

On retiendra de cet exercice que la convergence et la limite d'une suite dépendent essentiellement de la norme choisie.

Remarque. Nous verrons cependant que deux normes équivalentes définissent les mêmes suites convergentes. En particulier, en dimension fini, la convergence et la limite éventuelle d'une suite ne dépendant pas de la norme choisie.

Opérations sur les suites convergentes dans un espace vectoriel normé

Ici, E est un espace vectoriel normé.

Théorème 14 : Combinaison linéaire de deux suites convergentes

Si deux suites (a_n) et (b_n) convergent respectivement vers l_1 et l_2, et si λ et μ sont deux scalaires, alors la suite de terme général $\lambda a_n + \mu b_n$ converge vers $\lambda l_1 + \mu l_2$.

Remarque. Par récurrence, on généralise le résultat précédente à une combinaison linéaire d'un nombre fini de suites : si l'on dispose de p suites, de termes généraux respectifs $a_n^{(1)}, \dots, a_n^{(p)}$, convergeant respectivement vers $l_1; \dots, l_p$, et si $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont des scalaires, alors la suite de terme général $\displaystyle\sum_{k=1}^{p} \lambda_k a_n^{(k)}$ converge vers $\displaystyle\sum_{k=1}^{p} \lambda_k l_k$.

Théorème 15 :

L'ensemble des suites convergentes à valeurs dans E est un sous-espace vectoriel de l'espace $E^{\mathbb{N}}$ des suites à valeurs dans E sur lequel l'application $u \mapsto \lim u$ est linéaire.

Théorème 16 :

Si une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers l, alors la suite de terme général $\|a_n\|$ converge vers $\|l\|$.

Théorème 17 :

Toute suite convergente est bornée.

Théorème 18 :

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E et $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{K}$, convergeant respectivement vers $a \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors, $(\lambda_n u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers λa.

Remarque. On verra ultérieurement une généralisation de ce résultat à d'autres types de produits.

2.2 Suite à valeurs dans un espace produit

Soit $(E_1, \|\cdot\|_1), \dots, (E_p n\|\cdot\|_p)$ des espaces vectoriels normés. On rappelle que l'espace $E_1 \times \cdots \times E_p$ est muni d'une structure d'espace vectoriel normé grâce à la norme produit définie par :

$$\|(x_1, \dots, x_p)\| = \max(\|x_1\|_2, \dots, \|x_p\|_p).$$

Pour tout $k \in [\![1, p]\!]$, on considère $(a_n^{(k)})_{n\in\mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans E_k, et on s'intéresse à la convergence au sens de la norme produit de la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ à valeurs dans $E_1 \times \cdots \times E_p$ de terme général :

$$a_n = (a_n^{(1)}, \dots, a_n^{(p)}).$$

La proposition suivante énonce que la convergence de la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ revient à celle de chacune des suites $(a_n^{(k)})_{n\in\mathbb{N}}$.

Théorème 19 :

La suite de terme général $(a_n^{(1)}, \dots, a_n^{(p)})$ converge si, et seulement si, pour tout $k \in [\![1, p]\!]$, la suite $(a_n^{(k)})_{n\in\mathbb{N}}$ converge.
De plus, en notant alors l_k la limite de la suite $(a_n^{(k)})_{n\in\mathbb{N}}$, la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers l'élément $(l_1, \dots, l_p)$ de $E_1 \times \cdots \times E_p$.

Exemple. Une suite à valeurs dans $\mathbb{K}^p$ converge au sens de la norme infinie si, et seulement si, chacune de ses composantes converge. L'étude de la convergence d'une telle suite revient donc à l'étude de p suites à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Remarque. Le fait que toutes les normes soient équivalentes en dimension finie entraîne que l'étude de la convergence, au sens de n'importe quelle norme (par exemple la norme un ou la norme deux) d'une suite à valeurs dans $\mathbb{K}^p$ revient à l'étude des suites composantes.

Extension Tout ce qui vient d'être fait dans un produit (fini) d'espaces vectoriels normés peut sans problème se généraliser dans un produit (fini) d'espaces métriques.

2.3 Suite extraite, valeur d'adhérence

Comme dans le cas des suites à valeurs réelles ou complexes, on appelle **suite extraite** ou **sous-suite** d'une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ toute suite de la forme $(a_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ où φ est une extraction, c'est-à-dire une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.

Théorème 20 :

Soit u une suite de E convergeant vers $l \in E$. Alors toute sous-suite de u converge également vers l.

Exercice Moulin.EVN.38

Définition 12

On appelle **valeur d'adhérence** d'une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tout élément de E qui est limite d'une sous-suite convergente de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Remarque. D'après la proposition précédente, une suite convergente possède une unique valeur d'adhérence.

Point méthode. Pour montrer qu'une suite est divergente, on peut utiliser la contraposée de la remarque précédente : il suffit de montrer que la suite considérée possède au moins deux valeurs d'adhérence (ou n'en possède aucune).

Exemple. La suite de terme général e^{in} est divergente, car si l est une valeur d'adhérence, alors le^i aussi...

Remarque. Comme pour les suites réelles, la convergence des deux suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) vers la même limite l entraîne la convergence de (u_n) vers l.

Théorème 21 : Caractérisation des valeurs d'adhérence

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans E et x un élément de E. Alors x est valeur d'adhérence de la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ si, et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ \exists p \geqslant n\ :\ d(a_n, x) \leqslant \varepsilon$$

Traduction en termes de boules Soit $u = (u_n)$ une suite de E et l un élément de E.

- La convergence de u vers l se traduit par le fait que toute boulée centrée en l et de rayon strictement positif contient tous les termes de u à partir d'un certain rang.
- L'élément l est valeur d'adhérence de u si, et seulement si, u prend une infinité de valeurs dans toute boule centrée en l et de rayon strictement positif.

3 Séries à valeurs dans un espace vectoriel normé

Ici, E désigne un espace vectoriel normé.

3.1 Suites et séries

A toute suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{E}^{\mathbb{N}}$, on associe la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$$

L'application $u \mapsto S$ est un isomorphisme d'espace vectoriel de $\mathbb{E}^{\mathbb{N}}$. Sa réciproque est l'application $S \mapsto u$, où u est définie par :

$$u_0 = S_0 \ \text{ et } \ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = S_n - S_{n-1}$$

Pour chaque élément de $\mathbb{E}^{\mathbb{N}}$, on peut donc considérer au choix la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ou la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ associée.

Définition 13

Si $u \in \mathbb{E}^{\mathbb{N}}$, et $S_n = \displaystyle\sum_{p=0}^{n} u_p$, on appelle série de terme général CENSURE.

On la note $\displaystyle\sum u_n$.
Le **terme général** est donc le vecteur u_n ; les **sommes partielles** sont les S_n.

Définition 14

On dit que la série $\sum u_n$ **converge** si la suite (S_n) admet une limite dans $\mathbb{E}$, appelée **somme de la série** et notée $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$. Dans le cas contraire, on dit que la série **diverge**. On parle de la nature d'une série pour parler de sa convergence ou sa divergence.

Notation On note $S_n(u)$ la n-ième somme partielle de la série de terme général u_n. Lorsque la série converge, on note aussi $S(u)$ sa somme.

Remarque.

- Lorsque la suite u est définie seulement à partir d'un certain rang n_0, la série de terme général u_n est notée $\sum_{n \geqslant n_0} u_n$; il s'agit de la suite des sommes partielles définie par :

$$\forall n \geqslant n_0,\ S_n = \sum_{p=n_0}^{n} u_p$$

- Le caractère asymptotique de la notion de limite permet de voir que pour $n_0 \in \mathbb{N}$, une série $\sum u_n$ converge si, et seulement si, la série $\sum_{n \geqslant n_0} u_n$.

Point méthode. Pour étudier la convergence d'une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, il faut penser à étudier éventuellement la convergence de la série $\sum_{n \geqslant 1} (u_{n+1} - u_n)$.

Théorème 22 :

Si une série converge, alors son terme général converge vers 0.

Définition 15

Une série dont le terme général ne tend pas vers à est dite **grossièrement divergente**.

Attention Comme pour les séries numériques, la convergence vers 0 du terme général est une condition nécessaire mais non suffisante de convergence.

Théorème 23 :

L'ensemble des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{E}^{\mathbb{N}}$ telles que la série $\sum u_n$ converge est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{E}^{\mathbb{N}}$ sur lequel l'application somme est linéaire.

Définition 16

Lorsque la série $\sum u_n$, on note $R_n(u) = \sum_{p=n+1}^{+\infty} u_p$, qu'on appelle **reste** au rang p.

Remarque. Dans ce cas, la suite $(R_n(u))$ converge vers 0 comme le prouve la relation :

$$R_n(u) = S(u) - S_n(u)$$

3.2 Convergence absolue

Définition 17

On dit que la série $\sum u_n$ est **absolument convergente**, ou **converge absolument**, si la série réelle positive $\sum \|u_n\|$ est convergente.

Attention Contrairement à ce qui se passe dans $\mathbb{R}$ ou dans $\mathbb{C}$, une série absolument convergente peut très bien ne pas converger.

Exemple. Dans $\mathbb{K}[X]$ muni de la norme $\left\| \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \right\| = \max|a_k|$, la série $\sum \frac{X^n}{n!}$ converge absolument, mais est divergente.

Néanmoins, nous démontrons ultérieurement le résultat suivant :

Théorème 24 :

Toute série absolument convergente d'un espace vectoriel normé de dimension finie est convergente.

4 Topologie d'un espace métrique

4.1 Parties ouvertes

Définition 18

Soit U une partie de E. On dit que U est un **ouvert** de E, ou une **partie ouverte** de E, si l'une des deux assertions équivalentes suivantes est vérifiée :

(i) pour tout $x \in U$, il existe $r > 0$ tel que la boule ouverte $B_o(x, r)$ soit incluse dans U ;

(ii) pour tout $x \in U$, il existe $r > 0$ tel que la boule fermée $B_f(x, r)$ soit incluse dans U.

L'équivalence entre les deux assertions de la définition ci-dessus est évidente :

- si la boule ouverte centrée en x et de rayon r est incluse dans U, alors il en est de même pour la boule fermée centrée en x et de rayon $r/2$;
- si la boule fermée centrée en x et de rayon r est incluse dans U, alors il en est de même pour la boule ouverte centrée en x et de rayon r.

Exemple. Il est clair, d'après la définition, que E et $\emptyset$ sont des parties ouvertes de E.

Théorème 25 :

Toute boule ouverte est une partie ouverte de E.

Démonstration. Pour x appartenant à une boule ouvert de centre a et de rayon R, considérer la boule ouverte de centre x et de rayon $R - d(x, a)$. Faire un dessin peu aider... □

Remarque. Le dessin fait lors de la démonstration précédente correspond à une norme euclidienne, mais nous a permis de trouver une démonstration valable pour tout norme. Cette représentation des boules n'induit en général pas de fausse intuition lors de considérations topologiques, et est donc couramment utilisée. Concrètement, le risque majeur de cette vision euclidienne concerne le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire.

Attention Le caractère ouvert ou non d'un ensemble n'est pas une notion intrinsèque à cet ensemble, mais dépend de l'espace dans lequel on le considère. Si F est un sous-espace métrique de E, alors une partie ouverte ouvert dans F n'est en général pas une partie ouvert dans E, comme le montre l'exercice suivant.

Exercice 17. Soit a et b deux réels tels que $a < b$.

1. L'intervalle ouvert $]a, b[$ est-il un ouvert de $\mathbb{R}$ (muni de la valeur absolue) ?
2. L'intervalle ouvert $]a, b[$ est-il un ouvert de $\mathbb{C}$ (muni du module) ?

Remarque. Plus généralement, tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire de la forme $]-\infty, b[$, $]a, b[$ ou $]a, +\infty[$ est un ouvert de $\mathbb{R}$, mais pas de $\mathbb{C}$.

Théorème 26 :

- La réunion d'une famille quelconque d'ouverts de E est un ouvert de E.
- L'intersection d'une famille finie d'ouverts de E est un ouvert de E.

Remarque. En particulier, une réunion quelconque de boules ouvertes est un ouvert de E. Réciproquement :

Exercice 18. Montrer que toute partie ouvert peut s'écrire comme une réunion de boules ouvertes.

Attention Avant d'affirmer qu'une intersection d'ouverts est un ouvert, il faut bien vérifier le caractère fini de cette intersection. En effet, une intersection quelconque de parties ouvertes n'est en général pas ouverte, comme l'illustre l'exemple suivant.

Exercice 19. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $U_n = \left]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right[$. Bien que chacun des U_n soit un ouvert, leur intersection $\{0\}$ ne l'est pas.

Théorème 27 :

Soit $E_1, \ldots, E_p$ des espaces métriques. On munit l'espace produit $E_1 \times \cdots \times E_p$ de la distance produit. Si $U_1, \ldots, U_p$ sont ouverts respectivement dans $E_1, \ldots, E_p$, alors $U_1 \times \cdots \times U_p$ est ouvert dans $E_1 \times \cdots \times E_p$.

4.2 Parties fermées

Définition 19

On dit qu'une partie de E est un **fermé** de E, ou une **partie fermée** de E, si son complémentaire dans E est ouvert.

Exemple. D'après la définition, il est clair que E et $\emptyset$ sont des parties fermées de E, puisque leurs complémentaires sont des ouverts de E.

Exercice 20. Montrer que tout intervalle fermé de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire tout intervalle de la forme $]-\infty, b]$, $[a, b]$ ou $[a, +\infty[$, est un fermé de $\mathbb{R}$.

Attention Il ne faut pas croire, par jeu de mots, qu'une partie qui n'est pas ouvert est nécessairement fermée. En effet, dans tout $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé non réduit à $\{0\}$, il existe des parties ni ouvertes ni fermées.
C'est le cas par exemple de l'intervalle $[0, 1[$ dans $\mathbb{R}$.
De plus, il existe des parties à la fois ouvertes et fermées, comme E et $\emptyset$.

Exercice 21. Quelles sont les parties à la fois ouvertes et fermées d'un ensemble muni de la distance discrète ?

Théorème 28 : T

oute boule fermée est une partie fermée de E.

Démonstration. On montre que le complémentaire de toute boule fermée est un ouvert. Pour x n'appartenant pas à la boule fermée de centre a et de rayon R, considérer la boule ouvert centrée en x et de rayon $d(x, a) - R$. Faire un dessin peut aider... □

Exemple.

1. Tout singleton est un fermé de E.
2. Tout segment de $\mathbb{R}$ est un fermé de $\mathbb{R}$. En effet, on peut l'interpréter comme une boule fermée.

Théorème 29 :

- L'intersection d'une famille quelconque de fermés est un fermé.
- La réunion d'une famille finie de fermés est un fermé.

Attention Avant d'affirmer qu'une réunion de fermés est fermée, il faut bien vérifier le caractère fini de cette réunion. En effet, une réunion quelconque de fermés n'est en général pas fermée, comme l'illustre l'exercice suivant.

Exercice 22. On se place dans $\mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $F_n = \left[\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right]$. Déterminer l'ensemble $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} F_n$. Cet ensemble est-il fermé ?

Remarque. Plus généralement, toute partie A peut-être obtenue comme une réunion de fermés : il suffit d'écrire $A = \bigcup_{a \in A} \{a\}$.

Exemple. Montrer, en l'obtenant comme une intersection de fermés, que toute sphère est une partie fermée.

4.3 Voisinage d'un point

Définition 20

Étant donnée une partie A de E et $a \in E$, on dit que A est un **voisinage de** a s'il existe $r > 0$ tel que la boule ouvert $B_o(a, r)$ soit incluse dans A.
On note $\mathcal{V}_a$ l'ensemble des voisinages de a.

Remarque. De manière évidente, pour que A soit un voisinage de a, il est nécessaire que a appartienne à A.

Dire que A est un voisinage de a signifie qu'il existe $r > 0$ tel que :

$$\forall x \in E,\ d(x, a) < r \implies x \in A,$$

autrement it, se placer suffisamment proche du point a nous assure d'être dans A.
En revanche, il peut y avoir dans les voisinages de a des points "très loin" de a.

Remarque. On peut, sans en changer le sens, remplacer "boule ouvert" par "boule fermée" dans la définition qui précède.

Exemple. Une partie de E est un ouvert de E si, et seulement si, elle est voisinage de tous ses points.

Exercice 23. Montrer que les ouverts, les fermés et les voisinages d'un espace métrique (E, d) sont les mêmes que leurs équivalents dans (E, δ) où $\delta = \min(1, d)$.
On dit que les espaces métriques (E, d) et (E, δ) ont la **même topologie**.

Opérations sur les voisinages

Théorème 30 :

Soit a un élément de E.

- Une intersection finie de voisinages de a est encore un voisinage de a.
- Si A est un voisinage de A, alors toute partie contenant A est également un voisinage de A.

Remarque. Le deuxième point de la proposition précédente permet d'affirmer que la réunion d'une famille non vide quelconque de voisinages de a est un voisinage de a.

Exercice 24. Montrer qu'une partie A est un voisinage d'un point a si, et seulement s'il existe un ouvert contenant a et inclus dans A.

Limites et voisinages

Théorème 31 :

Soit $a \in E$. Une suite (u_n) de E converge vers a si, et seulement si :

$$\forall V \in \mathcal{V}_a,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ :\ n \geqslant n_0 \implies u_n \in V$$

Exercice 25. Traduire de même le fait que a soit une valeur d'adhérence de (u_n). Comparer avec les traductions en termes de boules. Explication ?

4.4 Extension (HP) aux voisinages de l'infini

On suppose que E est ici un espace vectoriel normé.

Définition 21

1. On dit que $V \subset E$ est un **voisinage de l'infini** s'il existe A tel que :

$$\|x\| \geqslant A \implies x \in V$$

   On note $\mathcal{V}_\infty$.
2. On dit que $V \subset \mathbb{R}$ est un **voisinage de** $+\infty$ s'il existe A tel que $[A, +\infty[\subset V$.
   On note $\mathcal{V}_{+\infty}$ l'ensemble des voisinages de $+\infty$.
3. On dit que $V \subset \mathbb{R}$ est un **voisinage de** $-\infty$ s'il existe A tel que $]-\infty, A] \subset V$.
   On note $\mathcal{V}_{-\infty}$ l'ensemble des voisinages de $-\infty$.

Remarque.

- Les voisinages de l'infini, de $+\infty$ et de $-\infty$ vérifient les opérations sur les voisinages énoncées dans la section précédente.
- Dans $\mathbb{R}$, a-t-on $\mathcal{V}_\infty = \mathcal{V}_{+\infty} \cap \mathcal{V}_{-\infty}$ $\mathcal{V}_\infty = \mathcal{V}_{+\infty} \cup \mathcal{V}_{-\infty}$?

Définition 22

Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'un espace vectoriel normé E **tend vers l'infini**, ou **tend vers** ∞ (sans signe), et l'on écrit $\lim u_n = \infty$, lorsque la suite réelle $(\|u_n\|)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$.

Théorème 32 : Écriture topologique des limites

Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers l si, et seulement si, l'on a :

$$\forall V \in \mathcal{V}_l,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ :\ n \geqslant n_0 \implies u_n \in V,$$

ceci étant valable pour $l \in E$ ou $l = \infty$ lorsque l est un espace vectoriel normé, et pour $l \in \mathbb{R}$ ou $l = \pm\infty$ lorsque $E = \mathbb{R}$.

Remarque. Cette proposition permet d'unifier les définitions et de prouver avec moins d'effort le théorème de composition des limites.

4.5 Point intérieur, intérieur d'une partie

Désormais, E est de nouveau un espace métrique.

Définition 23

On dit qu'un point x de E est intérieur à une partie A de E si A est un voisinage de x.

Définition 24

L'**intérieur de** A est le plus grand ouvert inclus dans A. On le note $\mathring{A}$ ou $\mathrm{Int}(A)$.

Théorème 33 : L

'intérieur de A est l'ensemble de ses points intérieurs.

On rappelle, d'après la définition des voisinages, que dire que x est intérieur à A signifie qu'on peut trouver $r > 0$ tel que la boule centrée en x et de rayon r soit incluse dans A.

Propriétés Les propriétés suivantes peuvent s'obtenir à l'aide de l'une ou l'autre des deux définitions de l'intérieur et des points intérieurs.

- Si A et B sont deux parties vérifiant $A \subset B$, alors on a $\mathring{A} \subset \mathring{B}$.
- L'intérieur d'une réunion contient la réunion des intérieurs.
- L'intérieur d'une intersection finie est contenue dans l'intersection des intérieurs, avec égalité pour une intersection finie.

Exercice 26. Montrer qu'une partie A est ouvert si, et seulement si, $\mathring{A} = A$.

4.6 Point adhérent, adhérence d'une partie

Définition 25

On dit qu'un point $x \in E$ est **adhérent** à une partie A de E si pour tout $r > 0$, on a $B_o(x, r) \cap A \neq \emptyset$.

Exemple.
1. Les points adhérents à $A \neq \emptyset$ sont les points à distance nulle de A.
2. Borne supérieur d'une partie de $\mathbb{R}$.

Théorème 34 :

un point a est adhérent à A si, et seulement si tout voisinage de a rencontre A, ce qui s'écrit :

$$\forall V \in \mathcal{V}_a,\ V \cap A \neq \emptyset$$

Définition 26

L'adhérence de A est le plus petit fermé de E contenant A. On le note $\overline{A}$ ou $\mathrm{Adh}(A)$.

Exemple. Une partie de A est un fermé si, et seulement si, $\overline{A} = A$.

Exercice 27. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite est un fermé.

Exercice Moulin.EVN.33

Théorème 35 :

L'adhérence de A est l'ensemble de ses points adhérents.

Remarque. Dire qu'un point x n'appartient pas à l'adhérence de A signifie qu'on peut trouver $r > 0$ tel que $B_o(x, r) \cap A = \emptyset$ (ou encore $B_o(x, r) \subset E \setminus A$), ce qui signifie que x appartient à l'intérieur de $E \setminus A$. On a donc la relation :

$$E \setminus (\mathrm{Adh}(A))\,\mathrm{Int}(E \setminus A),$$

ce qui mène également aux deux relations suivantes :

$$\mathrm{Adh}(A) = E \setminus \mathrm{Int}(E \setminus A) \quad \text{et} \quad \mathrm{Int}(A) = E \setminus \mathrm{Adh}(E \setminus A)$$

Caractérisation séquentielle des points adhérents

Le résultat suivant donne une caractérisation très importante des points adhérents à une partie A d'un espace **métrique.**

Théorème 36 : Caractérisation séquentielle des points adhérents

Un point x est adhérent à une partie A si, et seulement s'il existe une suite d'éléments de A qui converge vers x.

Ce résultat s'énonce ainsi : l'adhérence d'une partie A d'un espace métrique est l'ensemble des limites des suites convergentes à valeurs dans A.

Exemple. Borne supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$.

Les notions de point adhérent à une partie et de valeur d'adhérence d'une suite sont des notions bien distinctes, comme le montre l'exercice suivant.

Exercice 28. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans E. Pour $p \in \mathbb{N}$, on note A_p l'ensemble $\{u_n \mid n \geqslant p\}$. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est :

$$\bigcap_{p\in\mathbb{N}} \overline{A_p}$$

Retrouver le résultat de l'exercice précédent.

Caractérisation séquentielle des parties fermées

Une partie étant un fermé si, et seulement si, elle est égale à sa propre adhérence, on déduit de la caractérisation séquentielle des points adhérents le résultat suivant :

Théorème 37 : Caractérisation séquentielle des parties fermées

Une partie A est un fermé si, et seulement si, la limite de toute suite convergente d'éléments de A appartient à A.

Extension (HP) de la notion de point adhérent

On étend la définition de point adhérent à une partie A de E dans les cas suivants :

- $a \in E$;
- $a = \pm\infty$ pour $E = \mathbb{R}$;
- $a = \infty$ pour un espace vectoriel normé E quelconque.

Définition 27

Un tel élément est adhérent à A s'il existe une suite d'éléments de A qui tend vers a.

Ainsi :

- $-\infty$ est adhérent à A si, et seulement si, A est une partie de $\mathbb{R}$ non minorée ;
- $+\infty$ est adhérent à A si, et seulement si, A est une partie de $\mathbb{R}$ non majorée ;
- ∞ est adhérent à A si, et seulement si, A est non bornée.

Théorème 38 :

Avec les définitions précédentes, a est adhérent à A si, et seulement si, tout voisinage de a rencontre A, ce qui s'écrit :

$$\forall V \in \mathcal{V}_a,\ V \cap A \neq \emptyset$$

4.7 Densité

Définition 28

Soit une partie de A. On dit que D est **dense dans** A si l'une des trois propriétés équivalentes suivantes est vérifiée :

(i) l'adhérence de D contient A :

(ii) pour tout $a \in A$ et pour tout $r > 0$, il existe $x \in D$ tel que $d(x, a) \leqslant r$;

(iii) pour tout $a \in A$, il existe une suite d'éléments qui converge vers a.

Démonstration. Dans la définition précédente, les propriétés (ii) et (iii) ne sont que des reformulations de la propriété $A \subset \overline{D}$. □

Exemple.

1. Les ensembles $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ et $\mathbb{D}$ sont denses dans $\mathbb{R}$.
2. L'ensemble $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
3. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$. L'ensemble des fonctions en escalier est dense dans $\mathcal{CM}([a, b], \mathbb{K})$ au sens de la norme infinie.
4. Nous verrons que l'ensemble des fonctions polynomiales sur $[a, b]$ est dense dans $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ au sens de la norme infinie.

Exercice Moulin.EVN.34

4.8 Frontière

Définition 29

Soit A une partie de E. On appelle **frontière de** A, et on note $\mathrm{Fr}(A)$, l'ensemble défini par :

$$\mathrm{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A}.$$

Dire qu'un point x appartient à la frontière de A signifie donc que $x \in \overline{A}$ et $x \notin \mathring{A}$, c'est-à-dire que pour tout $r > 0$, on a :

$$B_o(x, r) \cap A \neq \emptyset \quad \text{et} \quad B_o(x, r) \cap (E \setminus A) \neq \emptyset$$

Exemple.

1. Soit E un espace vectoriel normé non trivial. Si B désigne la boule fermée de centre $a \in E$ et de rayon $r > 0$, alors l'intérieur de B est la boule ouvert de mêmes centre et rayon, et la frontière de B est alors la sphère de mêmes centre et rayon.

2. Soit a et b deux réels tels que $a < b$. Quelle est la frontière d'un intervalle dont les bornes sont a et b ?

Exercice 29. Quelle est la frontière de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$?

Exercice 30. Soit A une partie de E. Montrer : $\mathrm{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \overline{(E \setminus A)}$.

Remarque. Du résultat de l'exercice précédent, il résulte que la frontière de A est une partie fermée comme intersection de (deux) parties fermées.

Exercice 31.
- Quelle est la frontière des parties d'un ensemble muni de la distance discrète ?
- Quelle sont les parties de $\mathbb{R}$ de frontière vide ?

Théorème 39 :

Pour toute partie A de E, les trois parties :

$$\mathring{A},\ \mathrm{Fr}(A) \text{ et } E \setminus \overline{A}$$

forment un recouvrement disjoint de E.

4.9 Ouvert relatif, fermé relatif, voisinage relatif

"Il va falloir parler de cette notion qui est assez vide."

Définition 30

Soit A une partie de E.

- Une partie U de A est un **ouvert relatif** à A s'il existe un ouvert $\tilde{U}$ de E tel que $U = \tilde{U} \cap A$.
- Une partie F de A est un **fermé relatif** à A s'il existe un fermé $\tilde{F}$ de E tel que $F = \tilde{F} \cap A$.
- Soit a un point de A. Une partie V de A est un **voisinage relatif** à A du point a s'il existe un voisinage $\tilde{V}$ de a dans E tel que $V = \tilde{V} \cap A$.

On constate facilement que si A est égal à E, alors ces notions coïncident avec les notions déjà vues d'ouvert, de fermé et de voisinage. En revanche, ce n'est pas le cas si A est quelconque, comme illustré ci-dessous.

Exemple. L'intervalle $[0, 1[$, bien qu'il ne soit pas ouvert dans $\mathbb{R}$, est un ouvert relatif à $[0, 1]$.

Exercice 32. On se place dans $\mathbb{R}$. Montrer que l'intervalle $]0, 1]$, bien qu'il ne soit pas fermé dans $\mathbb{R}$, est un fermé relatif à $]0, 2]$.

Exercice 33. On travaille dans $\mathbb{C}$. Montrer que l'intervalle $[0, 2]$, bien qu'il ne soit pas un voisinage du point 1, en est un voisinage relatif à $\mathbb{R}$.

Exemple. Soit F un fermé de E. Les fermés relatifs à F sont donc les parties fermées de E contenues dans F. On dispose d'un résultat similaire pour les ouverts.

Remarque importe pour saisir la notion (donc HP)

En fait, les ouverts, fermés et voisinages relatifs à A ne sont pas autre chose que les ouverts, fermés et voisinages de l'espace métrique A muni de la distance induite par celle de E.

Exercice 34. Montrer que toute partie A de E est à la fois un ouvert relatif à A et un fermé relatif à A.

4.10 Espaces topologiques (HP)

On donne ici une présentation d'espaces plus généraux, dits topologiques, dans lesquels les notions d'ouverts, de fermés, de voisinages et de convergence sont parfaitement adaptées. Nous verrons que cette notion généralise la notion d'espace métrique.

Définition 31

Soit E un ensemble. On appelle **topologie** sur E toute partie $\mathcal{O}$ de $\mathcal{P}(E)$ telle que :

(i) $\emptyset \in \mathcal{O}$ et $E \in \mathcal{O}$;

(ii) $\mathcal{O}$ est stable par réunion quelconque ;

(iii) $\mathcal{O}$ est stable par intersection finie.

Un tel couple $(E, \mathcal{O})$ est appelé **espace topologique**, et alors, les éléments de $\mathcal{O}$ sont appelés les **ouverts** de E.

Exemple. $\mathcal{O} = \mathcal{P}(E)$ est la **topologie discrète**. Elle est métrisable par la distance discrète.

Exemple. $\mathcal{O} = \{\emptyset, E\}$ est la **topologie grossière**. Nous verrons rapidement qu'elle est non métrisable dès que E possède plus de deux éléments.

Définition 32

Soit $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique. On appelle fermé de E toute partie F de E dont le complémentaire dans E appartient à $\mathcal{O}$.

Remarque. On vérifie facilement que l'ensemble des fermés est stable par intersection quelconque et par réunion finie.

Définition 33

Soit a un élément de E, où $(E, \mathcal{O})$ est un espace topologique. On appelle voisinage de A toute partie de E telle qu'il existe $U \in \mathcal{O}$ vérifiant $a \in U$ et $U \subset A$.

Remarque. On vérifie aisément que, comme pour les espaces métriques, que toute partie contenant un voisinage de a est un voisinage de a, et qu'une intersection finie de voisinages de a est un voisinage de a.

Remarque. On définit de même les notions de points intérieurs et adhérents, ainsi que de densité, *via* la notion de voisinage en adaptant les définitions équivalentes obtenues dans le cadre des espaces métriques.

Définition 34

Soit $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique. On note $\mathcal{V}_a$ l'ensemble des voisinages de $a \in E$. On dit que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ converge vers a si :

$$\forall V \in \mathcal{V}_a,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ : n \geqslant n_0 \implies u_n \in V$$

Remarque. On voit donc que la notion de convergence est proprement topologique et dépend fortement de la topologie considérée.

Théorème 40 : Métrique $\implies$ topologique

Soit (E, d) un espace métrique. On note $\mathcal{O}$ l'ensemble des parties U de E telles que :

$$\forall x \in U,\ \exists r > 0,\ B_o(x, r) \subset U.$$

Alors $\mathcal{O}$ est une topologie, dite topologie associée à la distance d. Tout espace métrique est donc naturellement muni d'une structure d'espace topologique.

Remarque. Il s'agit donc bien d'une généralisation des sections précédentes.

Terminologie Si une topologie $\mathcal{O}$ est la topologie associée à une distance d, on dit qu'elle est **métrisable.**

Exemple. La topologie grossière est non métrisable si E possède plus de éléments. En effet, il est aisé qu'alors, toute suite d'éléments de E converge vers tout élément de E. Si E possède au moins deux éléments, il n'y a donc pas unicité de la limite, si bien que la topologie ne provient pas d'une distance.

Définition 35

Soit $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique et A une partie de E. On note

$$\mathcal{O}' = \{O \cap A \ \mid\ O \in \mathcal{O}\}.$$

Alors $\mathcal{O}'$ est une topologie sur A, appelée **topologie trace** de $\mathcal{O}$ sur A, qui munit A d'une structure d'espace topologique.

Remarque. Les notions d'ouverts, fermés et voisinages relatifs sont donc des notions topologiques liées à la topologie trace.

5 Comparaison de normes

Il est fréquent de rencontrer plusieurs normes sur un même espace vectoriel. une question apparaît alors : si une propriété (comme la convergence d'une suite ou le caractère borné, ouvert ou fermé d'une partie) est vraie pour une norme, l'est-elle également pour les autres ?
La réponse est négative dans le cas général, comme l'illustre l'exemple suivant.

Exemple. On considère la suite de fonctions (f_n) définie sur $[0,1]$ par $f_n(x) = x^n$.

1. Un exemple précédent montrer que (f_n) converge vers 0 pour la norme un mais pas pour la norme infinie.
2. En notant $g_n = (n+1)f_n$, on constate que la suite (g_n) est bornée pour la norme un (tous ses éléments sont unitaires), mais pas pour la norme infinie.

Cependant, nous allons voir ici que sous des condition supplémentaires, certaines propriétés sont conservées lors du passage d'une norme à une autre.

5.1 Norme dominée par une autre

Définition 36

Soit N_1 et N_2 deux normes sur E. On dit que N_1 est **dominée** par N_2, ou que N_2 **domine** N_1, s'il existe un réel α strictement positif tel que $N_1 \leqslant \alpha N_2$, ou encore :

$$\forall x \in E,\ N_1(x) \leqslant \alpha N_2(x).$$

Terminologie Pour signifier que N_1 est dominée par N_2, on dit aussi que N_2 est **plus fine** que N_1.

Remarque. La propriété $N_1 \leqslant \alpha N_2$ s'interprète ainsi :

- pour tout $\varepsilon > 0$, la boule pour la norme N_2 centrée en 0 et de rayon ε/α est incluse dans la boule pour la norme N_1 de centre 0 et de rayon ε.
- pour tout $\eta >$ à, la boule pour la norme N_2 centrée en 0 et de rayon η est incluse dans la boule pour la norme N_1 de centre 0 et de rayon $\eta\alpha$.

Le résultat suivant assure que pour étudier le caractère dominé de la norme N_1 par la norme N_2, on peut se contenter de considérer les éléments $x \in E$ tels que $N_2(x) = 1$.

Théorème 41 :

Soit N_1 et N_2 deux normes sur E. La norme N_1 est dominée par la norme N_2 si, et seulement s'il existe un réel α strictement positif tel que :

$$\forall x \in E,\ \|x\| = 1 \implies N_1(x) \leqslant \alpha.$$

Démonstration. Raisonnement par homogénéité. □

Exercice 35. La relation de domination pour les normes est-elle une relation d'ordre ?

Exercice 36. Dans l'espace $\mathcal{C}([a,b],\mathbb{K})$, montrer que les normes un et deux sont toutes les deux dominées par la norme infinie.

Théorème 42 :

Soit N_1 et N_2 deux normes sur E telle que N_1 soit dominée par N_2. Si une partie de E est bornée pour la norme N_2, alors elle l'est également pour la norme N_1.

Remarque. Avec les notations de la proposition précédente, si une application f à valeurs dans E (et donc en particulier une suite d'éléments de E) est bornée pour la norme N_2, alors elle l'est également pour la norme N_1.

Théorème 43 :

Soit N_1 et N_2 deux normes sur E telle que N_1 soit dominée par N_2. Si une suite converge vers un élément l de E pour la norme N_2, alors elle converge également vers l pour la norme N_1.

Remarque. Étant données deux normes N_1 et N_2, pour montrer que N_1 n'est pas dominée par N_2, il suffit, d'après la proposition précédente, d'exhiber une suite qui converge pour la norme N_2 mais pas pour la norme N_1.

Point méthode. Dans la pratique, pour montrer que N_1 n'est pas dominée par N_2, on cherche souvent une suite qui, au choix :

- tend vers 0 pour N_2 mais pas pour N_1 ;
- est bornée pour N_2 mais qui ne l'est pas pour N_1.

5.2 Normes équivalentes

Définition 37

Soit N_1 et N_2 deux normes sur E. On dit que N_1 et N_2 sont **équivalentes** s'il existe deux réels α et β strictement positifs tels que :

$$\forall x \in E,\ \alpha N_1(x) \leqslant N_2(x) \leqslant \beta N_1(x).$$

Remarque. Deux normes sont donc équivalentes si, et seulement si, chacune est dominée par l'autre.

Exercice 37. Montrer que la relation d'équivalence des normes est une relation d'équivalence.

Exercice 38. Montrer que pour $x \in \mathbb{K}^n$, on a :

$$\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_2 \leqslant \|x\|_1 \leqslant n\|x\|_\infty.$$

En déduire que ces trois normes sur $\mathbb{K}^n$ sont équivalentes.

Beaucoup de propriétés sont conservées lorsqu'on passe à une autre qui lui est équivalente. Donnons trois résultats, dont les deux premiers sont des conséquences immédiates de la remarque sur le fait que l'équivalence des normes correspond à une domination mutuelle et de résultats sur les normes qui en dominent d'autres.

Théorème 44 : Conservation du caractère borné d'une partie

Soit N_1 et N_2 deux normes équivalentes sur E. une partie est bornée pour la norme N_1 si, et seulement si, elle l'est pour la norme N_2.

Remarque. Ce résultat s'applique en particulier aux applications bornées et aux suites bornées.

Théorème 45 : Conservation du caractère convergent d'une suite

Soit N_1 et N_2 deux normes équivalentes sur E. Une suite converge vers un élément l de E pour la norme N_1 si, et seulement si, elle converge vers l pour la norme N_2.

Théorème 46 : Conservation des ouverts et des fermés

Soit N_1 et N_2 deux normes équivalentes sur E, et A une partie de E. Alors :

- la partie A est ouvert pour N_1 si, et seulement si, elle l'est pour N_2 ;
- la partie A est fermée pour N_1 si, et seulement si, elle l'est pour N_2.

Remarque. Les résultats précédents nous assurent que, pour étudier la convergence d'une suite ou encore le caractère borné, ouvert ou fermé (et donc, par extension, tout résultat reposant sur ces notions), si l'on dispose de plusieurs normes équivalentes, alors on peut choisir celle qui est la plus adaptée au problème.

Point méthode. En particulier, dans $\mathbb{K}^n$, on se demandera régulièrement quelle norme parmi la norme 1, la norme 2 et la norme infinie, est la plus adaptée à la situation.

Comparaison de normes

Point méthode. Comparer des normes N_1 et N_2 signifie déterminer si N_1 (respectivement N_2) est dominée par N_2 (respectivement N_1).

Exercice 39. Soit a, b et c trois réels vérifiant $a < b < c$. On considère les deux normes suivantes sur l'espace $\mathbb{R}[X]$:

$$N_1(P) = \int_a^b |P| \quad \text{et} \quad N_2(P) = \int_a^c |P|$$

Comparer les deux normes N_1 et N_2.

Équivalence des normes en dimension finie

Le théorème fondamental suivant sera démontré ultérieurement.

Théorème 47 :

Dans un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.