TD Espaces vectoriels (révisions)

8 septembre 2025

1 Espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels

Exercice 1 : Δ **Moulin.01**

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel où $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique nulle.

1. Montrer que si F et G sont deux SEV stricts de E, alors il existe un vecteur de E n'appartenant ni à F ni à G.
2. $\star$ Et pour $n \geqslant 2$ SEV ?

Démonstration. Le premier cas se fait facilement, mais le deuxième est plus complexe.

1. Si $F \subset G$ ou $G \subset F$, le résultat est immédiat. Sinon, on prend $x \in F \setminus G$ et $y \in G \setminus F$. Alors $x + y$ ne peut pas être dans F sans quoi, par différence, y appartiendrait à F. De même, $x + y$ ne peut appartenir à G sans quoi, par différence, x appartiendrait à G. Donc $x + y$ n'appartient ni à F ni à G.
2. On se donne $F_1, \ldots, F_n$ des SEV stricts de E. Sans perte de généralité, quitta à supprimer certains F_i, on peut supposer qu'aucun F_i n'est pas inclus dans la réunion des autres F_j pour $j \neq i$. On prend alors pour tout i un $x_i \in F_i$ qui n'est dans aucun F_j pour $j \neq i$. On note D la droite affine passant par x_1 et x_2. Comme $x_2 \notin F_1$ et $x_1 \in F_1$, D ne rencontre F_1 qu'en x_1. Soit $i \geqslant 2$. Alors D n'est pas incluse dans F_i car D contient x_1 qui n'appartient pas à F_i. Donc $D \cap F_i$ est vide ou réduite à un singleton. Par conséquent, $D \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n} F_i\right)$ est finie. Or, D est infinie car $\mathbb{K}$ est infini (car de caractéristique nulle). Donc $\bigcup_{i=1}^{n} F_i$ ne recouvre pas E.

$\square$

Exercice 2 : $\star$ **Moulin.02**

Soit E un espace vectoriel admettant une base infinie. Montrer que E est une réunion dénombrable d'hyperplans.

Exercice 3 : $\star\star$ **Moulin.03**

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie. Montrer que E n'est pas la réunion dénombrable de ses sous-espaces vectoriels stricts.

Exercice 4 : ∘ **Moulin.04**

Soit F un sous-espace vectoriel strict de E. Quel est l'ensemble des combinaisons linéaires des éléments n'appartenant pas à F ?

Exercice 5 : **Moulin.05**

Déterminer le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ engendré par les polynômes P tels que $\forall x \in \mathbb{R},\ P(x) \geqslant 0$.

Exercice 6 : Espace vectoriel quotient **Moulin.06**

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E

1. Montrer que la relation $\sim_F$ de congruence définie sur E par :

$$x \sim_F \iff x - y \in F$$

   est une relation d'équivalence. On note E/F l'ensemble quotient associé.
2. D'un point de vue géométrique, qu'est-ce qu'un élément de E/F ?
3. Montrer qu'il existe une unique structure de $\mathbb{K}$-espace vectoriel sur E/F rendant linéaire la projection canonique π. Préciser alors le noyau de π.
4. Montrer que E/F est isomorphe à tout supplémentaire de F dans E.
5. Montrer que si E est de dimension finie, alors E/F l'est également, et préciser sa dimension.
6. Soit $f : E \to G$ une application linéaire nulle sur F. Montrer qu'il existe une unique application linéaire $\overline{f} : E/F \to G$ telle que $\forall x \in E,\ \overline{f}(\overline{x}) = f(x)$.

Exercice 7 : Complexification d'un espace vectoriel réel **Moulin.07**

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et u un endomorphisme de E tel que $u^2 = -\mathrm{id}_E$.

1. Montrer que la multiplication par un scalaire peut être prolongée, de manière unique, en une fonction de $\mathbb{C} \times E$ dans E faisant de E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel et telle que $i.x = u(x)$ pour tout $x \in E$.
2. On note $\mathcal{C}(u)$ l'ensemble des endomorphismes du $\mathbb{R}$-espace vectoriel E qui commutent avec u. Montrer que $\mathcal{C}(u)$ est l'ensemble des endomorphismes du $\mathbb{C}$-espace vectoriel E.

2 Familles libres, familles génératrices, bases

Exercice 8 : **Moulin.08**

La famille $(1 + X, 1 + X^2, \ldots, 1 + X^n, \ldots)$ est-elle génératrice de $\mathbb{R}[X]$? Dans le cas contraire, donner une équation d'un hyperplan qui la contient.

Exercice 9 : Δ **Moulin.09**

Soit a et b deux réels distincts. Montrer que la famille $(P_k)_{0\leqslant k\leqslant n}$, où

$$P_k = (X-a)^k(X-b)^{n-k}$$

est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 10 : **Moulin.10**

Étant donnés $n+1$ points distincts $a_0, \ldots, a_n$ de $\mathbb{K}$, montrer que les polynômes $P_i = (X+a_i)^n$, pour $i \in [\![0, n]\!]$, forment une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Exercice 11 : **Moulin.11**

Soit $J = [a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$ avec $a < b$. Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on définit : $f_\alpha : J \to \mathbb{R}$ par $f_\alpha(x) = |x - \alpha|$.

1. Montrer que la famille $(f_\alpha)_{\alpha\in J}$ est libre. Qu'en est-il de la famille $(f_\alpha)_{\alpha\in\mathbb{R}}$?
2. Montrer que le sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(J, \mathbb{R})$ engendré par chacune de ces deux familles est l'ensemble des fonctions continues affines par morceaux sur J.
3. Montrer que la fonction $\varphi : J^2 \to \mathbb{R}$ définie par

$$\varphi(x, y) = |x - y|$$

n'est pas dans le sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(J^2, \mathbb{R})$ engendré par les fonctions de la forme $(x, y) \mapsto g(x)h(y)$ où $(g, h) \in \mathcal{F}(J, \mathbb{R})^2$.

Exercice 12 : **Moulin.12**

Montrer que la famille des

$$f_a : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \ln(x+a) \end{array}$$

pour $a > 0$ est libre.

Démonstration. Prendre une combinaison linéaire nulle et dériver. Utiliser ensuite le fait que la famille des

$$\frac{1}{X+a}$$

pour $a > 0$ est libre comme sous-famille de la base canonique de $\mathbb{R}(X)$ (théorème de décomposition en éléments simples). $\square$

Exercice 13 : **Moulin.13**

Soit $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille libre de polynômes de $\mathbb{R}[X]$.

1. On suppose :
$$\forall n \in \mathbb{N},\ \exists N \geqslant n\ :\ \forall k \in [\![0, N]\!],\ \deg(P_k) \leqslant N$$
Montrer que (P_n) est une base de $\mathbb{R}[X]$.
2. $\star$ Réciproque ?

Exercice 14 : $\star$ **Moulin.14**

1. Soit E un espace vectoriel muni d'une base dénombrable $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Montrer que toute famille libre de E est au plus dénombrable.
2. Les espaces vectoriels $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{C}(X)$ sont-ils isomorphes ?

Démonstration.

1. On considère $(x_i)_{i\in I}$ une famille libre de E. On note :
$$\forall n \in \mathbb{N},\ E_n = \mathrm{Vect}(e_0, \dots, e_n)$$
Ensuite, on pose :
$$\forall n \in \mathbb{N},\ I_n = \{i \in I \mid x_i \in E_n\}$$
La liberté de $(x_i)_{i\in I}$ impose que chaque I_n est fini. or, on vérifie aisément que
$$I = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$$
Donc, en tant que réunion au plus dénombrable d'ensembles finis, I est au plus dénombrable.
2. Par indénombrabilité de $\mathbb{R}$, la famille
$$\left(\frac{1}{X+a}\right)_{a\in\mathbb{R}}$$
est une famille libre (théorème de décomposition en éléments simples) indénombrable. Donc $\mathbb{C}[X]$ n'est pas de dimension dénombrable d'après la question précédente. Or, $\mathbb{C}[X]$ n'est clairement pas de dimension finie donc $\mathbb{C}[X]$ est de dimension indénombrable. Comme $\mathbb{C}[X]$ est de dimension dénombrable, on en déduit que $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$ ne sont pas isomorphes.

$\square$

Exercice 15 : $\star\star$ Lemme de Dedekind **Moulin.15**

Soit G un groupe multiplicatif et Σ l'ensemble des morphismes de G dans $(\mathbb{C}^*, \times)$. Montrer que Σ est une famille libre de $\mathbb{C}^G$. Que peut-on en déduire sur $\mathrm{Card}(\Sigma)$ si G est fini ?

Démonstration. Procéder par récurrence sur le nombre de morphismes. Dans la récurrence, multiplier par le nouveau morphisme, mais utiliser aussi la nouvelle propriété de morphisme. On obtient :
$$\forall (g, g') \in G^2,\ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(g)\,[f_i(g') - f_0(g')] = 0$$

d'où on tire

$$\forall g' \in G,\ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \left[f_i(g') - f_0(g')\right] f_i = 0$$

Or, on a pris les f_i distincts, donc on peut trouver g' tel que $f_i(g') - f_0(g') \neq 0$. On utilise alors l'hypothèse de récurrence et on se ramène à $\lambda_0 f_0 = 0$ ce qui est l'initialisation (immédiate en évaluant en e élément neutre de G). Lorsque G est fini, $\mathbb{C}^G$ est de dimension finie égale à $\mathrm{Card}(G)$ puisque $(x \mapsto \delta_{g,x})_{g \in G}$ en est une base par exemple. Donc on en déduit que

$$\mathrm{Card}(\Sigma) \leqslant \mathrm{Card}(G)$$

□

Exercice 16 : **Moulin.16**

Soit X un ensemble et $f : X \to \mathbb{R}_+^*$.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $(f^n)_{n \in \mathbb{N}}$ soit libre.
2. ⋆⋆ Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $(f^\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}_+^*}$ soit libre.

Exercice 17 : Famille de réels sur $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{Q}$-ev **Moulin.17**

On considère $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{Q}$-espace vectoriel.

1. La famille $(\ln(n))_{n \geqslant 2}$ est-elle libre ?
2. La famille $(\ln(p))_{p \text{ premier}}$ est-elle libre ?

Démonstration. 1. La réponse est non puisque par exemple $\ln(4) = 2\ln(2)$ et 2 est non nul.

2. La réponse est oui. Écrire tous les scalaires de la relation de liaison sous forme irréductible et tout multiplier par le PPCM des scalaires. Séparer en les entiers positifs et négatifs. Passer à l'exponentielle et utiliser l'unicité de la DFP.

□

Exercice 18 : ⋆ **Moulin.18**

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $f_n : x \in \mathbb{R} \mapsto \cos(x^n)$. Montrer que la famille $(f_n)_{n \geqslant 0}$ est libre.

Exercice 19 : ⋆ **Moulin.19**

On note $P(\mathbb{C})$ l'ensemble des suites complexes périodiques.

1. Montrer que $P(\mathbb{C})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.
2. En donner une base.

Exercice 20 : E ⋆ Existence d'une base pour un espace vectoriel quelconque

n admettant le lemme de Zorn, montrer que tout espace vectoriel admet une base.

3 Dimension finie

Exercice 21 : **Moulin.20**

Soit $(x_1, \ldots, x_n)$ une famille de rang r. On considère une sous-famille à p vecteurs de rang s. Montrer que $s \geqslant p + r - n$.

Exercice 22 : $\Delta\star$ Multiplicativité des degrés **Moulin.21**

Soit $\mathbb{L}$ un surcorps de $\mathbb{K}$ de dimension p sur $\mathbb{K}$. Soit E un $\mathbb{L}$-espace vectoriel (qui est donc aussi un $\mathbb{K}$-espace vectoriel). Montrer que E est de dimension finie sur $\mathbb{K}$ si, et seulement si, E est de dimension finie sur $\mathbb{L}$. Donner alors une relation entre ces deux dimensions.

Démonstration. Un exemple non trivial de tels corps peut être donné par $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$. Dans le sens direct, une base de E comme $\mathbb{K}$-ev est alors génératrice d E en tant que $\mathbb{L}$-ev car tout scalaire de $\mathbb{K}$ est un scalaire de $\mathbb{L}$. Donc OK. Réciproquement, il faut multiplier une base de E en tant que $\mathbb{L}$-ev par une base de $\mathbb{L}$ en tant que $\mathbb{K}$-ev. On vérifie alors qu'on obtient une base de E en tant que $\mathbb{K}$-ev. On en déduit alors que :

$$\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) \times \dim_{\mathbb{L}}(E)$$

$\square$

Exercice 23 : **Moulin.22**

Soit E un espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Quelle peut être la dimension de $F \cap H$, si H est un hyperplan de E ? On pourra commencer par le cas où E est de dimension finie.

Exercice 24 : $\star$ **Moulin.23**

Donner une condition nécessaire et suffisante sur n et m pour qu'il existe un isomorphisme de groupes de $\mathbb{Z}^n$ sur $\mathbb{Z}^m$.

Exercice 25 : $\star$ **Moulin.24**

Soit X et Y deux ensembles et $f : X \to Y \to \mathbb{K}$. On pose :

$$\mathcal{G}(f) = \mathrm{Vect}\,\{f(a, \cdot) \mid a \in X\} \quad \text{et} \quad \mathcal{D}(f) = \mathrm{Vect}\,\{f(\cdot, b) \mid b \in Y\}$$

1. On suppose que $\mathcal{G}(f)$ est de dimension finie. En utilisant une base de $\mathcal{G}(f)$, montrer que $\mathcal{D}(f)$ est de dimension finie avec $\dim(\mathcal{D}(f)) \leqslant \dim(\mathcal{G}(f))$.
2. Montrer que $\mathcal{D}(f)$ et $\mathcal{G}(f)$ sont soit de même dimension finie, soit tous les deux de dimension infinie.
3. $\star\star$ Donner un exemple dans lequel $\mathcal{D}(f)$ et $\mathcal{G}(f)$ ne sont pas isomorphes.

Exercice 26 : Δ **Moulin.25**

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$ fini de cardinal q, et soit $p \in \mathbb{N}$. Dénombrer :

1. les éléments de E ;
2. les droites, les hyperplans ;
3. les familles libres à p vecteurs, les bases ;
4. les endomorphismes, les automorphismes ;
5. les sous-espaces vectoriels de dimension p, comparer avec le nombre de sous-espaces vectoriels de dimension $n-p$;
6. les projecteurs, $\star$ les endomorphismes de E tels que $u^2 = 0$ (on ne cherchera pas à simplifier le résultat) ;
7. $\star$ les familles génératrices de E à p éléments (on montrera qu'il y en a autant que de mailles libres à n éléments dans un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension p).

Exercice 27 : Existence d'un supplémentaire commun en dimension finie

Soit E un espace de dimension finie et F et G deux sous-espaces vectoriels de E de même dimension. Montrer que F et G possèdent un supplémentaire commun.

Démonstration. Voici une méthode qui est faisable en sup :il y en probablement des meilleures mais je n'ai que celle-là sous la main quand j'écris.
Considérer l'ensemble des dimensions des sous-espaces vectoriels de E qui sont à la fois en somme directe avec F et G. Cet ensemble est non vide puisqu'il contient 0 car l'espace nul est en somme directe avec tous les espaces. Cet ensemble est évidemment majoré par la dimension de E. Enfin, c'est une partie de $\mathbb{N}$, donc on peut lui fixer un plus grand élément et à cet élément on peut associer un sous-espaces vectoriel V qui le réalise. Il faut désormais montrer que V est un supplémentaire de F et de G. Pour cela, on raisonne par l'absurde en utilisant le fait que l'union de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel si, et seulement si, l'un est inclus dans l'autre. Puis on utilise le lemme d'adjonction, et on montre que les sommes de F et G avec le nouvel ensemble obtenu sont directes. Ceci est alors absurde par maximalité de la dimension de V. $\square$

Exercice 28 : Δ Noyaux et images itérés

On considère E un EV de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$. pour $k \in \mathbb{N}$, on pose $N_k = \mathrm{Ker}(u^k)$ et $I_k = \mathrm{Im}(u^k)$ On dispose de pleins de résultats intéressants (décomposition de Fitting, suites stationnaires, etc.) mais le résultat qui sert le plus souvent est la concavité de la suite des dimensions des noyaux itérés, *ie* la décroissance de la suite d'entiers :

$$(\dim(N_{k+1}) - \dim(N_k))_{k\in\mathbb{N}}$$

Démonstration. On applique le théorème du rang aux restrictions de u à I_k et I_{k+1}. Cela donne :

$$\begin{cases} \dim(I_k) = \dim(I_{k+1}) + \dim(\mathrm{Ker}(u) \cap I_k) \\ \dim(I_{k+1}) = \dim(I_{k+2}) + \dim(\mathrm{Ker}(u) \cap I_{k+1}) \end{cases}$$

Et puisque $\mathrm{Ker}(u) \cap I_{k+1} \subset \mathrm{Ker}(u) \cap I_k$, on en déduit :

$$\dim(I_{k+1}) - \dim(I_{k+2}) \leqslant \dim(I_{k+1}) - \dim(I_k)$$

En appliquant le théorème du rang à u^k, u^{k+1} et u^{k+2}, on obtient finalement :

$$\dim(N_{k+2}) - \dim(N_{k+1}) \leqslant \dim(N_{k+1}) - \dim(N_k)$$

□

Application. Sert à démontrer des résultats sur les images itérées d'un endomorphisme nilpotent d'indice maximal.

Exercice 29 : ⋆ Propriété analogue à la dimension

Soit E un espace de dimension finie $n \geqslant 2$. On note

$$\mathcal{A} = \{F \text{ sev de } E\}$$

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathcal{A} \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$\forall (V, W) \in \mathcal{A}^2,\ f(V + W) = f(V) + f(W) - f(V \cap W)$$

Démonstration. On peut déjà remarquer que la fonction dimension fonctionne d'après la formule de Grassmann. On raisonne par analyse-synthèse.

- **Analyse** : Soit f qui convienne. Dans un premier temps, on montre que toutes les droites vectorielles (c'est-à-dire les espaces vectoriels de dimension 1) ont la même image par f. Soit D_1 et D_2 deux droites vectorielles. On peut leur fixer un supplémentaire commun H (cf. exercice qui précède). On obtient alors immédiatement en utilisant l'hypothèse sur f avec $H \oplus D_1 = H \oplus D_2 = E$ que $f(D_1) = f(D_2)$ Posons désormais a l'image d'une droite vectorielle quelconque par f et b l'image de l'espace nul par f. Montrons par récurrence finie sur la dimension des sous-espaces qu'on a $f = (a_b) \dim + b$.
  - Initialisations (rang 0 et 1) : Immédiat par définition de a et b.
  - Hérédité : Soit $n \geqslant m \geqslant 2$ tel que pour tout $k \leqslant m - 1$, on ait l'égalité souhaitée pour les sous-espaces de dimension k. Soit F un sous-espace de E de dimension m. On peut fixer x un élément non nul de F et considérer D la droite vectoriel engendrée par x. On peut alors fixer H un hyperplan de F tel que $F = H \oplus D$. On a alors par hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} f(F) &= f(H) + f(D) - f(\{0_E\}) \\ &= (a - b)(m - 1) + b + a - b \\ &= (a - b)m + b \\ &= (a - b)\dim(F) + b \end{aligned}$$

  ce qui achève la récurrence. Ainsi, si f convient, alors il existe des constantes réelles λ et μ telles que $f = \lambda \dim + \mu$.
- **Synthèse** : Réciproquement, on vérifie immédiatement qu'une telle fonction convient.

□

Exercice 30 : O ⋆⋆ **Groupes finis dont le groupe des automorphismes est trivial**

n cherche à déterminer les groupes finis dont le seul automorphisme est l'identité.

1. Soit G un groupe fini d'élément neutre e tel que $\forall x \in G,\ x^2 = e$. Montrer que $\mathrm{Card}(G)$ est une puissance de 2.
2. Déterminer l'ensemble des groupes dont le seul automorphisme est l'identité.

Exercice 31 : ⋆⋆⋆ **Ulm**

On note $\mathcal{G}_n$ l'ensemble des sous-espaces vectoriel de $\mathbb{R}^n$. On se donne $\varphi : \mathcal{G}_n \to \mathbb{R}$ qui vérifie :

$$\forall (V,W) \in \mathcal{G}_n^2,\ \varphi(V+W) + \varphi(V \cap W) \leqslant \varphi(V) + \varphi(W)$$

Montrer qu'il existe un unique sous-espace vectoriel V_0 de $\mathbb{R}^n$ de dimension maximale tel que :

$$\frac{\varphi(V_0)}{\dim(V_0)} = \inf_{V \in \mathcal{G}_n} \frac{\varphi(V)}{\dim(V)}$$

4 Sommes, supplémentaires

Exercice 32 : **Moulin.26**

Dans l'espace vectoriel $\mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$, on considère le sous-espace vectoriel F des applications f vérifiant $f(1) = f(2) = 0$. Donner un supplémentaire de F. Généralisation ?

Exercice 33 : ∘ **Moulin.27**

Soit F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E.

1. Soit G' un sous-espace vectoriel tel que $F + G' = E$ et $G' \subset G$. Montrer que $G = G'$.
2. Soit G' un sous-espace vectoriel tel que $F \cap G' = \{0\}$ et $G \subset G'$. Montrer que $G = G'$.

Exercice 34 : ∘ **Moulin.28**

Que peut-on dire de deux décompositions $E = \bigoplus_{i=1}^{n} F_i = \bigoplus_{i=1}^{n} F_i$ de E telles que $\forall i \in [\![1,n]\!],\ F_i \subset G_i$?

Exercice 35 : **Moulin.29**

Soit E et F deux espaces vectoriels de dimension finie, $E_1, \dots, E_p$ des sous-espaces vectoriels de E et

$$\varphi : \begin{array}{rcl} \mathcal{L}(E,F) & \longrightarrow & \mathcal{L}(E_1,F) \times \cdots \times \mathcal{L}(E_p,F) \\ h & \longmapsto & (h_{|E_1}, \dots, h_{|E_p}) \end{array}$$

A quelle condition nécessaire et suffisante φ est-elle injective ? Surjective ?

Exercice 36 : Δ **Moulin.30**

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E. Montrer que tous les supplémentaires de F dans E sont isomorphes.

Démonstration. On fixe G un supplémentaire de F dans E et on se donne H un supplémentaire de F dans E quelconque. On note p le projecteur sur G parallèlement à F. Puisque H est un supplémentaire de $F = \mathrm{Ker}(p)$, alors H et $G = \mathrm{Im}(p)$ sont isomorphes en vertu du théorème du rang géométrique. □

Exercice 37 : Δ **Moulin.31**

1. Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Montrer que deux sous-espaces vectoriels de même dimension admettent un supplémentaire commun.
2. $\star$ Est-ce vrai pour un nombre fini quelconque de sous-espaces vectoriels ?

Démonstration. Procéder par récurrence descendante sur leur dimension commune k. Pour l'initialisation, prendre pour supplémentaire $\{0\}$. Pour l'hérédité, considérer un vecteur y qui n'appartient par à la réunion des F_i (possible d'après un exercice précédent), puis ajouter aux F_i la droite $\mathbb{K}y$. Appliquer l'hypothèse de récurrence aux $F_i \oplus \mathbb{K}y$ et conclure par associativité de la somme directe. □

5 Applications linéaires

Exercice 38 : **Moulin.32**

Soit F et G deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E de dimension finie. Donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\mathrm{Ker}(u) = F$ et $\mathrm{Im}(u) = G$.

Exercice 39 :

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$(f - id)^2 = 0$$

1. Montrer que f est inversible et donner son inverse.
2. Calculer f^n pour $n \in \mathbb{Z}$

Exercice 40 : Intégrité affaiblie sur les formes linéaires

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $(f, g) \in (E^*)^2$ telles que

$$\forall x \in E,\ f(x)g(x) = 0$$

Montrer que $f = 0$ ou $g = 0$.

Démonstration. Raisonner par l'absurde en considérant deux éléments x et y qui n'annulent pas respectivement f et g puis considérer leur somme. Raisonnons par l'absurde et fixons $x \in E$ tel que $f(x) \neq 0$ et $y \in E$ tel que $g(y) \neq 0$. Alors, par hypothèse, on a $g(x) = 0$ et $f(y) = 0$ par intégrité de $\mathbb{K}$. Puis par hypothèse et en vertu de ce qui précède :

$$\begin{aligned} f(x+y)g(x+y) &= f(x)g(x) + f(x)g(y) + f(y)g(x) + f(y)g(y) \\ &= f(x)g(y) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Or $f(x) \neq 0$ et $g(y) \neq 0$ donc $f(x)g(y) \neq 0$ par intégrité de $\mathbb{K}$, ce qui est **absurde**. Ainsi, $f = 0$ ou $g = 0$. □

Exercice 41 : ⋆

On note $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des suites réelles. On se donne $\varphi \in E^*$ telle que

$$\forall u \in E,\ \exists n(u) \in \mathbb{N},\ \varphi(u) = u_{n(u)}$$

Montrer : $\exists n \in \mathbb{N},\ \forall u \in E,\ \varphi(u) = u_n$

Exercice 42 : **Moulin.33**

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\mathrm{Ker}(u) = \mathrm{Im}(u)$?

Démonstration. D'après le théorème du rang, il est nécessaire que $\dim(E)$ soit pair. Réciproquement, prendre une base de taille paire puis envoyer les impairs sur 0 et les pairs sur l'impair qui précède. □

Exercice 43 : **Moulin.34**

Soit E et F deux espaces vectoriels de dimension finie et $(x_1, \ldots, x_p)$ une famille de vecteurs de E. Calculer la dimension de :

$$\{(u(x_1), \ldots, u(x_p)) \ \mid\ u \in \mathcal{L}(E, F)\}$$

Exercice 44 : Δ **Moulin.35**

Soit $u \in \mathcal{L}(E,F)$ et $\in \mathcal{L}(F,G)$. Montrer les équivalences :

$$\begin{cases} \mathrm{Ker}(v \circ u) = \mathrm{Ker}(u) \iff \mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Ker}(v) = \{0\} \\ \mathrm{Im}(v \circ u) = \mathrm{Im}(v) \iff \mathrm{Im}(u) + \mathrm{Ker}(v) = F \end{cases}$$

Exercice 45 : Δ **Moulin.36**

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Prouver les équivalences :

$$\begin{cases} \mathrm{Ker}(u) = \mathrm{Ker}(u^2) \iff \mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Ker}(u) = \{0\} \\ \mathrm{Im}(u) = \mathrm{Im}(u^2) \iff \mathrm{Im}(u) + \mathrm{Ker}(u) = E \end{cases}$$

2. Si E est de dimension finie, prouver :

$$\mathrm{Im}(u) = \mathrm{Im}(u^2) \iff \mathrm{Ker}(u) = \mathrm{Ker}(u^2)$$

   et montrer que ces deux conditions sont équivalentes à $\mathrm{Im}(u) \oplus \mathrm{Ker}(u) = E$.

3. Trouver des exemples montrant que chacune des deux implications de la question précédente est fausse en dimension infinie.

Exercice 46 : Δ Inégalité de Frobenius **Moulin.37**

Soit $u \in \mathcal{L}(E,F)$, $v \in \mathcal{L}(F,G)$ et $w \in \mathcal{L}(G,H)$ où E, F, G et H sont de dimension finie. Montrer que

$$\mathrm{rg}(v \circ u) + \mathrm{rg}(w \circ v) \leqslant \mathrm{rg}(v) + \mathrm{rg}(w \circ v \circ u)$$

Démonstration. Appliquer le théorème du rang aux restrictions de w à $\mathrm{Im}(v)$ et $\mathrm{Im}(v \circ u)$ puis sommer les deux relations obtenues. Observer ensuite que

$$\mathrm{Ker}(w_{|\mathrm{Im}(v \circ u)}) \subset \mathrm{Ker}(w_{|\mathrm{Im}(v)})$$

□

Application. Permet de retrouver la concavité de la suite des noyaux itérés en dimension finie.

Exercice 47 : **Moulin.38**

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Im}(f)$ si, et seulement si :

$$f \circ f = 0 \quad \text{et} \quad \exists h \in \mathcal{L}(E),\ f \circ h + h \circ f = \mathrm{id}_E$$

Exercice 48 : **Moulin.39**

Soit E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On choisit E' et F' tels que :

$$E = E' \oplus \mathrm{Ker}(f) \quad \text{et} \quad F = F' \oplus \mathrm{Im}(f)$$

Montrer qu'il existe un unique $g \in \mathcal{L}(F, E)$ tel que :

$$\mathrm{Ker}(g) = F' \quad \mathrm{Im}(g) = E' \quad f \circ g \circ f = f \quad \text{et} \quad g \circ f \circ g = g$$

Exercice 49 : Δ Commutant d'un endomorphisme cyclique **Moulin.40**

Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n+1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $a \in E$ tel que $\left(u^k(a)\right)_{0 \leqslant k \leqslant n}$ soit une base de E.

1. Donner un exemple d'un tel endomorphisme.
2. Soit $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $v \circ u = u \circ v$. Montrer que v est un polynôme en u.

Démonstration.

1. Tout endomorphisme nilpotent d'indice de nilpotence maximal convient. On peut en expliciter un en envoyant tous les vecteurs d'une base sur le suivant, et en envoyant le dernier sur 0.
2. On peut écrire :

$$v(a) = \sum_{k=0}^{n} \lambda_k u^k(a)$$

On montre alors que

$$v = \sum_{k=0}^{n} \lambda_k u^k$$

en montrant que ces deux applications linéaires coïncident sur la base $\left(u^k(a)\right)_{0 \leqslant k \leqslant n}$ grâce à la commutation.

□

Exercice 50 : Δ **Moulin.41**

Soient u et v deux endomorphismes d'un espace vectoriel E de dimension finie. Montrer l'équivalence entre les deux conditions suivantes :

1. $\mathrm{rg}(u+v) = \mathrm{rg}(u) + \mathrm{rg}(v)$
2. $\mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Im}(v) = \{0\}$ et $\mathrm{Ker}(u) + \mathrm{Ker}(v) = E$

Démonstration. Utiliser l'inégalité

$$\mathrm{rg}(u+v) \leqslant \mathrm{rg}(u) + \mathrm{rg}(v) - \dim\left(\mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Im}(v)\right) \leqslant \mathrm{rg}(u) + \mathrm{rg}(v)$$

C'est moche comme tout, mais ça se fait. Dans le sens direct, on obtiendra

$$\dim(\mathrm{Ker}(u) + \mathrm{Ker}(v)) \geqslant \dim(E)$$

Dans le sens réciproque, on montrera que

$$\mathrm{Im}(u+v) = \mathrm{Im}(u) + \mathrm{Im}(v)$$

L'inclusion réciproque viendra du fait que $E = \mathrm{Ker}(u) + \mathrm{Ker}(v)$. On conclura en utilisant la formule de Grassmann. $\square$

Exercice 51 : Δ **Moulin.42**

Soit E un espace vectoriel de dimension quelconque ainsi qu'une famille $(\varphi_1, \ldots, \varphi_p)$ de formes linéaires sur E.

1. Montrer que $(\varphi_1, \ldots, \varphi_p)$ est libre si, et seulement si, l'application linéaire :

$$v : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{K}^p \\ x & \longmapsto & (\varphi_1(x), \ldots, \varphi_p(x)) \end{array}$$

   est surjective.

2. $\star$ On suppose E de dimension finie. Montrer que $(\varphi_1, \ldots, \varphi_p)$ est génératrice de E^* si, et seulement si, v est injective.

Démonstration. Si v est surjective, on fixe des x_j tels que $\varphi_i(x_j) = \delta_{i,j}$ puis on utilise la caractérisation des familles libres. Pour l'autre sens, on raisonne par contraposée. Si v n'est pas surjective, son image est incluse dans un hyperplan H de $\mathbb{K}^p$. On fixe une équation $\sum a_i y_i = 0$ de cette hyperplan (avec $(a_1, \ldots, a_p) \neq (0, \ldots, 0)$). Alors, on a la relation de liaison $\sum a_i \varphi_i = 0$, si bien que la famille est liée. $\square$

Exercice 52 : **Moulin.43**

Soit u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E ainsi que $(a, b) \in (\mathbb{K}^*)^2$ tels que $u \circ v = au + bv$. Calculer $(u - b\mathrm{id}_E) \circ (v - a\mathrm{id}_E)$. Est-ce que u et v commutent :

1. si E est de dimension finie ?
2. dans le cas général ?

Exercice 53 : **Moulin.44**

1. Soit $x_1, \ldots, x_n$ des réels distincts deux à deux. Montrer que pour tout $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ et tout $(\mu_1, \ldots, \mu_n) \in \mathbb{R}^n$, il existe un unique $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$ tel que pour tout $i \in [\![1, n]\!]$:

$$P(x_i) = \lambda_i \quad \text{et} \quad P'(x_i) = \mu_i$$

2. Généraliser.

Exercice 54 : $\star$ **Moulin.45**

Soit $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$. Calculer la dimension de :

$$\{AU + BV \mid (U, V) \in \mathbb{K}_n[X] \times \mathbb{K}_m[X]\}$$

Exercice 55 : **Moulin.46**

Soit E un espace vectoriel.

1. Δ Quels sont les endomorphismes de E qui laissent stables toutes les droites vectorielles ?
2. On suppose désormais E de dimension finie n jusqu'à la fin de l'exercice. Quels sont les endomorphismes de E qui laissent stables tous les hyperplans ?
3. Soit $p \in [\![1, [\![n-1$. Quels sont les endomorphismes de E qui laissent stables tous les sous-espaces vectoriels de dimension p ?

Exercice 56 : $\star\star$ **Moulin.47**

Montrer que l'endomorphisme $P \mapsto XP$ de $\mathbb{K}[X]$ est la somme de deux automorphismes de $\mathbb{K}[X]$.

6 Théorèmes de factorisation

Exercice 57 : Yin **Moulin.48**

Soit E, F et G trois $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $w \in \mathcal{L}(E, G)$.

1. Montrer qu'il existe $v \in \mathcal{L}(F, G)$ tel que $w = v \circ u$ si, et seulement si, $\mathrm{Ker}(u) \subset \mathrm{Ker}(w)$.
2. Montrer alors que les v répondant à la question précédente forment un sous-espace affine de $\mathcal{L}(F, G)$, dont on donnera la dimension.
3. Montrer que le résultat de la première question subsiste si l'on suppose seulement F de dimension finie.

Exercice 58 : Yang **Moulin.49**

Soit E, F et G trois $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimension finie, $v \in \mathcal{L}(F, G)$ et $w \in \mathcal{L}(E, G)$.

1. Montrer qu'il existe $u \in \mathcal{L}(E, F)$ tel que $w = v \circ u$ si, et seulement si, $\mathrm{Im}(w) \subset \mathrm{Im}(v)$.
2. Montrer alors que les u répondant à la question précédente forment un sous-espace affine de $\mathcal{L}(E, F)$, dont on donnera la dimension.
3. Montrer que le résultat de la première question subsiste si l'on suppose seulement F de dimension finie.

Exercice 59 : $\star$ **Moulin.50**

Soit u, u_1 et u_2 trois endomorphismes d'un espace vectoriel E de dimension finie.

1. Montrer que $\mathrm{Im}(u) \subset \mathrm{Im}(u_1) + \mathrm{Im}(u_2)$ si, et seulement s'il existe $(v_1, v_2) \in \mathcal{L}(E)^2$ tel que $u = u_1 \circ v_1 + u_2 \circ v_2$.
2. Montrer que $\mathrm{Ker}(u_1) \cap \mathrm{Ker}(u_2) \subset \mathrm{Ker}(u)$ si, et seulement s'il existe $(v_1, v_2) \in \mathcal{L}(E)^2$ tel que $u = v_1 \circ u_2 + v_2 \circ u_2$.

Exercice 60 : Δ Indépendance des formes linéaires **Moulin.51**

Soit $(\varphi, \varphi_1, \ldots, \varphi_n)$ des formes linéaires sur E (de dimension quelconque). Montrer le théorème d'indépendance des formes linéaires :

$$\bigcap_{i=1}^{n} \mathrm{Ker}(\varphi_i) \subset \mathrm{Ker}(\varphi) \iff \varphi \in \mathrm{Vect}(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$$

Démonstration. Le sens réciproque est trivial. Pour le sens direct, se réduire au cas d'une famille libre de formes linéaires puis utiliser le lemme pour la dualité en dimension quelconque. □

Exercice 61 : $\star\star$ Idéaux de $\mathcal{L}(E)$ **Moulin.52**

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, et $\mathcal{U}$ un idéal à droite de $\mathcal{L}(E)$, c'est-à-dire un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ tel que :

$$\forall (a, u) \in \mathcal{L}(E) \times \mathcal{U},\ u \circ a \in \mathcal{U}$$

1. Montrer qu'il existe un sous-espace vectoriel F de E tel que $\mathcal{U} = \mathcal{L}(E, F)$.
2. Montrer qu'il existe $t \in \mathcal{U}$ tel que $\mathcal{U} = \{t \circ a \mid a \in \mathcal{L}(E)\}$.
3. Expliciter de même les idéaux à gauche de $\mathcal{L}(E)$, c'est-à-dire les sous-espaces vectoriels $\mathcal{V}$ de $\mathcal{L}(E)$ tel que :

$$\forall (a, v) \in \mathcal{L}(E) \times \mathcal{V},\ a \circ v \in \mathcal{V}$$

4. Quels sont les idéaux bilatères (*ie* les idéaux à gauche et à droite simultanément) de $\mathcal{L}(E)$?

7 Projecteurs

Exercice 62 : $\circ$ **Moulin.53**

Soit p un projecteur d'un espace vectoriel E. Montrer qu'un endomorphisme u de E commute avec p si, et seulement si, il laisse stable le noyau et l'image de p.

Démonstration. En réalité, il s'agit là de résultats de réduction. Le sens direct est immédiat (c'est même du cours en réduction). Réciproquement, décomposer $x \in E$ sur $\mathrm{Ker}(p) \oplus \mathrm{Im}(p)$ en $x = a + b$ et calculer $u(p(x))$ et $p(u(x))$. On obtient dans les deux cas $u(b)$. □

Exercice 63 : S **Moulin.54**

oit E un espace vectoriel de dimension n, F un espace vectoriel ainsi que $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, E)$. On suppose que $u \circ v$ est un projecteur de rang n. Montrer que $v \circ u = \mathrm{id}_E$. Réciproque ?

Exercice 64 : Nouveau projecteur **Moulin.55**

Soit p et q deux projecteurs d'un espace vectoriel E tels que $\mathrm{Im}(p) \subset \mathrm{Ker}(q)$. Montrer que

$$r = p + q - p \circ q$$

est un projecteur. Montrer que

$$\begin{cases} \mathrm{Im}(r) = \mathrm{Im}(p) \cap \mathrm{Im}(q) \\ \mathrm{Ker}(r) = \mathrm{Ker}(p) + \mathrm{Ker}(q) \end{cases}$$

Démonstration. Calculer r^2 et utiliser le fait que $q \circ p = 0$. On trouve bien $r^2 = r$. Montrer ensuite à la main toutes les inclusions qu'il faut (c'est long et embêtant). □

Exercice 65 : ⋆ **Moulin.56**

Soit $p_1, \ldots, p_r$ des projecteurs d'un espace vectoriel E de dimension finie. Montrer que $p = p_1 + \ldots + p_r$ est un projecteur si, et seulement si,

$$\forall i \neq j,\ p_i \circ p_j = 0$$

On montrera que l'image de p est la somme directe des images des p_i.

Démonstration. Le sens réciproque est immédiat. pour le sens direct, utiliser la trace (qui est égale au rang pour des projecteurs), ce qui permet d'obtenir par linéarité de la trace :

$$\mathrm{rg}(p) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{rg}(p_i)$$

On en déduit que les images des p_i sont en somme directe et que

$$\mathrm{Im}(p) = \bigoplus_{i=1}^{n} \mathrm{Im}(p_i)$$

On remarque ensuite grâce à cette égalité que $p \circ p_i = p_i$ et on écrit pour tout $x \in E$, par définition de p :

$$p_i(x) = p_i(x) + \sum_{j \neq i} \underbrace{p_j \circ p_i(x)}_{\in \mathrm{Im}(p_j)}$$

Puisque la somme est directe, on en déduit que $p_j \circ p_i(x) = 0$ et donc $p_j \circ p_i = 0$, ceci valant pour tout $x \in E$. □

Exercice 66 : **Moulin.57**

Soit E un espace vectoriel. On considère deux projecteurs p et q de E tels que $p \circ q - q \circ p = q - p$.

1. Montrer que p et q ont la même image.
2. Que se passe-t-il si l'on remplace l'hypothèse par $p \circ q - q \circ p = p - q$?

Exercice 67 : Δ **Moulin.58**

Soit p, q et r trois projecteurs d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie. On suppose que $p + \sqrt{2}q + \sqrt{3}r = 0$. Montrer que $p = q = r = 0$.

Démonstration. En dimension finie, la trace d'un projecteur est égale à son rang. On passe à la trace. Tout revient alors à prouver que la famille $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$ est $\mathbb{Q}$-libre. Pour cela, élever une relation de liaison au carré et utiliser le fait que $\sqrt{2}$ est irrationnel (savoir redémontrer ce fait rapidement avec des valuations 2-adiques). Ou dans ce cas, on a la somme de trois nombres réels positifs qui est nulle... □

Exercice 68 : $\star\star$ **Moulin.59**

Soit p, q et r trois projecteurs d'un espace vectoriel E sur un corps de caractéristique différente de 2 et de 3. On suppose que $p + q + r = 0$. Montrer que $p = q = r = 0$.

Démonstration. Premièrement, on montre que

$$\mathrm{Im}(p) \cap \mathrm{Im}(q) \cap \mathrm{Im}(r) = \{0\}$$

en utilisant le fait que la caractéristique est différente de 3. Ensuite, on prouve que

$$\mathrm{Im}(p) \cap \mathrm{Im}(q) \subset \mathrm{Im}(r)$$

en utilisant le fait que la caractéristique est différente de 2. On a de même les inclusions symétriques. On en déduit que

$$\mathrm{Im}(p) \cap \mathrm{Im}(q) = \mathrm{Im}(p) \cap \mathrm{Im}(r) = \mathrm{Im}(q) \cap \mathrm{Im}(r) = \{0\}$$

Soit $x \in \mathrm{Ker}(r)$. Alors $p(x) = q(-x) \in \mathrm{Im}(p) \cap \mathrm{Im}(q)$ donc

$$\mathrm{Ker}(r) \subset \mathrm{Ker}(p) \quad \text{et} \quad \mathrm{Ker}(r) \subset \mathrm{Ker}(q)$$

On a de même les inclusions symétriques, dont on déduit :

$$\mathrm{Ker}(p) = \mathrm{Ker}(q) = \mathrm{Ker}(r)$$

Enfin, soit $x \in E$ qu'on décompose comme $a_1 + b_1$ selon p, $a_2 + b_2$ selon q et $a_3 + b_3$ selon r. On a alors $a_1 + a_2 + a_3 = 0$ par hypothèse donc $3.x = b_1 + b_2 + b_3$. L'égalité des noyaux fournit alors :

$$3.p(x) = 3.q(x) = 3.r(x) = 0$$

On conclut en utilisant le fait que E n'est pas de caractéristique 3. □

8 Extensions algébriques et groupes de Galois

Exercice 69 : Extensions algébriques de $\mathbb{Q}$ **Châteaux**

Soit $\alpha \in \mathbb{C}$. On pose $\mathbb{Q}[\alpha] = \{P(\alpha) \mid P \in \mathbb{Q}[X]\}$ et $\mathcal{I}_\alpha = \{P \in \mathbb{Q}[X] \mid P(\alpha) = 0\}$. Plus généralement, si $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$, on définira $\mathbb{K}[\alpha] = \{P(\alpha) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$ et $\mathcal{I}_\alpha$ de même.

1. Justifier que $\mathbb{Q}[\alpha]$ est la plus petite $\mathbb{Q}$-algèbre contenant α.
2. Vérifier que $\mathcal{I}_\alpha$ est un idéal de $\mathbb{Q}[X]$.
   Un nombre complexe est dit algébrique sur $\mathbb{Q}$ lorsque $\mathcal{I}_\alpha$ n'est pas réduit à $\{0\}$, autrement dit lorsque α est racine d'un polynôme non nul à coefficients dans $\mathbb{Q}$.
3. Si α est algébrique, vérifier qu'il existe un unique polynôme unitaire $M_\alpha \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $\mathcal{I}_\alpha = M_\alpha \mathbb{Q}[X]$. Le polynôme M_α est appelé polynôme minimal de α.
4. On suppose α algébrique.
   a. Montrer que $\mathbb{Q}[\alpha]$ est un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel de dimension égale au degré de M_α.
   b. Montrer que le polynôme M_α est irréductible sur $\mathbb{Q}$ et en déduire que $\mathbb{Q}[\alpha]$ est un corps.

Exercice 70 : Exemples **Châteaux**

1. Montrer que $\sqrt{2}$ est algébrique et calculer son polynôme minimal.
2. $\sqrt[3]{2} + \sqrt{5}$ est-il rationnel ? algébrique ?
3. Soit $P = X^3 - X - 1$. Montrer que P est irréductible sur $\mathbb{Q}$ et qu'il a une unique racine réelle a. Déterminer la dimension et une base de $\mathbb{Q}[a]$.

Exercice 71 : Théorème de la base télescopique **Châteaux**

Soit $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}$ et $\mathbb{M}$ trois corps commutatifs tels que $\mathbb{K} \subset \mathbb{L} \subset \mathbb{M}$. Démontrer que si $\mathbb{L}$ est de dimension finie sur $\mathbb{K}$ et si $\mathbb{M}$ est de dimension finie sur $\mathbb{L}$, alors $\mathbb{M}$ est de dimension finie sur $\mathbb{K}$ et on a la formule de multiplicativité des degrés :

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{M}) = \dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) \times \dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{M})$$

Exercice 72 : Un exemple d'extension algébrique **Châteaux**

On pose $\mathbb{K} = \mathbb{Q}[\sqrt{2}][\sqrt{3}]$.

1. Montrer que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est algébrique et déterminer son polynôme minimal.
2. Montrer que $\mathbb{K} = \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$.
3. Montrer que $\mathbb{K} = \mathbb{Q} + \mathbb{Q}\sqrt{2} + \mathbb{Q}\sqrt{3} + \mathbb{Q}\sqrt{6}$.
4. Déterminer les automorphismes de corps de $\mathbb{K}$.

Exercice 73 : Un autre exemple **Châteaux**

On pose $\mathbb{K} = \mathbb{Q}[j, \sqrt{2}]$. Par une démarche analogue à celle de l'exercice précédent, montrer que $\mathbb{K} = \mathbb{Q}[j + \sqrt{2}]$ puis déterminer le polynôme minimal de $j + \sqrt{2}$.

Exercice 74 : Structure de l'ensemble des nombres algébriques **Châteaux**

1. Montrer que α est algébrique si, et seulement s'il existe un sous-corps $\mathbb{K}$ de $\mathbb{C}$ contenant α et de dimension finie sur $\mathbb{Q}$.
2. En déduire que si α et β sont algébriques, alors $\alpha + \beta$ et $\alpha\beta$ sont algébriques.
3. En déduire que l'ensemble des nombres algébriques $\mathbb{A}$ sur $\mathbb{Q}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.
4. Montrer que $\mathbb{A}$ est algbériquement clos, c'est-à-dire que tout polynôme non constant à coefficients dans $\mathbb{A}$ est scindé sur $\mathbb{A}$.

Exercice 75 : Avec des polynômes cyclotomiques **Châteaux**

Soit p un nombre premier. On admet que le polynôme $\Phi_p = X^{p-1} + \ldots + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$. Déterminer la dimension de l'espace vectoriel $\mathbb{Q}\left[\exp\left(\frac{2i\pi}{p}\right)\right]$ sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 76 : Groupe de Galois **Châteaux**

Soit $\mathbb{K}$ un corps et $\mathbb{L}$ un surcorps de $\mathbb{K}$. On note $\mathrm{Gal}(\mathbb{L} \mid \mathbb{K})$ l'ensemble des automorphismes du corps $\mathbb{L}$ dont la restriction à $\mathbb{K}$ est l'identité.

1. Montrer que $\mathrm{Gal}(\mathbb{L} \mid \mathbb{K})$ muni de la loi $\circ$ est un groupe, appelé groupe de Galois de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$.
2. Déterminer ce groupe de Galois lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ et $\mathbb{L}$ est l'une des extensions suivantes :
   a. $\mathbb{L} = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$;
   b. $\mathbb{L} = \mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$;
   c. $\mathbb{L} = \mathbb{Q}\left[\exp\left(\frac{2i\pi}{p}\right)\right]$ où p est un nombre premier.