绝密★启用前

| 考生姓名 | |
|---|---|
| 考生编号 | |

# 2015 年全国硕士研究生招生考试

## 数学（三）试题

（科目代码：303）

### 考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 |
|---|---|---|---|
| 分值 | 32 分 | 24 分 | 94 分 |
| 自测分 | | | |


考研数学三
历年真题
配套讲解

# 2015 年全国硕士研究生招生考试数学（三）试题

## 一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

**(1)** 设$\{x_n\}$是数列. 下列命题中不正确的是（　）.


(A) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$

(B) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

(C) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$

(D) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

**(2)** 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内连续，其二阶导函数$f''(x)$的图形如下图所示，则曲线$y=f(x)$的拐点个数为（　）.




(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

**(3)** 设$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2x,x^2+y^2\le 2y\}$，函数$f(x,y)$在$D$上连续，则$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　）.

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

(B) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

(C) $2\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{x}f(x,y)\mathrm{d}y$

(D) $2\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

**(4)** 下列级数中发散的是（　）.

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}$　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$　　(C) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n+1}{\ln n}$　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**(5)** 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件为（　）.

（A）$a\notin\Omega,d\notin\Omega$　　（B）$a\notin\Omega,d\in\Omega$　　（C）$a\in\Omega,d\notin\Omega$　　（D）$a\in\Omega,d\in\Omega$

**(6)** 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$，若 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 下的标准形为（　）.

（A）$2y_1^2-y_2^2+y_3^2$　　（B）$2y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（C）$2y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　（D）$2y_1^2+y_2^2+y_3^2$

**(7)** 若 $A,B$ 为任意两个随机事件，则（　）.

（A）$P(AB)\le P(A)P(B)$　　（B）$P(AB)\ge P(A)P(B)$

（C）$P(AB)\le\dfrac{P(A)+P(B)}{2}$　　（D）$P(AB)\ge\dfrac{P(A)+P(B)}{2}$

**(8)** 设总体 $X\sim B(m,\theta)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则 $E\left[\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]=$（　）.

（A）$(m-1)n\theta(1-\theta)$　　（B）$m(n-1)\theta(1-\theta)$

（C）$(m-1)(n-1)\theta(1-\theta)$　　（D）$mn\theta(1-\theta)$

## 二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

**(9)** $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}=$_____.

**(10)** 设函数 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^{x^2}xf(t)\mathrm{d}t$. 若 $\varphi(1)=1,\varphi'(1)=5$，则 $f(1)=$_____.

**(11)** 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=$_____.

**(12)** 设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y''+y'-2y=0$ 的解，且在 $x=0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3，则 $y(x)=$_____.

**(13)** 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2，−2，1，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，则行列式 $|\boldsymbol{B}|=$_____.



历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

**（14）** 设二维随机变量$(X,Y)$服从正态分布$N(1,0;1,1;0)$，则$P\{XY-Y<0\}=$_____.

## 三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

**（15）（本题满分 10 分）**

设函数$f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x, g(x)=kx^3$. 若$f(x)$与$g(x)$在$x\to 0$时是等价无穷小，求$a,b,k$的值.

**（16）（本题满分 10 分）**

计算二重积分$\iint\limits_D x(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2, y\ge x^2\}$.

**（17）（本题满分 10 分）**

为了实现利润最大化，厂商需要对某商品确定其定价模型. 设$Q$为该商品的需求量，$P$为价格，$MC$为边际成本，$\eta$为需求弹性$(\eta>0)$.

（1）证明定价模型为$P=\dfrac{MC}{1-\dfrac{1}{\eta}}$；

（2）若该商品的成本函数为$C(Q)=1600+Q^2$，需求函数为$Q=40-P$，试由（1）中的定价模型确定此商品的价格.

**（18）（本题满分 10 分）**

设函数$f(x)$在定义域$I$上的导数大于零. 若对任意的$x_0\in I$，曲线$y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$处的切线与直线$x=x_0$及$x$轴所围成区域的面积恒为 4，且$f(0)=2$，求$f(x)$的表达式.

**（19）（本题满分 10 分）**

（1）设函数$u(x),v(x)$可导，利用导数定义证明$[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$；

（2）设函数$u_1(x),u_2(x),\cdots,u_n(x)$可导，$f(x)=u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$，写出$f(x)$的求导公式.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**（20）（本题满分 11 分）**

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$.

（1）求 $a$ 的值；

（2）若矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，求 $\boldsymbol{X}$.

**（21）（本题满分 11 分）**

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

（1）求 $a,b$ 的值；

（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

**（22）（本题满分 11 分）**

设随机变量 $X$ 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} 2^{-x}\ln 2, & x>0, \\ 0, & x\le 0. \end{cases}$ 对 $X$ 进行独立重复的观测，直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止，记 $Y$ 为观测次数.

（1）求 $Y$ 的概率分布；

（2）求 $EY$.

**（23）（本题满分 11 分）**

设总体 $X$ 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases} \dfrac{1}{1-\theta}, & \theta\le x\le 1 \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 $\theta$ 为未知参数. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

（1）求 $\theta$ 的矩估计量；

（2）求 $\theta$ 的最大似然估计量.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取