

AI 기초

2019-2020

강봉주

조건부 확률과 독립

조건부 확률과 독립

[조건부 확률]


어떤 확률 시행에서 관심이 있는 결과는 특정한 표본 공간의 부분 집합에만 있다고 하자. 즉, $\omega_1 \subset \Omega$. 이런 경우를 ω_1 ($P(\omega_1) > 0$) 을 표본 공간으로 하는 새로운 확률을 정의하는 문제이다.

조건부 확률과 독립

[조건부 확률]

예제)

주머니 속에 빨간 돌이 3개 파란 돌이 5개 있을 때, 임의로 빼낸 돌은 다시 넣지 않고(비복원) 연속적으로 돌을 꺼낸다고 하자. 이 때 첫번째 꺼낸 돌이 빨간 돌(ω_1)일 때 두번째 꺼낸 돌(ω_2)이 파란 돌일 확률은?




조건부 확률과 독립

[조건부 확률]

예제)

첫번째 꺼낸 돌이 빨간 돌(ω_1)일 확률




$$\Pr(\omega_1) = \frac{\binom{3}{1}}{\binom{8}{1}} = \frac{3}{8}$$

조건부 확률과 독립

[조건부 확률]

예제)

첫번째 꺼낸 돌이 빨간 돌(ω_1)이고 두번째 꺼낸 돌(ω_2)이 파란 돌일 확률




$$\Pr(\omega_1 \cap \omega_2) = \frac{\binom{3}{1} \binom{5}{1}}{\binom{8}{1} \binom{7}{1}} = \frac{15}{56}$$

조건부 확률과 독립

[조건부 확률]

예제)

첫번째 꺼낸 돌이 빨간 돌(ω_1)일 때 두번째 꺼낸 돌(ω_2)이 파란 돌일 확률




조건부 확률과 독립

[조건부 확률]

예제)

첫번째 꺼낸 돌이 빨간 돌(ω_1)인 경우에 표본 공간은 돌이 7개 이 중에서 파란 돌을 꺼낼 확률



조건부 확률과 독립

[조건부 확률]

- 조건부 확률의 정의

$$A_1, A_2 \subset \mathcal{X}, \quad P(A_1) > 0$$


$$P(A_2|A_1) = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)}$$

조건부 확률과 독립

[주변 분포(marginal distribution)와 조건부 분포(conditional distribution)]

- 2개의 확률변수 X_1, X_2 에 대한 확률밀도함수를 $f(x_1, x_2)$
- 하나가 아니므로 결합(joint) 확률밀도함수

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1 + x_2}{21}, x_1 = 1, 2, 3, \quad x_2 = 1, 2$$



조건부 확률과 독립

[주변 분포(marginal distribution)와 조건부 분포(conditional distribution)]

- 2개의 확률변수 X_1, X_2 에 대한 확률밀도함수를 $f(x_1, x_2)$
- 하나가 아니므로 결합(joint) 확률밀도함수

```
In      # 결합 확률 정의
        from pgmpy.factors.discrete import JointProbabilityDistribution as JPD

        prob = list()
        for i in np.arange(1, 4):
            for j in np.arange(1,3):
                prob.append((i+j)/21)

        fxy = JPD(['X1', 'X2'],[3, 2], prob)
        print(fxy)
```

조건부 확률과 독립

[주변 분포(marginal distribution)와 조건부 분포(conditional distribution)]

- 2개의 확률변수 X_1, X_2 에 대한 확률밀도함수를 $f(x_1, x_2)$
- 하나가 아니므로 결합(joint) 확률밀도함수


Out	X1	X2	P(X1,X2)
	X1(0)	X2(0)	0.0952
	X1(0)	X2(1)	0.1429
	X1(1)	X2(0)	0.1429
	X1(1)	X2(1)	0.1905
	X1(2)	X2(0)	0.1905
	X1(2)	X2(1)	0.2381

조건부 확률과 독립

[주변 분포(marginal distribution)와 조건부 분포(conditional distribution)]

- 2개의 확률변수 X_1, X_2 에 대한 확률밀도함수를 $f(x_1, x_2)$
- 하나가 아니므로 결합(joint) 확률밀도함수

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1 + x_2}{21}, x_1 = 1, 2, 3, \quad x_2 = 1, 2$$



조건부 확률과 독립

[주변 분포(marginal distribution)와 조건부 분포(conditional distribution)]

- 2개의 확률변수 X_1, X_2 에 대한 확률밀도함수를 $f(x_1, x_2)$
- 하나가 아니므로 결합(joint) 확률밀도함수

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1 + x_2}{21}, x_1 = 1, 2, 3, \quad x_2 = 1, 2$$

		3		
$x_2 = 1, 2$	2	$\frac{2}{21}$		
	1	$\frac{2}{21}$		
		1	2	3
		$x_1 = 1, 2, 3$		

$$\Pr(X_1 = 1) = \frac{2}{21} + \frac{3}{21} = \frac{5}{21}$$

조건부 확률과 독립

[주변 분포(marginal distribution)와 조건부 분포(conditional distribution)]

- 2개의 확률변수 X_1, X_2 에 대한 확률밀도함수를 $f(x_1, x_2)$
- 하나가 아니므로 결합(joint) 확률밀도함수

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1 + x_2}{21}, x_1 = 1, 2, 3, \quad x_2 = 1, 2$$

		3		
		<hr/>		
$x_2 = 1, 2$	2	21		
	1	2		
		<hr/>		
		21		
		<hr/>		
		1	2	3
		$x_1 = 1, 2, 3$		

$$\begin{aligned}\Pr(X_1 = 1) &= f(1,1) + f(1,2) \\ &= \sum_{x_2} f(1, x_2) \\ &= f_1(1)\end{aligned}$$

조건부 확률과 독립

[주변 분포(marginal distribution)와 조건부 분포(conditional distribution)]

- 2개의 확률변수 X_1, X_2 에 대한 확률밀도함수를 $f(x_1, x_2)$
- 하나가 아니므로 결합(joint) 확률밀도함수
- X_1 확률변수의 주변(marginal) 확률밀도함수

$$f_1(x_1) = \sum_{x_2} f(x_1, x_2) = f(x_1, 1) + f(x_1, 2) = \frac{x_1 + 1}{21} + \frac{x_1 + 2}{21} = \frac{2x_1 + 3}{21}$$

결합 확률 밀도 함수가 주어지면 주변 분포를 구할 수 있다.

조건부 확률과 독립

[주변 분포(marginal distribution)와 조건부 분포(conditional distribution)]

- 2개의 확률변수 X_1, X_2 에 대한 확률밀도함수를 $f(x_1, x_2)$
- 하나가 아니므로 결합(joint) 확률밀도함수
- X_1 확률변수의 주변(marginal) 확률밀도함수

```
In      # 주변 확률 구하기
        fx = fxy.marginal_distribution(['X1'], inplace=False)
        print(fx)
```


```
Out      +-----+-----+
          | X1      | P(X1) |
          +=====+=====+
          | X1(0) | 0.2381 |
          +-----+-----+
          | X1(1) | 0.3333 |
          +-----+-----+
          | X1(2) | 0.4286 |
          +-----+-----+
```

조건부 확률과 독립

[주변 분포(marginal distribution)와 조건부 분포(conditional distribution)]

- 2개의 확률변수 X_1, X_2 에 대한 확률밀도함수를 $f(x_1, x_2)$
- 하나가 아니므로 결합(joint) 확률밀도함수

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1 + x_2}{21}, x_1 = 1, 2, 3, \quad x_2 = 1, 2$$




조건부 확률과 독립

[주변 분포(marginal distribution)와 조건부 분포(conditional distribution)]

- 2개의 확률변수 X_1, X_2 에 대한 확률밀도함수를 $f(x_1, x_2)$
- 하나가 아니므로 결합(joint) 확률밀도함수

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1 + x_2}{21}, x_1 = 1, 2, 3, \quad x_2 = 1, 2$$



$$\begin{aligned} \Pr(X_2|X_1 = 1) &= \frac{f(x_2, 1)}{f_1(1)} \\ &= \frac{\frac{x_2 + 1}{21}}{\frac{5}{21}} = \frac{x_2 + 1}{5} \end{aligned}$$

조건부 확률과 독립

[주변 분포(marginal distribution)와 조건부 분포(conditional distribution)]

- 2개의 확률변수 X_1, X_2 에 대한 확률밀도함수를 $f(x_1, x_2)$
- 하나가 아니므로 결합(joint) 확률밀도함수
- $\Pr(X_2|X_1 = 1) = \frac{f(x_2, 1)}{f_1(1)}$

```
In      prob = fxy.conditional_distribution(['X1', 0]), inplace=False)
        print(prob)
```

```
Out      +-----+-----+
          | X2      | P(X2) |
          +=====+=====+
          | X2(0) | 0.4000 |
          +-----+-----+
          | X2(1) | 0.6000 |
          +-----+-----+
```

조건부 확률과 독립

[주변 분포(marginal distribution)와 조건부 분포(conditional distribution)]

- 2개의 확률변수 X_1, X_2 에 대한 확률밀도함수를 $f(x_1, x_2)$
- 하나가 아니므로 결합(joint) 확률밀도함수
- $X_1 = x_1$ 일 때 X_2 의 조건부 확률밀도함수

$$f(x_2|x_1) = \frac{f(x_1, x_2)}{f_1(x_1)}$$

조건부 확률과 독립

[상관계수(correlation coefficient)]

- X, Y 의 2개의 확률변수의 결합확률밀도함수가 $f(x, y)$
- 주변 기대값과 분산은 $\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2$
- X, Y 의 공분산(covariance)은 σ_{XY}

$$\begin{aligned}\sigma_{XY} &= E(X - \mu_X)(Y - \mu_Y) \\ &= E(XY - \mu_Y X - \mu_X Y + \mu_X \mu_Y) \\ &= E(XY) - \mu_Y E(X) - \mu_X E(Y) + \mu_X \mu_Y \\ &= E(XY) - \mu_X \mu_Y\end{aligned}$$

조건부 확률과 독립

[상관계수(correlation coefficient)]

- X, Y 의 2개의 확률변수의 결합확률밀도함수가 $f(x, y)$
- 주변 기대값과 분산은 $\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2$
- X, Y 의 공분산(covariance)은 σ_{XY}
- 상관계수(correlation coefficient)는 ρ_{XY}

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}$$

조건부 확률과 독립

[상관계수(correlation coefficient)]

예제) 다음의 분포에서 상관계수를 구하세요.

(x, y)	$(1, 1)$	$(1, 2)$	$(1, 3)$	$(2, 1)$	$(2, 2)$	$(2, 3)$
$f(x, y)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$

조건부 확률과 독립

[상관계수(correlation coefficient)]

예제) 다음의 분포에서 상관계수를 구하세요.

(x, y)	$(1, 1)$	$(1, 2)$	$(1, 3)$	$(2, 1)$	$(2, 2)$	$(2, 3)$
$f(x, y)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$

$$E(X) = \sum_x x \sum_y f(x, y) = 1 \left(\frac{2}{15} + \frac{4}{15} + \frac{3}{15} \right) + 2 \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{4}{15} \right) = \frac{21}{15}$$

$$E(X^2) = \sum_x x^2 \sum_y f(x, y) = 1 \left(\frac{2}{15} + \frac{4}{15} + \frac{3}{15} \right) + 2^2 \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{4}{15} \right) = \frac{33}{15}$$

$$\sigma_X^2 = E(X^2) - \mu_X^2 = \frac{11}{5} - \left(\frac{7}{5} \right)^2 = \frac{6}{25}, \quad \sigma_X = \frac{\sqrt{6}}{5}$$

조건부 확률과 독립

[상관계수(correlation coefficient)]

예제) 다음의 분포에서 상관계수를 구하세요.

(x, y)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)
$f(x, y)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$

$$E(Y) = \sum_y y \sum_x f(x, y) = 1 \left(\frac{2}{15} + \frac{1}{15} \right) + 2 \left(\frac{4}{15} + \frac{1}{15} \right) + 3 \left(\frac{3}{15} + \frac{4}{15} \right) = \frac{34}{15}$$

$$E(Y^2) = \sum_y y^2 \sum_x f(x, y) = 1 \left(\frac{2}{15} + \frac{1}{15} \right) + 2^2 \left(\frac{4}{15} + \frac{1}{15} \right) + 3^2 \left(\frac{3}{15} + \frac{4}{15} \right) = \frac{86}{15}$$

$$\sigma_Y^2 = E(Y^2) - \mu_Y^2 = \frac{86}{15} - \left(\frac{34}{15} \right)^2 = \frac{134}{225}, \sigma_Y = \frac{\sqrt{134}}{15}$$

조건부 확률과 독립

[상관계수(correlation coefficient)]

예제) 다음의 분포에서 상관계수를 구하세요.

(x, y)	$(1, 1)$	$(1, 2)$	$(1, 3)$	$(2, 1)$	$(2, 2)$	$(2, 3)$
$f(x, y)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$

$$E(XY) = \sum_x \sum_y xyf(x, y) = 1 \times 1 \times \frac{1}{15} + \dots + 2 \times 3 \times \frac{4}{15} = \frac{49}{15}$$

$$\sigma_{XY} = \frac{49}{15} - \frac{21}{15} \times \frac{34}{15} = \frac{21}{225}$$

$$\rho_{XY} = \frac{\frac{21}{225}}{\frac{\sqrt{6}}{5} \times \frac{\sqrt{134}}{15}} = 0.247$$

조건부 확률과 독립

[상관계수(correlation coefficient)]

과제) 다음의 분포에서 상관계수를 프로그램으로 구하세요.

(x, y)	$(1, 1)$	$(1, 2)$	$(1, 3)$	$(2, 1)$	$(2, 2)$	$(2, 3)$
$f(x, y)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$

조건부 확률과 독립

[독립]

- 2개의 확률변수 X_1, X_2 에 대한 결합확률밀도함수를 $f(x_1, x_2)$
- 조건부확률밀도함수를 이용한 결합확률밀도함수

$$f(x_1, x_2) = f(x_2|x_1)f_1(x_1)$$

조건부 확률과 독립

[독립]

- 2개의 확률변수 X_1, X_2 에 대한 결합확률밀도함수를 $f(x_1, x_2)$
- 조건부확률밀도함수를 이용한 결합확률밀도함수
- $f(x_1, x_2) = f(x_2|x_1)f_1(x_1)$
- 조건부확률밀도함수 $f(x_2|x_1)$ 가 x_1 에 의존하지 않을 때

$$f_2(x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_2|x_1)f_1(x_1) dx_1 = f(x_2|x_1) \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) dx_1 = f(x_2|x_1)$$

따라서 결합확률밀도함수는 다음과 같이 정의된다.

$$f(x_1, x_2) = f_2(x_2)f_1(x_1)$$

조건부 확률과 독립

[독립]

- 2개의 확률변수 X_1, X_2 가 서로 독립이기 위한 필요 충분 조건

$$f(x_1, x_2) = f_2(x_2)f_1(x_1)$$

조건부 확률과 독립

[독립]

예제) 다음과 같이 결합 확률밀도함수가 정의된 두개의 확률 변수 X_1, X_2 에 대하여 독립 여부를 판정하세요.

$$f(x_1, x_2) = x_1 + x_2, \quad 0 < x_1, x_2 < 1$$

조건부 확률과 독립

[독립]

예제) 다음과 같이 결합 확률밀도함수가 정의된 두개의 확률 변수 X_1, X_2 에 대하여 독립 여부를 판정하세요.

$$f(x_1, x_2) = x_1 + x_2, \quad 0 < x_1, x_2 < 1$$

$$f_1(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_2 = x_1 + \frac{1}{2}, \quad f_2(x_2) = x_2 + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow f(x_1, x_2) \neq f_1(x_1)f_2(x_2)$$

조건부 확률과 독립

[독립]

- 2개의 확률변수가 독립인 경우의 중요한 성질
- $u(X_1)$ 은 X_1 만의 함수이고, $v(X_2)$ 는 X_2 만의 함수일 때

$$E(u(X_1)v(X_2)) = E(u(X_1))E(v(X_2))$$

$$E((X - \mu_X)(Y - \mu_Y)) = E(X - \mu_X)E(Y - \mu_Y) = 0$$