

DB1504

赤 峰 市 地 方 标 准

DB1504/T 1003—2018

日光温室番茄水肥一体化技术规程

The technical regulations for integrating tomato water and fertilizer
in solar greenhouse

2018 – 12 – 27 发布

2019 – 01 – 27 实施

赤峰市工商管理质量技术监督局

发 布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由赤峰市农牧局提出并归口。

本标准起草单位：赤峰市土壤肥料工作站、赤峰市农业技术服务中心、松山区土壤肥料工作站。

本标准主要起草人：王晓峰、李玉民、牟晓东、查娜、王淑华、冯彬。

日光温室番茄水肥一体化技术规程

1 范围

本标准规定了日光温室番茄水肥一体化的产地条件、管理措施和采收。
本标准适用赤峰地区日光温室番茄种植生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

3 产地条件

3.1 环境条件

土壤环境要符合 GB 15618 规定的要求。

3.2 设施条件

设施配套齐全的日光温室。

4 管理措施

4.1 合理轮作

避免与茄科蔬菜连作。

4.2 品种选择

选择抗病、优质、丰产、抗逆性强、商品性好的品种，选用大型育苗厂培育的壮苗。

4.3 整地施肥

深翻 40 cm，结合深翻每亩施用优质农家肥 6000 kg~8000 kg，基施化肥折纯 N15.0 kg、P2O₅13.0 kg、K₂O18.0 kg，不得用含氯肥料，施肥后平整土地并起垄覆膜，垄高 15 cm~20 cm。

4.4 定植

采取大小垄种植，大行距 90 cm，小行距 60 cm，株距 50 cm，双垄定植，每亩定植密度 2000～2200 株。

4.5 田间管理

4.5.1 缓苗期管理

定植后及时浇水，视苗情浇缓苗水，白天气温保持 25 ℃～30 ℃，夜间 15 ℃～18 ℃。

4.5.2 蹲苗

苗期采用控水蹲苗，促进根系生长。

4.5.3 温度调节

定植后，室内温度不超过 30 ℃不放风；缓苗后，白天温度控制在 22 ℃～28 ℃，夜间不低于 15 ℃；结果期，白天 20 ℃～28 ℃，夜间 10 ℃以上。

4.5.4 植株调整

单干整枝，适时绑蔓，每株番茄留六穗果后摘心。

4.5.5 蘸花保果

当番茄开花时，用对氯苯氧乙酸 20 mg/kg～30 mg/kg 的药液喷花。

4.6 灌溉施肥

根据番茄目标产量，结合番茄的不同生育时期，制定番茄灌溉施肥周期、灌溉施肥次数、每次灌溉施肥定额及灌溉施肥总量，具体见表 1。

表1 日光温室番茄目标产量 7500 kg/667m², 推荐灌溉施肥要求

生育期 灌溉施肥	定植	缓苗	结果初期			结果盛期			结果后期			合计		
灌溉水量 (m ³ /667m ²)	20	10	12			15			12			160		
灌溉次数	1	1	3			4			2			11		
追肥 (kg/667m ² , 折纯)			N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
			3.2	1.5	3.8	2.5	1.2	4.8	2.4	0.9	3.8	16.3	7.5	25.8
追肥次数			2			3			1			6		
中微量肥	视番茄长势，喷施或结合滴灌科学施用中微量元素肥料。													

4.7 病虫害防控

4.7.1 农业防治

控制好日光温室内温度和湿度, 保证充足的光照。

4.7.2 物理防治

通风口处增设防虫网, 温室内悬挂诱杀板, 诱杀白粉虱、蚜虫、斑潜蝇等害虫, 每 666.7 m² 悬挂 25 cm~40 cm 的黄板、蓝板 30 块~40 块。

4.7.3 化学防治

灰霉病: 采用 50 % 乙烯菌核利可湿性粉剂 1000 倍液或 65 % 万霉灵可湿性粉剂 800 倍液喷雾。

晚疫病: 采用 25 % 嘧菌酯悬浮剂 1500 倍液或 50 % 甲霜铜可湿性粉剂 600 倍液喷雾。

白粉病: 采用 25 % 乙嘧酚悬浮剂 1000 倍液或 36 % 硝苯菌酯乳油 1000 倍液喷雾。

不得使用国家明令禁止的高毒、剧毒、高残留的农药及其混配农药。

5 采收

适时采收。