

DB 1504

赤 峰 市 地 方 标 准

DB 1504/T 1027—2021

日光温室番茄越冬茬生产技术规范

Technical Regulation of Tomato Winter Stubble Production in Solar
Greenhouse

2021 - 01 - 05 发布

2021 - 02 - 05 实施

赤峰市市场监督管理局 发 布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 I 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由赤峰市经济作物工作站提出。

本文件由赤峰市农牧局归口。

本文件起草单位：赤峰市经济作物工作站、喀喇沁旗经济作物工作站、宁城县经济作物工作站、巴林左旗经济作物工作站。

本文件主要起草人：宋洋、靳玉荣、张振辉、杨素荣、李春峰、王兆吉、郑伟、王莉敏。

日光温室番茄越冬茬生产操作规程

1 范围

本文件规定了日光温室番茄越冬茬生产的环境条件及品种选择、生产技术等技术内容。

本文件适用于赤峰地区日光温室番茄越冬茬的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16715.3 瓜菜作物种子 第3部分：茄果类

GB/T 23416.2 蔬菜病虫害安全防治技术规程 第2部分：茄果类

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NY/T 5010 无公害农产品 种植业产地环境条件

DB15/T 1151 番茄集约化育苗技术规程

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 环境条件及品种选择

4.1 产地环境

应符合NY/T 5010 的要求。

4.2 品种选择

选择耐低温、耐弱光等抗逆性强、优质且丰产性好的硬果型品种。种子质量应符合被 GB 16715.3 的要求。

5 生产技术

5.1 茬口安排

9月下旬至10月上旬定植，翌年1月中旬开始采摘上市，2月下旬至3月上旬采收结束。

5.2 育苗

采用工厂化集约穴盘无土育苗技术，执行 DB15/T 1151。

5.3 定植前准备

5.3.1 清理棚室

彻底清除棚内的杂草、根茬、病残体。

5.3.2 高温闷棚

在定植前 15 d~20 d，晴天条件下，每 667 m²撒施 50 %多菌灵可湿性粉剂 1.0 kg~1.5 kg，10 %吡虫啉可湿性粉剂 0.5 kg~0.75 kg，配成毒土，均匀撒施。将土壤深翻后，灌一次大水，用透明吸热薄膜覆盖在地表，密闭棚室 10 d~15 d。

5.3.3 烟剂熏棚

定植前 3 d~5 d，密闭棚室，用百菌清、异丙威等烟剂熏棚 12 h 后进行通风。

5.3.4 施肥

每 667 m²施腐熟的有机肥 5000 kg~10000 kg，磷酸二铵 50 kg，复合肥（N-P-K:17-17-17）50 kg，硫酸钾 50 kg，生物有机肥（0.2 亿/g）100 kg~150 kg，硼、镁、锌肥各 1 kg，深翻 30 cm。施肥执行 NY/T 496 的要求。

5.3.5 做畦覆膜

畦宽 120 cm，高 20 cm，其中，台面宽 80 cm，作业垄宽 40 cm，每个高台上铺设两条微灌带，用 1.5 m 幅宽的白色地膜覆盖。

5.4 定植

定植时在晴天傍晚或早晨进行。每畦双行，株距 30 cm~35 cm，行距 40 cm。覆土超过苗坨 2 cm，浇足定植水，5 d~7 d 后浇一次缓苗水。

5.5 定植后管理

5.5.1 温度

开花期适宜的温度：白天 20 ℃~30 ℃，夜间 15 ℃~20 ℃。

果实发育期的适宜温度：白天 25 ℃~30 ℃，夜间 13 ℃~17 ℃。

5.5.2 光照

采用高透光、无滴膜覆盖，保持棚面清洁，适当早揭晚盖覆盖物。连续阴雪天气时进行人工补光，保证番茄生长适宜光照 $3\text{ wlx} \sim 3.5\text{ wlx}$ 。

5.5.3 水肥

定植缓苗后浇一次缓苗水进行蹲苗，并结合缓苗水冲施硝酸钾复合肥(N-P-K:13-36-13) 每 667 m^2 每次 5 kg 。结束蹲苗开始浇水，每 $8\text{ d} \sim 15\text{ d}$ 一次。当第一穗果 $3\text{ cm} \sim 4\text{ cm}$ 时随水冲施水溶性肥，生长前期促开花结果，以平衡型水肥为主(N-P-K:20-20-20)；中后期促生长和果实膨大转色，以高钾肥(N-P-K:12-5-40)、钙肥、生物菌肥为主，辅之以叶面喷施。平衡肥和高钾肥交替使用，平衡肥冲施 $2 \sim 3$ 次，每次 5 kg ，高钾肥冲施 $5 \sim 6$ 次，每次 5 kg 。

5.5.4 吊蔓与整枝

第一花序开花时吊蔓，整枝与打杈同时进行，采用单干整枝，去掉所有侧枝，主干留 $5 \sim 6$ 穗果，顶部留 3 片叶时摘心。果实 $1\text{ cm} \sim 2\text{ cm}$ 时疏花疏果，第一穗果留 $3 \sim 4$ 个，第二穗以上每穗果留 $4 \sim 5$ 个。

5.5.5 防止落花落果

宜使用振动授粉和熊蜂授粉。用植物生长调节剂辅助授粉，在每天的上午无露水时进行，避免中午高温喷花或蘸花。

5.6 病虫害防治

病害：病毒病、灰霉病、叶霉病、晚疫病、早疫病、溃疡病。

虫害：蚜虫、斑潜蝇、白粉虱、茶黄螨等。

病虫害防治按照 GB/T 23416.2 执行。

5.7 采收

果实转色且着色均匀一致及时采摘，分级包装销售。