

DB 1504

赤峰市地方标准

DB 1504/T 1028—2021

日光温室番茄早春茬生产技术规范

Technical Regulations for Early Spring Stubble Production
of Tomato in Solar Greenhouse

2021 - 01 - 05 发布

2021 - 02 - 05 实施

赤峰市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由赤峰市经济作物工作站提出。

本文件由内蒙古自治区赤峰市农牧局归口。

本文件起草单位：赤峰市经济作物工作站、赤峰市松山区经济作物工作站。

本文件主要起草人：张振辉、卫向东、王旭东、麻清泽、邹林林、赵桂霞。

日光温室番茄早春茬生产技术规范

1 范围

本文件规定了日光温室番茄早春茬生产的产地环境、品种选择、茬口安排、育苗、田间生产管理措施、主要病虫害防治、采收等技术内容。

本文件适用于赤峰地区日光温室早春茬番茄生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321 （所有部分）农药合理使用准则

GB 16715.3-2010 瓜菜作物种子 第3部分：茄果类

GB/T 23416.8 蔬菜病虫害安全防治技术规范 第8部分：根菜类

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

DB15/T 1151 番茄集约化育苗技术规程

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产地条件

选择土质疏松、富含有机质、保水、保肥性好的砂壤土。

5 品种选择

选择适应能力强、耐低温、抗弱光、抗病品种。种子质量符合GB 16715.3-2010 要求。

6 茬口安排

12月中下旬定植，翌年4月上旬采收，5月末采收结束。避免与茄科蔬菜连作。

7 育苗

按照 DB15/T 1151 执行。

8 田间管理

8.1 整地施肥

肥料使用按照 NY/T 496 执行。

结合整地每 667 m²施用充分腐熟的农家肥 5000 kg~8000 kg, 硫酸钾 40 kg, 过磷酸钙 50 kg, 磷酸二铵 20 kg, 三元复合肥 (N-P-K:15-15-15) 50 kg, 硼、锌、锰肥各 1 kg, 均匀撒施, 深翻耕地 40 cm。

8.2 起垄

大垄高台方式起垄, 垄面宽 1.0 m, 垄距 30 cm, 垄高 25 cm。起垄、铺设滴灌、覆膜后浇透底水。

8.3 消毒

用异丙威烟剂熏蒸棚室, 封闭棚膜, 闷棚 10 d~15 d。

8.4 定植

番茄四片真叶一心, 地温稳定在 12 ℃以上定植。在垄背上按照行距 40 cm、株距 40 cm, 用打孔器打定植孔, 每 667 m²种植 2000 株。定植后浇定植水。

8.5 缓苗前

定植后 5 d~7 d 促进生根缓苗。前 1 d~3 d, 白天 25 ℃~32 ℃, 夜间 15 ℃~25 ℃; 4 d~7 d, 白天 23 ℃~28 ℃, 夜间 15 ℃~20 ℃。缓苗期控制浇水, 促进植株根系生长。

8.6 座果前

8.6.1 温度

缓苗后至结果期白天温度 20 ℃~30 ℃, 夜间 15 ℃~20 ℃, 最低温度不低于 12 ℃。

8.6.2 水肥

缓苗结束后浇一次水。番茄第一穗果座住前, 以营养生长为主, 不再浇水追肥, 进行蹲苗。

8.7 结果期

8.7.1 温度

白天温度 20 ℃~30 ℃, 夜间 15 ℃~20 ℃, 最低温度不低于 10 ℃。

8.7.2 水肥

第一穗果直径 3 cm~4 cm 时第一次冲施肥, 前期和中期冲施氮磷钾平衡性 (N-P-K:20-20-20) 水溶肥, 每 667 m² 每次冲施 10 kg~20 kg, 后期冲施高钾含量水溶肥 (N-P-K:15-6-35), 每 667 m² 每次冲施 10 kg~20 kg。第 2 穗果膨大期开始, 叶面喷施 0.1 % 的磷酸二氢钾 1~2 次。

8.8 光照

生长期光照达到 15000 lx~30000 lx, 如果光照不足, 使用补光灯增加光照。

8.9 吊蔓与整枝

第一花序开花时吊蔓, 整枝与打杈同时进行, 采用单干整枝, 去掉所有侧枝, 主干留 5~6 穗果, 顶部留 5 片叶时摘心。果实 1 cm~2 cm 时疏花疏果, 第一穗留 3~4 个果, 第二穗以上每穗留 4~5 个果。

8.10 防止落花落果

宜使用振动授粉和熊蜂授粉。用植物生长调节剂辅助授粉, 在每天的上午无露水时进行, 避免中午高温喷花或蘸花。

9 主要病虫害防治

病害: 灰霉病、晚疫病、叶霉病、溃疡病、病毒病。

虫害: 蚜虫、白粉虱。

病虫害防治按照 GB/T 8321 (所有部分) 和 GB/T 23416.8 执行。

10 采收

果实转色且着色均匀一致及时采摘, 分级包装上市。
