

DB 1504

赤峰市地方标准

DB 1504/T 1030—2021

设施番茄越夏茬生产技术规范

Technical code for Over-summer Stubble Production of Protected Tomato

2021-01-05 发布

2021-02-05 实施

赤峰市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由赤峰市经济作物工作站提出。

本文件由赤峰市农牧局归口。

本文件起草单位：赤峰市经济作物工作站、喀喇沁旗经济作物工作站、宁城县经济作物工作站、松山区经济作物工作站。

本文件主要起草人：靳玉荣、岳玲、宋洋、吴丽艳、宋宝香、沈喜东、郑伟、杨素荣、李春峰、邹林林、王莉敏、刘伟。

设施番茄越夏茬生产技术规程

1 范围

本文件规定了设施番茄越夏茬生产的产地环境及品种选择、生产管理措施等技术内容。
本文件适用于赤峰地区日光温室和大棚番茄越夏茬生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16715.3 瓜菜作物种子 第3部分 茄果类

GB/T 23416.2 蔬菜病虫害安全防治技术规程 第2部分 茄果类

NY/T 5010 无公害农产品 种植业产地环境条件

DB15/T 1151 番茄集约化育苗技术规程

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产地条件及品种选择

4.1 环境条件

应符合 NY/T 5010 的要求。

4.2 品种选择

选座果率高、丰产、耐强光、耐高温、抗病性强的品种。种子质量应符合 GB 16715.3 的要求。

5 田间管理

5.1 茬口

4月初育苗，5月初定植，7月中下旬采收。

5.2 育苗

按 DB15/T 1151 执行。

5.3 定植

5.3.1 消毒

用 5 % 菌毒清水剂 200 倍液全面喷施。封闭棚膜，高温焖棚 4 d~5 d。

5.3.2 整地施肥

每 667 m²施腐熟优质农家肥 5000 kg~10000 kg，深翻 40 cm，用旋耕机旋耕两遍使其均匀，平整地面。定植前 3 d~5 d，每 667 m²施硫酸钾 35 kg，过磷酸钙 45 kg，复合肥(N-P-K: 17-17-17)35 kg，硼、锰、锌肥各 1 kg，各种肥料混合均匀撒于地面，使肥料与土搅拌均匀，整平地面起垄。

5.3.3 起垄

大垄高台方式栽培，畦宽 100 cm，其中垄台宽 70 cm，垄沟宽 30 cm，垄台高 20 cm。垄台上铺设滴灌管覆膜。

5.3.4 定植

番茄三叶一心，苗高 13 cm~14 cm，茎粗 3 mm~4 mm 时定植。垄台上按每延长米三株三角形错位打孔、定植，浇水，覆土超过苗坨 1 cm~2 cm。每 667 m²定植 1800 株。

5.4 定植后

5.4.1 温度

定植后白天温度 25 ℃~30 ℃，夜间温度 15 ℃~20 ℃。缓苗后至结果期白天温度 20 ℃~30 ℃，夜间 15 ℃~20 ℃。温度超过 30 ℃开始放风。

5.4.2 光照

应加盖遮阳网控制光照。

5.4.3 水肥

定植后，浇足定植水和缓苗水。第一至第三穗果果实直径 3 cm~4 cm 时，每 667 m²分别随水冲施一次氮磷钾平衡型水溶肥(N-P-K:20-20-20) 7 kg~10 kg，第四至第六穗果果实直径 3 cm~4 cm 时，每 667 m²分别随水冲施高钾型水溶肥(N-P-K:15-6-35) 8 kg~10 kg。视土壤墒情，5 d~10 d 浇一次水。

5.4.4 吊蔓与整枝

采用单干整枝方法，主干留 6 穗果，每穗留 4~5 个果。第一穗果座果后吊绳绑蔓。及时摘掉侧枝，植株较小时侧枝 6 cm~8 cm 时摘掉，随着植株生长侧枝 3 cm~5 cm 时摘掉。第六穗花序上部留三片功能叶摘心。第一穗果转色后去掉下部老叶。

5.4.5 保花保果

宜应用振动授粉和熊蜂授粉。用植物生长调节剂辅助授粉，在每天的上午无露水时进行，避免中午高温喷花或蘸花。

5.5 病虫害防治

病害：晚疫病、叶霉病、溃疡病、病毒病。

虫害：白粉虱、蚜虫、斑潜蝇、棉铃虫。

病虫害防治按照 GB/T23416.2 执行。

6 采收

果实转色且着色均匀一致及时采摘，分级包装上市。
