

DB34

安徽省地方标准

DB 34/T 3634—2020

设施番茄生产技术规程

Technical regulations of facilities tomato production

2020 - 06 - 22 发布

2020 - 07 - 22 实施

安徽省市场监督管理局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由安徽省农业科学院土壤肥料研究所提出。

本标准由安徽省农业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：安徽省农业科学院土壤肥料研究所、安徽省农业科学园园艺研究所、舒城县农业科学研究所、安徽省司尔特肥业股份有限公司。

本标准主要起草人：孙义祥、邬刚、袁嫚嫚、王家宝、耿维、张其安、俞飞飞、王艳、曹哲伟、葛自兵、阮琦琦、董慧、陈俊阳、井玉丹。

设施番茄生产技术规程

1 范围

本标准规定了设施番茄生产技术的产地环境、水肥一体化技术要求、栽培管理、水肥管理、病虫害防治和采收。

本标准适用于设施番茄土壤栽培。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则
- GB 16715.3 瓜菜作物种子 第3部分：茄果类
- GB/T 23416.2 蔬菜病虫害安全防治技术规范 第2部分：茄果类
- GB/T 50485 微灌工程技术规范
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY 525 有机肥料
- NY/T 1107 大量元素水溶肥料
- NY/T 5010 无公害农产品 种植业产地环境条件
- DB34/T 1604 番茄长季节栽培技术规程

3 产地环境

选择土层厚度、质地适宜，肥沃、疏松，排灌方便的地块，产地环境条件应符合 NY/T 5010 的规定。

4 水肥一体化技术要求

4.1 施肥系统组成

4.1.1 首部枢纽

符合 GB/T 50485 规定的首部枢纽设备。

4.1.2 输配水管网

符合 GB/T 50485 规定的管道设备。

4.1.3 灌水器

符合 GB/T 50485 规定的灌水器设备。

4.2 肥料选择

选择大量元素水溶肥料。产品技术指标应符合 NY/T 1107 的规定。

4.3 系统维护

4.3.1 管道的维护

使用前，用清水冲洗管道。施肥后，用清水继续灌溉 15 min。每 30 天清洗肥料罐一次（清洗水需要集中收集处理），并依次打开各个末端堵头，用高压水流冲洗各管道。

4.3.2 滴灌管（带）的维护

作物收获后，将滴灌管（带）保持顺直，避免扭折，放入仓库保管，按规格类型分别堆放，存放地点应通风干凉，远离热源，避免阳光暴晒。

5 栽培管理

5.1 品种选择

按 DB34/T 1604 的规定执行。

5.2 种子要求

种子质量应符合 GB 16715.3 中杂交种二级以上的规定。

5.3 育苗要求

采用穴盘育苗，按 DB34/T 1604 的规定执行。

5.4 土壤消毒

5.4.1 多年重茬土壤

施基肥前，每亩撒施石灰氮 30 kg~40 kg，深翻 30 cm，做高 30 cm、宽 60 cm~70 cm 的畦，地面用薄膜密封，四周盖严，畦间灌水，使土壤含水量达到饱和。棚室保持密封，闷棚 20 天~30 天，闷棚结束后揭掉地膜，翻耕、晾晒即可。

5.4.2 轮作换茬土壤

定植番茄的前茬土壤是非茄果类蔬菜时，土壤可不消毒。

5.5 基肥要求

每 667m² 均匀施入 300 kg~400 kg 商品有机肥和 30 kg~35 kg 的复合肥（20-20-9，硫酸钾型），肥料使用按 NY/T 496 和 NY 525 的规定执行。

5.6 整地要求

按 DB34/T 1604 的规定执行。

5.7 定植要求

按 DB34/T 1604 的规定执行。

5.8 田间管理

5.8.1 温湿度管理

按 DB34/T 1604 的规定执行。

5.8.2 光照管理

采用透光性好的耐候功能膜，保持膜面清洁。冬季白天揭开保温覆盖物，增加光照强度。夏秋季适当遮阳，降低棚内温度。

5.8.3 植株管理

番茄植株的插架、整枝、打底叶、疏果等按 DB34/T 1604 的规定执行。

6 水肥管理

6.1 定植至缓苗

定植后及时灌溉 1 次，每 667m² 用水量 10 m³~15 m³。

6.2 坐果初期

6.2.1 第一穗果开始膨大时，灌溉追肥 1 次，将大量元素水溶肥料(20-20-20)8 kg/667m²~10 kg/667m² 用水稀释 200 倍后随水灌溉使用，灌溉用水量为 10 m³/667m²~12 m³/667m²。

6.2.2 该生育期每 667m² 喷施 30 kg~50 kg 稀释 800 倍~1000 倍含钙镁硼元素的叶面肥 1 次。

6.2.3 根据土壤墒情，每隔 7 天~10 天灌溉 1 次，每次每 667m² 用水量 8 m³~12 m³。

6.3 坐果中期

6.3.1 第二穗果开始膨大时，灌溉追肥 1 次，将大量元素水溶肥料(18-7-30)10 kg/667m²~12 kg/667m² 用水稀释 200 倍后随水灌溉使用，灌溉用水量为 12 m³/667m²~14 m³/667m²。

6.3.2 该生育期每 667m² 喷施 30 kg~50 kg 稀释 800 倍~1000 倍含钙镁硼元素的叶面肥 1 次。

6.3.3 根据土壤墒情，每隔 7 天~10 天灌溉 1 次，每次每 667m² 用水量 8 m³~12 m³。

6.4 膨果期

6.4.1 第三穗果开始膨大时，灌溉追肥 1 次，将大量元素水溶肥料(18-7-30)9 kg/667m²~11 kg/667m² 用水稀释 200 倍后随水灌溉使用，灌溉用水量为 12 m³/667m²~14 m³/667m²。

6.4.2 该生育期每 667m² 喷施 30 kg~50 kg 稀释 800 倍~1000 倍含钙镁硼元素的叶面肥 1 次。

6.4.3 根据土壤墒情，每隔 7 天~10 天灌溉 1 次，每次每 667m² 用水量 8 m³~12 m³。

6.5 采收期

6.5.1 第一穗果和第二穗果采收后，灌溉追肥 1 次。

6.5.2 将大量元素水溶肥料(18-7-30) 7 kg/667m²~9 kg/667m² 用水稀释 200 倍后随水灌溉使用，灌溉用水量为 10 m³/667m²~12 m³/667m²。

7 病虫害防治

7.1 主要种类

7.1.1 虫害主要有：蚜虫、烟粉虱、小地老虎、潜叶蝇、根结线虫、棉铃虫等。

7.1.2 病害主要有：猝倒病、立枯病、灰霉病、病毒病、炭疽病、叶霉病、青枯病、晚疫病、早疫病等。

7.1.3 防治上要按照“预防为主，综合治理”的植保方针，坚持“农业防治、物理防治、生物防治为主，化学防治为辅”的防治原则。

7.2 防治方法

按 GB/T 23416.2 的规定执行。

7.3 农药使用

按 GB/T 8321 的规定执行。

8 采收

及时分批采收，减轻植株负担，确保商品果品质，促进后期果实膨大。
