

双茬鲜食甜玉米生产技术规程

2017-12-20 发布

2018-01-01 实施

唐山市质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由唐山市质量技术监督局提出。

本标准由乐亭县原野水稻专业合作社起草。

本标准主要起草人：赵晖、刘艳荣、张海燕、杨益春、李晓勇、马和军、毕秋会、宋建华、刘静、齐铁权、崔锦辉、史晓贤、阴丽。

双茬鲜食甜玉米生产技术规程

1 范围

本标准规定了地膜覆盖双茬鲜食甜玉米生产的产地环境、品种选择、种植技术、田间管理、病虫害防治和采收等。

本标准适用于地膜覆盖双茬鲜食甜玉米生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB/T 8321 农药合理使用准则(所有部分)

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NY/T 5010 无公害农产品 种植业产地环境条件

3 产地环境

应符合 NY/T 5010 规定。选择土层深厚、排灌通畅、肥力较高的旱田。

4 品种选择

应选择生育期适宜、发芽率高、发芽势强、商品性好、高产、抗病虫害的品种，主要有甜单7号、夏王、金菲等品种。种子质量应符合 GB 4404.1 规定。

5 种植技术

5.1 隔离种植

5.1.1 空间隔离

不同类型的玉米品种，同期播种距离相隔400m以上。

5.1.2 自然屏障隔离

利用山岗、树林、村庄等自然屏障隔离。

5.2 大田准备

5.2.1 翻耕要求

把残留废膜清理干净，深耕20cm~25cm, 细耙，土壤细碎，疏松、均匀平整。

5.2.2 畦沟规格

春季播种需起垄并铺设地膜，带幅110cm，垄底宽70cm，垄面宽65cm，垄高15cm，行间距40cm。

5.3 种子处理

播种前2d~3d, 选择晴天晒种子2h~3h，避免在水泥面晒种。

5.4 播期

5.4.1 地膜覆盖

3月底播种。

5.4.2 露地直播

6月25日—7月20日播种。在垄沟套播第二茬。

5.5 种植密度

第一茬垄上行距40cm~45cm, 株距25cm~28cm, 每667m²单茬种植4000株~4500株。第二茬垄沟, 垄面分别种植1行, 株距25cm~28cm, 每667m²单茬种植4000株~4500株。

5.6 播种方法

5.6.1 露地直播

开沟穴播, 每穴2粒~3粒, 每667m²用种1.0kg~1.3kg, 播种深度控制在3cm~5cm。

5.6.2 地膜覆盖

方法同5.6.1, 播后喷施除草剂和防治地下害虫药剂后及时覆盖地膜, 膜边压入土中, 压实。

6 田间管理

6.1 肥水管理

6.1.1 施肥

6.1.1.1 施肥原则

肥料使用应符合 NY/T 496 规定。

6.1.1.2 施肥方法

每667m²底施堆沤好的有机肥1000kg~1500kg, 耙平整细后作畦, 作畦时每667m²用(N:P:K=15:15:15)三元素复合肥20kg~25kg施于种植沟内, 并覆盖薄土。

6.1.2 排水与浇水

足墒播种, 保证生长期內遇旱浇水, 遇涝排渍。

6.2 苗期管理

6.2.1 放苗

覆膜播种的鲜食甜玉米在播后10d~15d, 幼苗二叶一心时, 用竹签在幼苗处的膜划开小口子, 放苗出膜。

6.2.2 查苗补栽

出苗后用预留苗或同龄预留苗补栽苗穴, 栽苗时带土, 浇足水。

6.2.3 间苗定苗

3叶~4叶期间苗, 5叶~6叶定苗, 每穴留1株健壮苗。

6.2.4 去除分蘖

6 叶~8 叶有分蘖时, 应及时清除。

6.2.5 揭膜

大喇叭口期到抽雄前, 覆膜田块把地膜全部揭掉, 带出田外集中处理。

6.2.6 培土

揭膜后应进行培土。

7 病虫害防治

7.1 防治原则

按照“预防为主、综合防治”的植保方针, 坚持以“农业防治、物理防治、生物防治方法为主, 化学防治为辅”的无害化防治原则。

7.2 防治方法

7.2.1 农业防治、物理防治、生物防治

防治方法见附录 A。

7.2.2 化学防治

农药合理使用准则按 GB/T 8321 (所有部分) 规定进行, 防治方法见附录 A。

8 采收

鲜食甜玉米鲜穗在授粉后 20d~23d 即可采收, 此时甜度最高、品种最佳。通过看花丝变化、手指挟嫩籽粒、品尝甜味等确定采收期。清早或傍晚采收为佳, 应及时处理, 当天上市或入冷库。

附录 A
(规范性附录)
薄皮甜瓜病虫害的综合防治方法

A.1 虫害及防治方法

应符合表 A.1 的规定。

表 A.1 虫害及防治方法

虫害	发生时期	防治办法
粘虫	苗期	50%辛硫磷乳油、50%甲胺磷乳油、10%菊马乳油，喷雾防治；采用杀虫类或糖醋液、性诱剂捕杀，减少成虫产卵量，降低虫口密度。
红蜘蛛	苗期	用 20%三氯杀螨醇乳油、73%克螨特乳油，喷雾防治。深翻土地；早春或秋后灌水；清除田间杂草；避免玉米与大豆间作。
蚜虫	心叶末期和穗期	抽雄和剪雄 也可用 40%乐果乳油或 10%吡虫啉 1000 倍液喷雾防治。结合积肥，清除田边杂草；利用瓢虫、寄生蜂等天敌进行防治。
玉米螟	心叶末期和穗期	用 1.5%辛硫磷颗粒剂按每亩 1.5~2 千克用量丢心防治；接种赤眼蜂卵块防治玉米螟，应用白僵菌封垛杀灭玉米螟越冬幼虫；成虫发生期利用频振式杀虫灯、黑光灯或性诱剂诱杀。
蓟马	苗期	10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液，或 22%毒死蜱·吡虫啉乳油 2500 倍液，或 20%氰戊菊酯乳油 3000 倍液喷雾；清除田间杂草和枯枝残叶。

A.2 病害及防治方法

应符合表 A.2 的规定。

表 A.2 病害及防治方法

病害	发生时期	防治方法
黑粉病	心叶末期和穗期	选育和推广抗病品种；播种前清除田间病株残体，减少越冬菌源；收获后及时深耕灭茬；堆沤有机肥要经过高温发酵；轮作；病株及时拔除，也可用 25%粉锈宁可湿性粉剂 150 克，拌种 50 千克预防。
叶斑病	心叶末期和穗期	发病初期及时摘除下部 2~3 片病叶；收获后及时清除病残体，轮作；50%多菌灵 500 倍液、75%百菌清 600 倍液喷雾。
纹枯病	心叶末期和穗期	70%代森锰锌可湿性粉剂 400~500 倍液、50%多菌灵可湿性粉剂 500~800 倍液喷雾防治；选择抗病品种，实行轮作倒茬，及时清除遗留在田间的病残体。