

DB15

内蒙古自治区地方标准

DB15/T 3329—2024

沿黄灌区麦后复种饲用油菜 || 玉米生产
技术规程

Code of practice for intercropping of multiple cropping forage rape
and maize after triticeae crops harvest in the yellow irrigation
district

2024-01-25 发布

2024-02-25 实施

内蒙古自治区市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古自治区农牧厅提出。

本文件由内蒙古自治区农业标准化技术委员会（SAM/TC 20）归口。

本文件起草单位：内蒙古农业大学、内蒙古自治区农牧业科学院、呼和浩特市农牧技术推广中心。

本文件主要起草人：张艳丽、李立军、常青、孙继颖、韩丽、王英、杨金虎、赵鑫瑶、张宏杰、尹春艳、米俊珍、王殿清、庞云、刘先芬。

沿黄灌区麦后复种饲用油菜 ∥ 玉米生产技术规范

1 范围

本文件规定了麦类作物收获后复种饲用油菜 ∥ 玉米的整地、播种、灌溉、病虫害防治和收获等技术要求。

本文件适用于内蒙古沿黄灌区及生态生产条件类似地区。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类
- GB 4407.2 经济作物种子 第2部分：油料类
- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB/T 8321 （所有部分）农药合理使用准则
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 991 牧草收获机械 作业质量
- NY/T 1276 农药安全使用规范总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

饲用油菜 forage rape

饲用油菜（*Brassica napus L.*）为十字花科，芸薹属，一年生草本，收获地上部分植株作为动物青绿饲料的双低油菜。

3.2

麦后复种 multiple cropping after wheat

为了充分利用当季土壤养分及光热资源，在麦类作物收获后的田块进行播种。

3.3

间作 intercropping

在同一块田地上，分行或分带相间种植两种或两种以上生育期相近作物的种植方式。

4 整地

4.1 粉碎秸秆

麦类作物收获时将秸秆粉碎后均匀抛撒在地面，麦秸切碎长度应 ≤ 10 cm。

4.2 耕翻还田

耕翻深度20 cm~25 cm，耕翻后及时耙耱整地。

5 播种

5.1 品种选择

饲用油菜选择通过国家登记的生育期80 d~100 d的品种，玉米选择通过国家、自治区审定或同一生态区备案的优质高产极早熟品种。种子质量应符合GB 4404.1和GB 4407.2的规定。

5.2 播种时间

麦类作物收获后一周内及时播种。

5.3 播种量

饲用油菜播种量为0.8 kg/667 m²~1.0 kg/667 m²，玉米种植密度为5500株/667 m²~7000株/667 m²。

5.4 种植方式

饲用油菜6行，玉米4行，间作种植。饲用油菜采用25 cm~30 cm等行距种植。玉米采用宽窄行种植，宽行70 cm~80 cm，窄行30 cm~40 cm。

5.5 播种方式

饲用油菜采用麦类播种机将种子与肥料充分混匀后播种，肥料为磷酸二铵10 kg/667 m²~12 kg/667 m²，或等养分的复合肥。玉米采用种肥分离精量播种机种肥同播，肥料为磷酸二铵10 kg/667 m²~15 kg/667 m²，尿素5 kg/667 m²。饲用油菜播种深度3 cm~4 cm，玉米播种深度3 cm~5 cm，播后及时镇压紧实。肥料使用方法应符合NY/T 496的规定。

6 灌溉

有灌溉条件的地区，在玉米拔节期灌水1次，水质应符合GB 5084的规定。

7 病虫害防治

在饲用油菜生长前期如发现蚜虫、菜青虫、霜霉病和菌核病等病虫害时采用化学农药防治，收获前两周禁止用药，以免牲畜中毒。农药使用方法按照GB/T 8321和NY/T 1276的规定执行

8 收获

在饲用油菜盛花期刈割，采用青贮收割机混合收获，收获操作按照NY/T 991执行。
